

LEIRATI MÉRTAN.

I. RÉSZ.

A VETÜLETTAN.

IRTA

Haáz Rezső Székelyudvarhelyi Könyvtára
Székelyudvarhely

VÉSZ JÁNOS ÁRMIN
mérnök, a kir. József műegyetemnél a felsőbb mennyiségtan és a leirati mértan ny. r. tanára, a magyar és a palermói tudományos Akadémia levelező, és a k. természettudományi társulat választmányi tagja.

KIADTA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA.

I. FÉL.

32 kömöszetü táblával.



A. v. udvarhelyi ref. főiskola Könyvtára

PEST,

EGGENBERGER FERDINÁND,

MAGY. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL.

1865.

5916
E. 38. IV.

LEIRATI MÉRTAN.

I. RÉSZ.

A VETÜLETTAN.

IRTA

VÉSZ JÁNOS ÁRMIN

mérnök, a kir. József műegyetemnél a felsőbb mennyiségtan és a leirati mértan ny. r. tanára, a magyar és a palermói tudományos Akadémia levelező és a k. természettudományi társulat választmányi tagja.

KIADTA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA.

I. FÉL.

23 kömetszeti táblával.



PEST,

EGGENBERGER FERDINAND,

MAGY. AKAD. KÖNYVKERESKEDŐNÉL.

1865.

Haáz Rézső Múzeum Tudományos Könyvtára
04127
Szekelyudvarhely

Előszó.

A tudomány gyors léptekkel haladván előre, nekünk valóban megfeszített erővel kell törekednünk; és kétszeres munkásságot kifejtetnünk, midőn azt nemcsak haladásában szorgos szemmel kísérjük, hanem még azonfelül az oly súlyosan érzett hiányokat is igyekszünk betölteni.

A magyar tudományos Akadémia hazafias buzgalma azonban biztos reményt nyújt arra, hogy rövid idő alatt mind a két feladatnak elégtételt fog; mert midőn egyrészt évkönyvében és értesítőjében a tudomány újabb vívmányaival foglalkozva megmutatja, hogy nem csak a tudomány színvonalán áll, de azt magasabbra emelni is törekszik, — másrészt már eddig is a tudomány legtöbb ágaiban birunk használható kézi könyveket; és épen a még hiányzókat egyikének pótlása e munka rendeltetése.

Bár sikerülne, hogy e czélt elérve munkám a haszonvetetőség azon fokát érje el, melyet számára megnyerni erős akaratom, és buzgó igyekezetem volt.

IV

A leirati mértan egész terjedelmét a következő részek képezik :

a) a szorosabb értelemben vett leirati mértan, vagyis a vetülettan, mely a térmennyiségeket úgy tanítja előállítani a rajztéren, mintha azokat a szem végtelen nagy távolságból tekintené ;

b) a leirati mértannak alkalmazása az árnyéktanra ;

c) a mértani távlattan, mely a térmennyiségeket úgy állítja elő, a mint azokat a véges távolban levő szem látja ; és végre

d) a leirati mértan alkalmazása a kőmetszetekekre ; mely részek mindegyike azonban, a többitől függetlenül, külön-külön egy önálló munkát képez.

A jelen munka a vetülettan első felét képezi, mely az egyenes vonalakkal, síkokkal, és az általuk bezárt testekkel foglalkozik ; ezt fogja rövid idő múlva követni a második fél, melynek tartalma a görbe vonalak, és a görbe felületek ; melylyel egyszersmind a vetülettan be is lesz fejezve.

A mi a vetülettan ezen első felét illeti, abban különös figyelem fordítottatott arra, hogy a nehezebb és összetettebb feladatokat a könnyebbek, és egyszerűbbek előzzék meg ; úgy szintén, a mennyire lehetséges volt, a rajzokban a segédvonalak is kihúzottak, hogy azok segítségével a megoldott feladatokat, — a leirati mértanban már kissé gyakorlott, — az ábrák egyszerű megtekintése által is megérthesse a nélkül,

hogy a különben elég rövid, és világos szöveget utánolvasni kénytelen volna; kívánván ez által is, a mennyire lehet, ezen tudomány tanulmányozását kellemessé tenni, mert csak így reménylem, hogy e nálunk még oly keveset ismert tudomány valahára gyökeret verve, az óhajtott gyümölcsöt is meghozza.

A leirati mértan ugyanis azonkívül, hogy már magába véve egy szorosan vett tudomány, és több másoknak nélkülözhetlen előlépcsője, egyszersmind a legjobb eszköz is a tanuló képzelő tehetsége bővebb kiképzésére; mely czél elérésére nem eléggé ajánlható épen a vonalak és síkokra vonatkozó feladatok, változtatott adatok melletti többszörös ismétlése, mi által a tanuló a dolog lényegébe hasonlíthatatlanul jobban behat, mint az egyszerű utánrajzolás által.

Igen ajánlható továbbá, hogy a kezdő eleinte csak igen lassan haladván előre igyekezzék a pontok és egyenesek legegyszerűbb vetületeit képzelődése elé idézni úgy, mint azok a természetben állanak, nem mint azokat a papíron rajzolva látja maga előtt. Az így eleinte netalán hátráltatott előmenetelt bőven pótolja azután a későbbi gyorsabb haladás.

Igyekeztem minden alaplátételt szorosan indokolni, minden tételt a lehető legegyszerűbben ugyan, de szigorúan bebizonyítani, a nélkül azonban, hogy mélyebb mennyiségtani ismereteket tételeznék fel. A mennyiségtan ismeretét egészen mellőzni nem lehet-

séges, de szükségtelen is, miután azok, kik a leirati mértant, mint a géptan és az építészet előtudományát tanulmányozzák, már úgy is birnak rendesen annyi mennyiségtani ismerettel, a mennyi jelen munkám minden nehézség nélküli megértésére szükséges.

Ezeket megemlítvén munkámat a közönség kedvező részvételébe bátorodom ajánlani; mert csakis a szíves fogadtatásból reménylek új erőt és kitartást meríthetni a kitűzött nagy feladat bevégzésére, melynél nem csak a tudományt kelle nálunk meghonosítani, hanem annak egész sajátos nyelvét mintegy újjá teremteni.

A Szerző.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

TARTALOM

A VETÜLETAN.

I. FÉL.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
AZ EGYENES VONALOK, SÍKOK, ÉS AZ ÁLTALOK BEZÁRT
Síkfelekvőalakok.

TESTEK.

— 100 —

TESTER

TARTALOM.

I. Szakasz : Pontok, egyenesek és síkok.

Sz.	Lap.
1. A vetületi síkok	1
2. A pont vetületei	2
3. Az egyenes vonal vetülete	3
4. Az egyenes különböző állása a vetületi síkokhoz	4
5. Az egyenes átmenete a vetületi síkokon, vagyis a nyom	6
6. A vonal valódi hossza, és hajlási szöge	—
9. A vetületi síkok átváltoztatása	8
11. 12. Feladatok	9
13. Párhuzamos vonalak	11
14. Egymást metsző vonalak	12
15. A síkok elmélete, és előállítási módja	—
16. A sík különböző helyzete	13
18. A sík helyzetének meghatározása	14
20. Síkra merőleges vonal	16
22. Párhuzamos síkok	17
23. Egymásra merőleges síkok	—
24. Két sík átmetszése	18
29. A síkok hajlása a vetületi síkokhoz	20
31. A síkok lefordítása	23
33. Két egyenes által képzett szög	24
35. Az egyenes hajlása egy tetszőleges síkhoz	26
36. Két sík hajlási szöge	—
38. A síknak átdöfése egy egyenes által	29
39. Egy pontnak távolsága egy adott síktól	—
40. Egy pontnak távolsága az egyenes vonaltól	30
41. Két párhuzamos sík távolsága	—
42. Két párhuzamos vonal távolsága	—
43. Két nem párhuzamos vonal távolsága	31
46. Két vonal távolságának meghatározása a vetületi síkok átváltoztatása által	32
47. Két vonal távolságának meghatározása a vonalak forgatása által	34
48—69. Vegyes feladatok	36

II. Szakasz : A háromél leirati feloldása.

1. A háromél	57
2. Előleges tantételek	58

§.	Lap.
3. A háromél oldalainak és szögeinek meghatározása annak vetületeiből	59
5. 6. Adva van a háromél három oldala, kerestetik a három szög	61
7. Adva van a háromél három szöge, kerestetik a három oldal	62
8. Adva van két oldal, és a közbefoglalt szög	66
9. Adva van két szög, és a közöttük fekvő oldal	—
10. Adva van egy oldal, egy megfekvő és egy ellentett szög	67
11. Adva van két oldal, és az egyik oldaluk ellentett szög	68
12—18. Feladatok	69

III. Szakasz : A síkok által bezárt testekről.

1. A hasáb	75
4. Az egyenes vonal átmenete egy hasábon	78
5. Egy hasábnak metszése egy tetszőleges sík által	79
6. 7. A hasáb hálójá	80
8. 9. Feladatok	82
10—14. Két hasáb metszése	84
15. A gúla	89
17. Az egyenes vonal átmenete a gúlán	91
18. A gúla metszése egy tetszőleges sík által	92
19. A gúla hálójá	94
20. 21. A gúlára vonatkozó feladatok	95
22—26. Két gúla átmetszése	97
27. A rendes testek	102
29—31. A rendes négylap	104
32—34. A rendes nyolczlap	107
35—39. A rendes húszlap	110
40. A rendes hatlap	118
41—45. A rendes tizenkétlap	120
46. A tengelyméretű vetületek	128
48. A testek forgatása	129
50. 51. A különméretű vetületek mennyiségtani megalapítása	130
52. A kétméretű vetületek	134
53. Az egyméretű vetületek	—
55—57. Vetületi léptékek	136
58. 59. Alkalmazás	138
60. A részarányos testek	139
61—80. A kétféle rendes sokszögek által bezárt testek	141
81—85. A háromféle rendes sokszögek által bezárt testek	165
86—91. A ferdények által bezárt testek	169

I. Szakasz.

Pontok, egyenesek, és síkok.

1. §.

A vetületi síkok.

A leirati mértan a térmennyiségeket tanítja úgy rajzolni egy sík lapra, hogy a nyert képből ne csak azoknak alakja lehessen tisztán megismerhető, hanem hogy az előforduló méreteket is könnyen meg lehessen határozni.

A térmennyiségek legegyszerűbb előállítási módszere két egymásra merőleges síkot tételez fel, a melyeket *vetületi síkoknak* szokás nevezni. Irányra nézve ezen síkok egyikét képzelhetjük fekvőnek, a másikat függőlegesnek, és a szerint lehet megnevezésök is, az előbbi: *fekvetületi sík*, emez pedig: *függvetületi sík*; a mely megnevezések helyett azonban gyakran e következő egyszerűbbeket fogjuk használni: *feklap*, *függlap*. — A két vetületi sík közös metszési vonalát *vetületi tengelynek*, vagy *alapmetszetnek* nevezendjük.

Rövidség okáért a fekvetületi sík helyett gyakran: *FVS*, a függvetületi sík helyett: *F'VS*, a vetületi tengely helyett pedig, csak *VT* fog előfordulni.

Az említett vetületi síkok a tért négy részre osztják. Azon rész, mely a *FVS*-on felől, és a *F'VS*-on elöl van, *első negyednek*, azon rész, mely a *FVS*-on felől van ugyan, de a *F'VS* hátulsó oldalán, *második negyednek*; a második negyed alatti rész: *harmadik negyednek*, végre az első negyed alatti rész, mely tehát a *FVS* alá, és a *F'VS* elébe esik, *negyedik negyednek* fog neveztetni.

Hogy már most a vetületi síkokat a rajzpaperre előállitassuk, képzeljük magunknak a fekvetületi síkot mozdulatlanak, a függvetületi síkot pedig az alapmetszet körül addig forgatva, míg az előbbivel egybe nem esik. A rajzlapon most már csak egy egyenes vonal lesz látható, mely az alapmetszetet ábrázolja; az e vonal feletti részen képzelendő a $F'VS$ -nak felső, és egyszersmind a FVS -nak hátulsó része, a VT alatt pedig lesz a FVS -nak előli, és a $F'VS$ -nak alsó része.

2. §.

A pont vetületei.

1. Legyen M (1. ábra) egy első negyedbeli pont. Bocsássunk belőle egy merőlegest a FVS -ra, akkor azon m pont, a melyben ezen merőleges a feklapot éri, M pont *fekvetülete*, maga az Mm merőleges pedig ugyan azon pont *fekvetítő vonala* leend. — Éppen így lesz azon m' pont, melyben az M ponton keresztül a $F'VS$ -ra bocsájtott merőleges ez utóbbi síkot éri, az M pont *függvetülete*, az Mm' merőleges pedig a *függvetítő vonala*.

Ha az Mm , és Mm' vetítő vonalakon keresztül egy síkot képzelünk fektetve, mely a vetületi tengelyt m'' -ben metszi át, akkor térmértani elvek szerint ezek sík a VT -re merőleges; ugy szinte az ezen sík, és a vetületi lapok metszése által eredt mm'' , és $m'm''$ vonalak is merőlegesek az alapmetszetre.

Az Mm , vagy a vele egyenlő $m'm''$ fekvetítő vonal tehát nem egyéb, mint az adott M pont magassága a FVS felett, a függvetítő mm'' pedig az adott M pont távolát jelenti a $F'VS$ -tól.

Képzeljük most már a $F'VS$ -ot a VT körül addig forgatva, míg az a FVS -kal egyesül, akkor ezen forgatás alatt az $m'm$, és $m'm'$ vetítő vonalak folytonosan merőlegesek maradnak a VT -re, és a két sík egyesülése után egy egyenesbe esnek össze.

A 2-ik ábrában azon eset van előállítva, hol a vetületi síkok már egyesültek, VT az alapmetszet, (m, m') pedig a térbeni M pont vetületei; $m''m$ az említett M pont távolát je-

lenti a $F'VS$ -tól, $m''m'$ pedig az M pont magasságát jelenti az m pont felett.

Könnyű már most a mondottakból azon szabályt következtetni, hogy *bármely pont vetületeinek összeköttetési vonala merőleges a vetületi tengelyre.*

2. Vegyük már most az M pontot úgy fel, hogy az a FVS -on felől, de a $F'VS$ -on hátul essék, vagyis, legyen M egy második negyedbeli pont, akkor (3-ik ábra) meghuzván M -ből az Mm és Mm' merőlegeseket, míg ezek a vetületi lapokat az m , és m' pontokban át nem döfik, azután pedig a $F'VS$ -ot a VT körül addig forgatván, míg az a FVS -ra nem esik, tüstént kiviláglik, hogy ez esetben az $m''m'$ fekvetítő, az $m''m$ függvetítőt fedni fogja, és így a 4-ik ábrában, hol a vetlapok már egyesültek, az M pont mindkét vetülete a VT fölé esik.

Ez utóbbi képből már világosan látható, mennyire fontos a betűk jegyzése, hogy a vetületeket mindenkor első pillanatra meg lehessen egymástól különböztetni. A bevett szokást követve, jelen munkában is mindenütt a valódi pontot az ABC nagy betűivel, a fekvetületeket ugyanazon de kis betűkkel, a függvetületeket pedig szintén kis betűkkel ugyan, de vesszővel jelölve fogjuk megnevezni. Ha ugyanazon pont vetülete kívántatnék egy más, segéd vetületi lapra, akkor ezt megfelelőleg görög, vagy német betűvel fogjuk jelölni, és pedig szinte vesszővel, vagy a nélkül, a mint vagy a függ, vagy a fekvetület kívántatik.

3. Ezen elvek kellő alkalmazásával következtetjük, hogy (5-ik ábra) (m, m') egy III. negyedbeli, (p, p') pedig egy IV. negyedbeli pont vetületei.

4. Ha a pont magokban a vetületi síkok egyikében van, akkor az egyennevű vetülete maga a pont, a másik vetülete pedig a VT -be esik; így (Q, q') a fekvetületi síkban, (r, R') pedig a függvetületi síkban fekszik.

5. Végre ha a pont a VT -ben volna megadva, akkor annak mindkét vetülete a valódi ponttal egybeesik.

§. 3.

Az egyenes vonal vetülete.

Ha a térbeni vonalon keresztül egy síkot vezetünk me-

rölegetesen a FVS -ra, akkor azon egyenes, melyben ez utóbbi sík metszetik, a vonal fekvetületének mondatik. — Hasonlóan ered egy vonal függvetülete, ha a vonalon keresztül egy sík vezetetik merőlegetesen a $F'VS$ -ra.

Azon síkok, melyek a vonalon keresztül tétetnek merőlegetesen a vetületi síkokra, *vetítő síkoknak* neveztetnek.

A vonal fek-, vagy függ-vetülete tehát nem egyéb, mint a fek- vagy függvetítő síkjának metszete a fek-, vagy függvetületi lappal.

Az egyenes vonal vetülete tehát szinte egyenes vonal lévén, annak meghatározására két pont elégséges. Vegyünk tehát fel az adott vonalban két tetszőleges pontot, vetítsük azokat és kössük össze a nyert vetületeket, lesz a két pont fek vagy függvetületeinek összeköttetési vonala megfelelőleg a vonal fek- vagy függvetülete; így (6 ábra) (mn , $m'n'$) egy térbeni MN vonal vetületei.

Hogy a térbeni MN vonalat világossan képzelhessük, gondoljunk magunknak az m és n pontokban a feklapra merőlegeteket emelve, melyek nagysága illetőleg $m'm'$, és $n'n'$, akkor az m' és n' összeköttetési vonala lesz a valódi vonal; szintűgy fordítva, ha az m' és n' pontokban képzelünk emelve $m''m$, és $n''n$ hosszáságú merőlegeteket a függlapra, akkor az m , és n végpontok összekötve adják meg a vonal valódi állását.

Két vetület által az egyenes vonal tökéletesen meg van határozva; (kivéven azon esetet, mely a jövő §. 4-ik pontjában van tárgyalva,) és ha a vonalban levő valamely R pont egyik vetülete r -ben, vagy r' -ben adatnék, annak másik vetületét már könnyű az által meghatározni, hogy az adott vetületből merőleget bocsájtunk a VT -re, és ezt addig hosszítjuk, míg a vonal adott másik vetületét nem metszi; e metszési pont lesz a keresett másik vetület.

4. §.

Az egyenes különböző állásai a vetületi síkokhoz.

1. Ha az egyenes párhuzamos a fek-[függ]-vetületi síkkal, 7-ik ábra, (ab , $a'b'$), (cd , $c'd'$)), akkor párhuzamos ezzel a

függ-[fek]-vetítő sík is, ez utóbbinak metszete tehát a $F'VS$ -al [FVS -al], mi nem egyéb, mint az adott vonal függ-[fek]-vetülete, párhuzamos a vetületi tengellyel; holott a fek [függ] vetület az adott vonal irányával azonos.

2. Ha az egyenes magában a fek [függ] vetületi síkban fekszik, 8-ik ábra, $(ab, a'b')$, $[(cd, c'd')]$, akkor a függ [fek] vetítő síkja összeesik a FVS -val, [$F'VS$ -al], az ily egyenes függ [fek] vetülete tehát beleesik a vetületi tengelybe.

3. Ha az adott egyenes merőleges a FVS -ra [$F'VS$ -ra], 9-ik ábra, $(ab, a'b')$, $[(cd, c'd')]$, akkor a fek [függ] vetülete egy pontban egyesül, függ [fek] vetülete pedig merőleges a VT -re.

4 Ha az adott egyenes merőleges a VT -re, (akár metszi azt, akár nem,) akkor a közös vetítő sík metszete a vetületi síkokkal, tehát az egyenes mind két vetülete, szintén merőleges a VT -re, 10-ik ábra, $(ab, a'b')$. Az ily egyenes a két vetülete által meghatározva nincsen, mert a vonal állását a közös vetítő síkban tetszőlegesen változtathatja a nélkül, hogy vetületei változnának. Hogy ezen vonal állása meg legyen határozva, kell benne adva lenni két pontnak; legyenek ezek vetületei: (a, a') és (b, b') . Ha már most egy tetszőlegesen felvett (g) fekvetülethez, a hozzá tartozó függvetület kerestetné, képzeljük a vetítő síkot az (ab) fekvetület körül a FVS -ba lefordítva. Ezen fordultnál az A és B pontok oly negyed köríveket irnak le, melyek síkjai a $F'VS$ -kal párhuzamosak, melyeknek függvetületei tehát a valódi körívekkel azonosak; és $a'a''$ és $b'b''$ által vannak képviselve; fekvetületeik pedig a VT -lyel párhuzamos egyenes vonalak, ugymint aA , és bB ; a lefordított egyenes állása tehát AB , miért is a felvett (g) fekvetületnek megfelelő valódi pont: G . Ha már most a vonalat ismét előbbi állásába visszafordítva gondoljuk, akkor a G pontnak megfelelő körív, a (g) pontnak megfelelő (g') függvetületét fogja meghatározni.

Természetes, hogy a vetítő síkot, ugyanezen elvek szerint a $F'VS$ -ba szintén be lehet az $(a'b')$ függvetület körül fordítani; az eljárás az előbbivel azonos, csak fordított értelemben, úgy hogy most a negyed körök a fekvetületben látszatnak valódi nagyságokban, holott azok függvetületei a VT -lyel

párhuzamos egyenes vonalak; a munkálat kivételét azonban a szorgalmas kezdőre hagyjuk.

5. §.

Az egyenes átmenete a vetületi síkokon, vagyis a nyom.

1. Ha egy adott MN vonal, 6-ik ábra, mind addig hosszabbítatik, míg a FVS -ot [$F'VS$ -ot] nem éri, akkor az így nyert átdőfési pont fek-[függ]-nyomnak neveztetik. Ezen nyom meghatározása okáért hosszabbítsuk meg a vonal függ [fek] vetületét, míg az a VT -t p' -ben [q -ban] nem éri, emeljünk p' -ben, [q -ban] merőlegest a VT -re, ennek P [Q'] metszése a vonal fek [függ] vetületével lesz a keresett fek [függ] nyom.

(P, p') [(q, Q')] ugyanis az adott vonal pontja, de egyzersmind pontja a FVS -nak [$F'VS$ -nak] is, mert függ-[fek]-vetülete a VT -be esik, s azért nem egyéb, mint a vonal és a FVS ($F'VS$) átdőfési pontja, vagy is a nyom.

Ugyanezen elv szerint határoztattak meg a 11-ik és 12-ik ábrában a (P, p' és q, Q') vonalak nyomait, csak hogy a 11-ik ábrában a vonal fekvőnyoma a $F'VS$ -on túl, a 12-ik ábrában pedig a függnyom a FVS alá esik.

2. Hogy az előbbi czikk 4-ik pontjában említett vonal nyomait feltaláljuk, 10-ik ábra, fordítsuk azt ismét fekvetülete körül a FVS -ba, hosszabbítsuk meg azután mind addig, míg a fekvetületet P -ben, a VT -t pedig q'' -ben nem metszi; a visszafordításkor P pont mozdulatlan marad, mert magában a forgási tengelyben fekszik, q'' pedig a $F'VS$ -ban mozogván a Q' pontot határozza meg; lesz P a keresett fekvőnyom, Q' pedig a függnyom.

3. Az egyik vetületi síkkal párhuzamos vonalnak csak egy nyoma lehet; ha pedig a vonal párhuzamos a VT -lyel, akkor egy nyoma sincsen.

6. §.

A vonal valódi hossza és hajlási szöge.

A határozott nagyságú egyenes vonal vetülete bármely síkra két szorzó által fejeztetik ki, melynek egyike a vonal

valódi hossza, a másik pedig a vonal hajlási szögének pótkeble, vagy is áll :

$$p = P \cdot \cos \alpha$$

hol P a vonal valódi hosszát, p annak vetületét azon síkon jelenti, melyhez α szög alatt hajlik. Ezen egyenletből kitetszik, hogy a vetület a valódi hossznál annál kisebb, mentől nagyobb az α hajlási szög, és hogy a vetület a valódi hosszzal csak akkor egyenlő, ha a hajlási szög $\alpha = 0$, vagy is, ha a vonal a vetületi síkhoz párhuzamos.

Ezen elmélkedés folytán könnyű lesz azon feladat megoldása, mely szerint egy határozott nagyságú vonal két vetületéből a valódi hosszának meghatározása kívántatik. Mert képzeljük az adott vonal egyik végpontját mozdulatlanak, a vonalat magát pedig, állandó fekhajlás mellett, mind addig forgatva, míg az a $F'VS$ -al nem párhuzamos, akkor ezen állásban a vonal függvetülete a valódi hosszal egyenlő fog lenni.

Legyenek például a 13-ik ábrában (ab , $a'b'$) egy adott AB vonal vetületei, s vegyük benne a (b , b') végpontot állandónak, akkor a másik (a , a') végpontja egy vízirányos (ac , $a'c'$) körívet irand le; a vonal azon állásának vetületei tehát, melyben a $F'VS$ -al párhuzamos, lesznek: (bc , $b'c'$), melyben tehát a $b'c'$ függvetület egyszersmind az adott vonal valódi hosszával egyenlő.

Ezen eljárást figyelembe vévén, könnyen következik e következő szabály: A vonal valódi hossza egyenlő azon derékszögű háromszög átlójával, melynek egyik befogója a fekvetület, a másik befogója pedig azon különbség, mely ered, ha a vonal végpontjai magasságát a FVS felett egymásból levonjuk.

7. §.

Az említett eljárás által a vonal valódi hosszán kívül egyuttal a vonal fekhajlási szöge is feltaláltatott; ugyanis, ha a vonal a $F'VS$ -hoz párhuzamos, akkor párhuzamos az e síkrai vetületével is; de párhuzamos vonalak hajlásai ugyanazon síkhoz egyenlők, miért is a 13-ik ábrában $b'c'd'$ nem egyéb, mint az AB vonal fekhajlási szöge.

8. §.

A helyett, hogy az adott vonalat addig forgattuk, míg az a $F'VS$ -kal nem lett párhuzamos, ugyanazt oly állásba is lehetett volna hozni, hol a FVS -kal párhuzamos, (ad , $a'd'$), mi által ad -ben szintén a vonal valódi hosszára, az adb szögben pedig az AB vonal függőhajlási szögére jutunk.

A 6-ik cikkben említett szabályt tehát még így is ki lehet fejezni: A vonal valódi hossza egyenlő azon derékszögű háromszög átlójával, melynek egyik befogója a függvetület, másik befogója pedig azon különbség, mely ered, ha a végpontok távolsága a $F'VS$ -tól egymásból levonatik.

9. §.

A vetületi síkok átváltoztatása.

Gyakran történik, hogy a feladatok könnyítése miatt a vetületi síkoknak új állás adatik.

1. Ha a fekvetületi sík marad, de a $F'VS$ helyét változtatja, maradván mindazonáltal merőleges a FVS -ra. — Legyenek a 14-ik ábrában (a , a') az A pont vetületei, és vitéssék át a $F'VS$ azon állásba, a melynél a vetületi tengely: VT' , akkor az A pont fekvetülete marad a -ban, függvetületének pedig azon merőlegesben kell feküdnie, melyet a fekvetületből, jelen esetben a -ból, huzunk a $V'T'$ -re.

Minthogy azonban a $F'VS$ változtával az A pont $a''a'$ magassága nem változott, csak ezt a magasságot kell a'' -tól a' -ig az új rendszerben felrakni; lesznek (α , α') az A pontnak új vetületei.

2. Ha a $F'VS$ marad, és a FVS hozatik oly állásba, melynél, 15-ik ábra, az alapmetszet $V'T'$ -be jut, akkor az előbbi eljárás csak megfordítatik, minek kivitele után az A pont új vetületei lesznek: (α , a').

3. Ha mind a két vetületi síknak új állást kellene adni, akkor a két változás egymásután vitetik véghez, az előbb említett elvek szerint. Magában érthető, hogy az átváltoztatás eredménye mindig ugyanaz marad, bármely rendben vitetik is az végbe.

4. Már könnyű lesz az átváltoztatási elvet vonalakra is alkalmazni, tudván azt, hogy a vonal két benne fekvő pont által tökéletesen meg van határozva. Válasszunk ugyanis az adott vonalban két tetszőleges pontot, keressük meg azoknak új vetületeit, melyeket összekötve már a kívánt új vetületeket fogjuk megnyerni.

10. §.

Ha a most kifejtett elvek szerint volna például a vonal valódi hossza az adott vetületeiből keresendő, 13-ik ábra, akkor legegyszerűbben az új $V'T'$ -t a vonal adott fekvetületébe lehetne helyezni, mi által az új függvetület volna AB ; — de ezen függvetület a vetületi síkban magában lévén, egyszersmind a vonal valódi nagyságát, úgy szinte a FVS -hozi hajlást is megadja.

A kezdő igen czélszerűen fogja ezen az uton felkeresni a vonal hajlását a $F'VS$ -hoz is.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Feladatok elvarhely

11. §.

1. Adva van egy vonal fekvetülete, függvetületének egy pontja, és a vonal valódi hossza, kerestetik a függvetület.

2. Egy vonal, melynek vetületei advák, osztassék két oly részre, melyek egymáshoz úgy viszonylanak, mint két adott vonal; kerestetnek az osztó pont vetületei.

3. Adva van egy vonal fek [függ] vetülete, függ [fek] vetületének egy pontja, és a fek [függ] hajlás, kerestetik a függ [fek] vetület.

4. Adva van egy vonal fek [függ] vetülete, függ [fek] vetületének egy pontja, és a függ [fek] hajlási szög, kerestetik a másik vetület.

5. Egy vonalból, melynek vetületei advák, egy adott nagyságu részt levágni.

12. §.

6. Egy ponton keresztül vitessék egy vonal, melynél a fek, és függ hajlási szögek advák.

1-ső *Feloldás*. Legyen (a, a') , 16-ik ábra, az adott pont, α a fek, β a függ hajlási szög. — Képzeljük a keresett vonalat, állandó fek hajlás mellett az A pont körül mindaddig forgatva, míg az a $F'VS$ -kal nem párhuzamos, akkor ez állásban a függ vetülete a VT -el az adott α szöget fogja képezni, melyet tehát a' -nél szerkeszthetünk. Ha már most a vonal valódi állásába visszafordítatik, akkor egy benne tetszőlegesen felvett (d, D') pont egy fekmentes körivet ír le, melynek fekvetülete dg , függvetülete pedig a VT -el purházamos $D'g'$.

Ha továbbá szintugy képzeljük a vonalat állandó függ hajlás mellett A pont körül addig forgatva, míg az a FVS -kal nem párhuzamos, akkor a -nál lesz a β függ hajlási szög valódi nagyságában szerkesztendő. A visszafordulásnál az előbb választott D pont, (hol tehát $a'D' = aD$) szinte körivet ír le, mely most a $F'VS$ -kal párhuzamos, s melynek vetületei tehát: $(Dh, D'h')$.

Minthogy azonban a D pont vetületeinek nemcsak a $(dg, D'g')$ vonalban, hanem egyszersmind a $(Dh, d'h')$ -ben is kell feküdniök, ezek csak az említett vonalak (δ, δ') metszésében lehetnek; ezen pontok tehát, a forgás alatt mozdulatlanul maradt (a, a') ponttal összekötve adják meg a vonal keresett $(a\delta, a'\delta')$ vetületeit.

Probául szolgál, hogy a δ , és δ' pontok összeköttetési vonalának a VT -re merőlegesnek kell lenni.

2-ik *Feloldás*. Legyen ismét, 17-ik ábra, (a, a') az adott pont, s képzeljük a szerkesztendő vonalat az $a'a''$ körül, állandó fekhajlás mellett addig forgatva, míg az a $F'VS$ -kal nem párhuzamos, mely állásban, az adott α szög alatt, szerkeszthető; vetületei ugyanis $(ad, a'D')$; — visszafordulásakor a tetszőlegesen választott (d, D') egy fekmentes körivet fog leírni. — Szerkesszük azután a vonalat azon állásában, hol a FVS -párhuzamos, állandó függ hajlás mellett, legegyszerűbben D pont magasságában, fekvetülete lesz kl , függvetülete pedig a $D'g'$ egyenesbe esik; kl vonalra felrakván $a'D'$ valódi hosszát l -ig, l pontnak a g körívbe kell esni, minek elérésére csak l -en keresztül a VT -hez párhuzamos vonandó, míg ez a g körivet D -ben nem metszi, lesz Dm a vonal valódi hossza, a kellő ál-

lásában. D pont d' vetületét összekötve α' -el, szinte D -t a -val, megadják a vonal keresett vetületeit.

Probául szolgál, hogy $d'm' = d'a'$. (Lásd a 6. 7. és 8. §§. 13. ábra.)

Jegyzés. 1. Jelen feladatnak négy oldása lehetséges, melyeket az által fogjuk megnyerni, ha a (g, g') körivet addig hosszabbítjuk, míg a hD , vagy illetőleg lD egyenestől másod ízben is metszetik; mi által a feladat második oldása nyeretik; a még hátra levő két oldást pedig úgy hozzuk létre, ha az adott β szöget a VT felé eső oldalra szerkesztjük.

Jegyzés. 2. A feladat oldása lehetlenné válik, ha az adott hajlási szögek összege 90 fokot túlhalad. $D'g'$ vonalnak ugyanis a 16-ik ábrában a $d'h'$ körivet metszeni kell, mi a már felvett α szög nagyságánál csak akkor lehetséges, ha $a'd' > \alpha'g'$; de ha a β szög nagyobbítatik, $a'd'$ kisebbedik, és ha $\beta = 90 - \alpha$, akkor $a'g'D'$ és arD háromszögek azonosokká válnak, és ekkor $a'd' = \alpha'g'$, és így $D'g'$ egyenes a körívét már csak érinteni fogja; és a keresett vonal vetületei merőlegesek lesznek a VT -re. Ha pedig β szög még mindig nagyobbodik, akkor $a'd' < \alpha'g'$, a vonal és kör többé egymást nem metszik, és így a feloldás lehetetlen. Hasonló vizsgálatok ugyanezen eredményre vezetnek a 2-ik feloldásnál is. (17. ábra.)

13. §.

Párhuzamos vonalak.

Ha két egyenes párhuzamos, akkor párhuzamosak a rajta keresztül vezetett vetítő síkok is, úgy szinte ezeknek metszetei a vetületi síkokkal; de ezen metszettek nem egyebek, mint a vonalak vetületei, miért is: Párhuzamos vonalak vetületei szinte párhuzamosak.

Fordítva, ha két vonalnak mind a két vetülete párhuzamos, akkor a vonalak magok is párhuzamosak. Mely általános szabálytól azonban kivételt képez azon egy eset, ha az adott párhuzamos vetületek merőlegesen állanak a VT -re; a mely esetben a vetítő síkok lefordítása által fogjuk csak megítélni, vajjon az adott vonalak párhuzamosak-e, vagy nem.

14. §.

Egymást metsző vonalak.

Ha két térbeni vonal egymást átmetszi, akkor azok vetületei is átmetszik egymást mind a két vetületi síkban; és a metsző pontok összeköttetési vonala merőleges lesz a VT -re, mert a metszési pont a két vonal közös pontja lévén, e pont vetületei is közösek lesznek mind a két vetületi síkban.

Ha a vetületek egymást átmetszik ugyan, de a metszési pontok összeköttetési vonala nem merőleges a VT -re, akkor a térben a két vonal egymást nem metszi át.

15 §.

A síkok elmélete, és előállítási módja.

A határnélküli síkok előállításánál csak azok metszete fordul elő a vetületi síkokkal, mely metszetek megfelelőleg: *fekszeldének*, vagy *függszeldének* neveztetnek.

Mind a két szelde ugyanazon pontban metszi át a vetületi tengelyt, mert ha a 18-ik ábrában VT az alapmetszett, F^vS pedig valamely síknak függszeldéje, akkor az S pont, mint az adott síknak és a FVS -nak közös pontja egyszersmind a felszeldének is egy pontja, mi csak úgy lehetséges, ha az FS fekszelde szinte az S ponton megy keresztül.

Feltéven, hogy a két szelde a VT -nek nem ugyanazon egy pontjában egyesülni, akkor ebből az következne, hogy a VT az adott síkot két különböző pontban dőfné keresztül, a mi lehetetlen.

A síkot úgy lehet képzelni, mintha az egy egyenes (az alkotó) mozgása által létesült volna, mely magamagával párhuzamosan egy másik mozdulatlan egyenesen (az irányvonalon) maga után nyomot hagyva, halad. — Ha például a fekszelde irányvonalnak, a függszelde pedig alkotónak tekintetik, akkor képesek vagyunk az alkotót minden egyes helyzetében előállítani; mert az F^vS alkotó függvetülete maga az F^vS vonal, fekvetülete pedig a VT -be esik; minthogy azonban az alkotó minden helyzetében az eredeti állásával párhuzamos, a párhuzamos vonalak vetületei pedig szintén párhuz-

mosak, azért az alkotónak függvetülete párhuzamos leend a függszeldével, fekvetülete pedig az alapmetszettel. Így például (Ab , $a'b'$) egy alkotónak vetületei, vagyis egy oly vonalnak, mely az adott síkban fekszik, és a $F'VS$ -kal párhuzamos.

Fordítva, lehet az $F'S$ az irányvonal is, és FS az alkotó, akkor az alkotó bármely helyzetbeni függvetülete lesz párhuzamos a VT -lyel, fekvetülete pedig párhuzamos a fekszdével; (cd , $C'd'$) egy ily alkotó vetületei, vagy is egy oly vonalé, mely az adott síkban fekszik, és egyszersmind a feklappal párhuzamos.

16. §.

A sík különböző helyzete.

Ha a sík merőleges a $F'VS$ -ra, akkor annak fekszdéje merőleges az alapmetszetre, (19-ik ábra, a), mert ha két sík, ($F'SF$, és FVS), egy harmadikra ($F'VS$) merőleges, akkor azok metszövonalá is merőleges ezen síkra, de ha egy vonal merőleges a $F'VS$ -ra, akkor annak fekvetülete merőleges a VT -re.

Székelyudvarhely

Ha a sík merőleges a FVS -ra, akkor annak függszeldéje merőleges a VT -re. (19-ik ábra, b).

Ha a sík merőleges a VT -re, akkor annak mind a két szeldéje merőleges a VT -re (19-ik ábra, c).

Ha a sík párhuzamos a FVS -kal [$F'VS$ -kal], akkor a $F'S$ [FS] párhuzamos az alapmetszettel, FS -je [$F'S$ -je] pedig nincs. (20-ik ábra, f és h).

Ha a sík párhuzamos a VT -lyel, akkor párhuzamos ezzel annak mind a két szeldéje. (19-ik ábra, d.)

Ha a sík az alapmetszeten megy keresztül, akkor a két szelde az alapmetszeten egyesül. (20-ik ábra, k.)

Az a), b), és d) alatti síkok egyszerűen részsut síkoknak is szoktak nevezettni, az e), g), és i) alattiak pedig kétszeresen részutaknak, és pedig a g) sík, melynél a szeldék ugyanazon egy oldal felé hajlanak, támasztott síknak, az e) és i) síkok pedig, melyeknél a szeldék jobbra és balra térnek el egymástól, feszített síkoknak szoktak mondatni.

17. §.

Feladatok.

1. Van adva egy sík, és egy benne fekvő pontnak fekvetülete, kerestetik ezen pontnak függvetülete.

Legyen a 21-ik ábrában FSF' az adott sík, és (a) a benne fekvő A pontnak fekvetülete. Képzeljünk az A ponton keresztül vezetve egy oly alkotót, mely a FS -vel párhuzamos, lesznek ennek vetületei a 15-ik cikk szerint $(ac, a'C')$; az A pontnak tehát, mint ezen alkotó egy pontjának, függvetülete, az $a'C'$ vonalban, de egyszersmind az (a) -ból a VT -re bocsájtott merőlegesben is fog feküdni, miért is a keresett vetület e vonalak közös (a') metszésében fog lenni.

Magától érthető, hogy az FS -hez párhuzamos alkotó helyett amazt is lehetett volna venni, mely az $F'S$ -el párhuzamos.

De lehet az A ponton keresztül, az alkotók helyett bármely más, a síkban fekvő vonalat választani; ennek fekvetülete lehet egy tetszőleges Mn vonal, mely az (a) ponton keresztül vezetett; függvetületét pedig könnyen szerkesztjük, ha meggondoljuk, hogy M pont függvetületének a VT -be, az (n) ponténak pedig a $F'S$ -be kell esnie.

2. Megvizsgálandó, valjon egy vetületei által adott pont, egy szintén adott síkban fekszik-e vagy nem?

3. Megvizsgálandó, valjon egy vetületei által adott vonal egy szintén adott síkban fekszik-e vagy nem?

4. Megvizsgálandó, valjon egy vetületei által adott vonal egy szintén adott síkkal párhuzamos-e, vagy nem.

5. Egy adott síkhoz, egy adott ponton keresztül egy párhuzamos egyenes vonalat húzni.

18. §.

A sík helyzetének meghatározása.

A sík két egymást metsző egyenes által tökéletesen meg van határozva, tehát szeldéi is előállíthatók. Ha a 22-ik ábrában $(ab, a'b')$ és $(cd, c'd')$ a két adott vonal, melyek egymást O pontban átmetszik, akkor az ezen vonalak (a) és (d) fekvőmain keresztül vezetett SF vonal lesz a keresett sík fekszel-

déje, a (c') és (b') függnyomokon keresztül vont SF' vonal pedig ugyanannak függszelvéje; (a) és (d) pontok ugyanis mint az adott vonalak pontjai egyszersmind a keresett sík pontjai is; s minthogy az említett pontok a hozzátartozó vonalak fekvőnyomai, azért azok szinte a fekvetületi sík pontjai is; de a keresett sík, és a fekvetületi sík közös pontjai a fekszelvét képezik, azért az (a) és (d) ponton keresztül vont SF' vonal valóban a keresett fekszelde leendő. — Ugyanez áll SF' függszelvééről is. — Minthogy azonban a két szelvének egymást a VT' -ben kell metszeniök, a függszelvé meghatározására elegendő, ha az adott vonalak közül csak egyikének kerestetik meg a függnyoma.

Gyakran megtörténik, hogy az adott vonalak egyikének nyoma a rajztéren túl esik, mint például a 23-ik ábrában, hol $(ab, a'b')$ és $(cd, c'd')$ az adott egyenesek, melyeknél az $(ab, a'b')$ (a) nyoma ugyan feltalálható, de a $(cd, c'd')$ nyoma igen messzire esnék, és a hegyes metszés miatt ugy is bizonytalan. — Ilyenkor még egy $(gh, g'h')$ segédvonal húzatik, mely szinte a keresett síkban fekszik; lesz ismét az (a) és (k) fekvőnyomokon keresztül vezetett FS vonal a fekszelvé, SF' pedig a függszelvé. A $(gh, g'h')$ vonal meghatározására pedig csak arra kell megemlékeznünk, hogy ennek, mind a két adott vonalat, mint ugyanazon síkban levőket, metszeni kell; miért is a (gh) fekvetületet felvehetjük ugyan tetszőlegesen, de a függvetületét a (g, g') és (h, h') metszés pontok vetítése által kell meghatároznunk.

Ha mind a két fekvőnyom ki esnék a rajztérről, akkor csak az előbb említett mód szerint két segédvonalat kellene felvenni.

Ha azonban már az egyik szelvé meg volna határozva, és csak a másik vetületben hiányzanak a nyomok, akkor legegyszerűbben a sík egy tetszőleges pontján keresztül egy alkotó vonatit, ennek nyoma azután a keresett szelvének egy pontja leendő.

Ha két egymást metsző vonal helyett, két párhuzamos volna adva, akkor a rajtok keresztül képzelt sík szelvéi meghatározására nézve, szinte az előbbi eljárás követendő.

A sík állása meg van akkor is határozva, ha csak egy

egyenes adatik, és kivüle még egy pont. Ez esetben összekötetik az adott pont a vonal egy tetszőleges pontjával, és az így nyert két egymást metsző vonalon keresztül vezettedik a sík. — Ha az adott pont magában az adott vonalban feküdnek, a feladat határozatlan.

Adathatik még a sík meghatározására három nem egy vonalba eső pont is; de ezen eset ismét a két egymást metsző vonalra vezettethetik vissza az által, hogy az adott pontok egyikét a másik kettővel összekötjük.

19. §.

Feladat. Egy adott A vonalon keresztül vezettedék egy oly sík, mely egy más adott B vonallal párhuzamos.

Feloldás. Az A vonal tetszőleges (c, c') pontján (24-ik ábra) huzatik egy B -vel párhuzamos vonal, és az így nyert két egymást metsző vonalon keresztül vezettedik a FSF' sík, mely sík az A vonalat magába foglalván, egyszersmind B -hez párhuzamos leend, minthogy a benne fekvő C vonal B -hez párhuzamos.

Huász Bezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

20. §.

Síkra merőleges vonal.

Ha egy vonal merőleges egy adott síkra, akkor vetületei merőlegesek az illető szeldékre. — Legyen a 25-ik ábrában FSF' az adott sík, és $(ab, a'b')$ egy vonal, mely a síkra merőlegesnek tételeztetik fel; akkor az $(ab, a'b')$ vonal fekvetítő síkja (bad) merőleges először a FVS -ra, mint fekvetítő sík, de merőleges másodszor az adott FSF' síkra is, mert az $(ab, a'b')$ vonal, melyen keresztül megy, szinte merőleges az FSF' síkra; de ha egy sík merőlegesen áll két más síkra, akkor az merőlegesen áll ez utóbbiak közös metszésére is; így hát az $(ab, a'b')$ vonal fekvetítő síkja merőleges az FS szeldére. — De ha FS merőleges a (bad) síkra, akkor merőleges az mindazon vonalakra, melyek ugyanazon síkban az FS átdőfési (G) pontján keresztül vezettedhetnek, s így FS merőleges (ab) -re is. Ugyanezen elv szerint SF' is merőlegesen áll az $(a'b')$ vonalra.

21. §.

Feladat. Egy adott ponton keresztül vezetessék egy sík merőlegesen egy szintén adott vonalra.

Feloldás. A 26-ik ábrában (a, a') az adott pont, (b, b') az adott egyenes. Fektessünk az (a, a') ponton keresztül egy oly fektentes vonalat, mely a keresett síkban fekszik; ezen vonal függnyomán keresztül azután csak merőleget kell vonni a vonal függvetületére, hogy az illető szeldét megkapjuk. — Az említett vonalat pedig könnyű azon megjegyzés folytán szerkeszteni, hogy fekvetülete párhuzamos a keresett fekszel-déhez, és azért merőleges az adott (b, b') vonalra; függvetülete pedig párhuzamos a VT -lyel.

Az (a) ponton keresztül vonatik tehát először (ac) merőlegesen (b) -re, (a') ponton keresztül pedig $(a' c')$ párhuzamosan a VT -lyel, a nyert (c') nyomon keresztül vonatik SF' merőlegesen, (b') -re, S ponton keresztül pedig SF merőlegesen (b) -re; lesznek FS , és $F'S$ a keresett sík szeldéi. — Ha az S pont igen távolra esnék, akkor az (a, a') ponton keresztül még egy vonal vezetettik, mely szinte a keresett síkban fekszik, és a mely a $F'VS$ -kal párhuzamos hely.

Az eljárás azonos marad az előbbivel még akkor is, ha az adott pont magában az adott vonalban fekszenék.

22. §.

Párhuzamos síkok.

Párhuzamos síkok szeldéi szinte párhuzamosok. Mert ha az adott két párhuzamos sík a FVS -kal metszetik, akkor a metszési vonalak szinte párhuzamosak; de ezen metszési vonalak képezik éppen a síkok fekszel-déjét, azért ezen fekszel-dék szinte párhuzamosak. Ugyanez áll a függszeldékről is.

23. §.

Egymásra merőleges síkok.

Egy sík akkor merőleges egy másik adott síkra, ha az egy vonalon megy keresztül, mely az adott síkra merőleges. Természetes, hogy ez által a sík állása még tökéletesen meg-

határozva nincsen. — Így ha a 24-ik ábrában FSF' az adott sík, a melyre egy merőleges sík szerkesztendő, akkor először huzatik egy merőleges vonal (Ab , $a'B'$) a síkra, és meghatározatnak ennek A , és B' nyomai, a melyek a tengelynek egy tetszőleges C pontjával összekötve, fogják a kívánt merőleges síkot (ACB') meghatározni.

24. §.

Két sík átmetszése.

Két sík metszési vonala mindég egyenes; ennek pedig meghatározására elegendő, ha két pontjának helyzete ismeretes.

A szeldék átmetszési pontjai egyszersmind az adott síkok közös pontjai; miért is a keresett metszővonal meghatározására csak ezen pontok vetületeit leendő szükség összekötni.

Így ha a 28-dik ábrában FSF' és $F_1S_1F_1'$ a két adott sík, akkor a fekszeldék egymást A -ban metszvé, lesznek (A , a') ezen metszési pont vetületei, épen így (b , B') a függszeldék metszési pontjának vetületei; ha tehát e két pont fekvéseit, úgy szinte függvetületeit összekötjük, lesznek (Ab , $a'B'$) a keresett átmetszési vonal vetületei.

25. §.

Ha az adott síkok egyike párhuzamos a FVS -kal, akkor a metszési vonal meghatározására csak egy pont szolgálhat, ugyanis a függszeldék átmetszése (b , B') a 29-ik ábrában; minthogy az $F_1'S_1$ síknak fekszeldéje nincsen. De ez esetben a keresett metszési vonal a FVS -kal párhuzamos, minthogy az egy oly síkban fekszik, mely maga párhuzamos a FVS -kal, s minthogy azonfelül a metszési vonalnak az FSF' síkban is kell feküdnie, azért az ezen síknak (b , B') pontján keresztül vezetett alkotója leendő, melynek tehát fekvése (bc) párhuzamos az FS szeldével, függvetülete ($B'c'$) pedig beleesik az adott $F_1'S_1$ szeldébe.

26. §.

Ha az adott szeldék az egyik vetületi síkban egymást a rajztéren kívül metszenék, mint a 30-ik ábrában az $F'S$, és

$F_1'S_1$ szeldék, akkor egy új segédsíkot veszünk fel ($F''S''$), mely a FVS -kal párhuzamos. Megkeressük ezen segédsík metszését mind a két adott síkkal, úgy szinte ezen metszési vonalak átvágási pontját, akkor ezen pont, mint az adott síkok közös pontja a síkok metszési vonalához fog tartozni. A nevezett ábrában ($ao, A'o'$) az FSE' és az $F''S''$ síkok metszési vonala; ($bo, B'o'$) pedig az $F_1S_1F_1'$ és az $F''S''$ síkoké; ezen metszési vonalak közös pontja tehát (o, o'), melyet végre az adott fekszeldék metszési (C, c') pontjával összekötve, megnyerjük az adott síkok ($Co, c'o'$) keresett metszési vonalát.

Ha a szeldék az egyik vetületi síkban se metszenék át egymást a rajztér határán belül, akkor a metszési vonal meghatározására két ily segédsíkot kell felvenni, melyek egyike legczél szerűbben a feklappal, a másik pedig a függlappal párhuzamos. Az eljárás a 31-ik ábrában van előállítva.

Ha a 32-ik ábrában az adott síkok fekszeldéi FS és F_1S_1 párhuzamosak, akkor a keresett metszési vonalnak ezen szeldékekkel szinte párhuzamosnak kell lenni; ennek meghatározására tehát csak az (A') ponton keresztül párhuzamos vezetendő a VT -hez, az (a) ponton keresztül pedig párhuzamos az adott szeldékhez.

27. §.

Ha a 33-ik ábrában mind a két adott sík FSE' és $F_1S_1F_1'$ a VT -lyel párhuzamos, akkor a metszési vonal meghatározására nézve vegyünk fel egy segéd síkot ($F''S''F'''$), mely a VT -re merőlegesen áll; határozzuk meg ezen sík metszéseit mind a két adott síkkal, úgy szinte a nyert metszési vonalak átvágási pontját; leend az így nyert pont, mint az adott síkok közös pontja, már a keresett metszési vonalnak egy pontja; s minthogy ez esetben a metszési vonal a VT -lyel párhuzamos, azért az, ezen egy pont által már tökéletesen meg lesz határozva. — Hogy a segéd $F''S''F'''$ sík átmetszéseit az adott síkokkal előállíthassuk, forgassuk ezen síkot az $F''S''$ szeldéje körül mind addig, míg az a FVS -kal össze nem esik. Ezen forgatás alkalmával a B és D pontok, mint a forgási tengely pontjai mozdulatlanul maradnak, az A' és C' pontok pedig a függvetületi síkban negyed köröket fognak leírni, úgy

hogy a lefordított A' pont a -ba, C' pont pedig c -be fog jutni. Az FSF' és a segéd sík lefordított metszési vonala tehát Ba , az $F_1S_1F_1'$ síké pedig Dc ; ezen metszési vonalak közös pontja pedig, szinte a feklapba befordítva M -be leend. Ha tehát a segéd síkot az eredeti állásába ismét visszafordítva képzeljük, akkor az M pont egy a függvetületi lappal párhuzamos negyed kört fog leírni, melynek vetületei Mm , és $m''m'$. Az (m, m') pont pedig a keresett metszési vonal egy pontja leend; a melynek vetületein keresztül tehát csak a VT -lyel párhuzamosokat kell vonni, hogy a metszési vonal vetületeit megnyerjük.

A VT -re merőleges $F''S''F'''$ segéd sík helyett lehetett volna bármely síkot is választani, ezen sík metszéseit az adott síkokkal meghatározni, és a metszési vonalak közös pontján keresztül párhuzamost vonni a vetületi tengelylyel.

28. §.

Feladat. 1. Egy adott ponton keresztül egy síkot vezetni, mely két adott síkra merőleges.

Feloldás. Legyenek a 34-ik ábrában FSF' és $F_1S_1F_1'$ az adott síkok és (a, a') az adott pont. Minthogy a keresett sík mind a két adott síkra merőleges, azért merőleges lesz az, az adott síkok metszési vonalára is. Megkeresztetik tehát először is az előbbieket szerint az adott síkok metszési vonala $(Cb, c'B')$; azután az adott ponton keresztül vezettetik erre a vonalra egy merőleges sík a 21-ik czikk értelme szerint.

Feladat. 2. Adva van három sík, kerestetik azok közös metszési pontja.

Feloldás. Megkeresztetik két-két sík közös metszési vonala, leend az így nyert vonalak átvágási pontja a keresett közös pont.

29. §.

A síkok hajlása a vetületi síkokhoz.

Két sík hajlási szögének meghatározására csak egy harmadik sík vezetendő merőlegesen a két adott sík metszési vonalára; ezen sík metszési vonalai az adott síkokkal már a kívánt hajlási szöget fogják bezárni.

Ha tehát a 35-ik ábrában FSF' egy adott sík, és azon szög kerestetik, melyet ez a FVS -kal képez, akkor e két sík metszési vonalára (FS -re) egy merőleges segéd sík $F_1S_1F_1'$ vezetendő, a mely azután az adott síkot és a vetületi síkokat egy derékszögű háromszög szerint metsz, melynek egyik befogója AS_1 , a másik pedig S_1B . — Ha tehát ezen háromszöget az AS_1 befogó körül a feklapba képzeljük befordítva, ered az AS_1B_1 derékszögű háromszög valódi nagyságában, és benne az S_1AB_1 a keresett fekhajlási szög. Ugyanazon derékszögű háromszöget a másik (S_1B) befogó körül a függlapba is lehet fordítani, hol azután a BA_1S_1 szinte a keresett fekhajlási szög leend.

A függhajlási szög meghatározására a függszeldecé kell egy merőleges $F''S''F'''$ síkot fektetni, és a kivágott derékszögű háromszöget ismét vagy a DS'' befogó körül a feklapba fordítani be, vagy a CS'' befogó körül a függlapba; ered C' vagy illetőleg C -nél a keresett függhajlási szög.

Jegyzés. Az α és β hajlási szögek összege nagyobb, mint 90 fok; mert az adott sík, a fekvetületi, és a függvetületi síkok egy háromlélű tömörszöget képeznek, melynél tehát a három hajlási szög összege nagyobb 180 foknál. De ezek közül a két vetületi sík hajlási szöge maga 90 fok, következik, hogy a másik két hajlási szög összege $\alpha + \beta > 90^\circ$.

Ezen hajlási szögek összege egyenlő 90 fokkal, ha az adott sík a vetületi tengelylyel párhuzamos; és ez esetben a két hajlási szög egy síkba esik, mely a VT -re merőleges, minden más esetben a két hajlási szög, két különböző síkba esik.

30. §.

Feladatok.

1. Van adva egy sík fekszeldecé SF (36-ik ábra), és a fekhajlási szög (α), kerestetik a függszeldecé.

Feloldás. A fekszeldecé egy tetszőleges F_1 pontján keresztül vezettedik rája egy merőleges $F_1S_1F_1'$ sík, mely az $F_1'S_1$ szeldecé körül a függlapba fordítatik be, mi által az F_1 pont F'' -be jut; F'' -nél szerkesztetik az adott α fekhajlási szög, melynek szára addig hosszabbítatik, míg az S_1F_1' -et F_1' -

ben nem éri; végre összekötvén F_1' -et S -el, lesz az összekötési vonal a keresett függszelde.

2. Adva van a függszelde, és a függhajlási szög, kerestetik a fekszelde.

3. Adva van a fekszelde, és a függhajlási szög, kerestetik a függszelde.

Feloldás. A vetületi tengely egy tetszőleges F_1 pontjában 37-ik ábra, szerkesztessék az adott hajlási szög (β) lefelé, és hosszabbítsák annak szára mindaddig, míg az adott szeldét F -ben nem metszi; a nyert F pontból merőleges bocsájtatik a VT -re S_1 -ig; az így nyert S_1 -ből mint középpontból egy körív iratik le S_1F_1 sugárral a melyhez azután S -ből egy érintő SF' vonatik, mely már a keresett függszelde leend. Az eljárás jogszerűsége könnyen következik az előbbi cikkből.

4. Egy adott ponton keresztül egy síkot vezetni, mely a vetületi síkokhoz adott hajlásokkal birjon.

Feloldás. Képzeljük a 38-ik ábrában az adott A ponton keresztül az FSF' síkot a kívánt feltételek alatt már meghuzva, úgy szinte az A ponton keresztül az FSF' síkra egy merőlegest emelve, (AP). Ezen merőleges fekvető síkja AMP egyszersmind az FSF' síkra is merőleges leend, minthogy egy oly (AP) vonalon megy keresztül, mely erre a síkra merőlegesnek vétetett fel; azért ered egy A -nál derékszögű háromszög MAP , a melyben az M -nél α szög sem egyéb, mint az FSF' sík fekhajlási szöge, (mert az AMP sík merőleges a FVS -ra, és egyszersmind az FSF' síkra is); a P -nél levő α' szög nem egyéb, mint az AP merőleges fekhajlási szöge (mert MP az AP vonal fekvőtülete); innét tehát következik, hogy egy sík fekhajlási szöge (α), és egy reá merőleges fekhajlási szöge (α'), együttvéve mindig 90 fokot képeznek.

Ugy szinte, ha az AP vonalon keresztül vezettedik annak függvetítő síkja ANQ , ered egy másik derékszögű háromszög NAQ , melyben az N -nél β szög az FSF' síknak függhajlási szöge, a Q -nál β' szög pedig a merőleges függhajlási szöge, a melyek tehát együttvéve szinte 90 fokot képeznek.

Minthogy pedig a feladat szerint a síknak α , és β hajlási szögei adva vannak, következik, hogy a reá merőleges

vonalak hajlási szögei α' és β' egyszerűen az által fognak meghatározatni, hogy az adott hajlási szögeket 90 fokra pótoljuk. — Minthogy továbbá az adott hajlási szögekből a vonal iránya a 12-ik cikk szerint meghatározható, azért a jelen feladat feloldására nézve mindenek előtt az adott α és β pótszögeiből meghatározzuk a síkra merőleges AP vonal vetületeit, azután pedig a 21-ik cikk szerint az adott ponton keresztül vezettedik egy sík merőlegesen a talált vonalra.

Jegyzés. Az α' és β' szögek összegének a 12-ik cikk 2-ik jegyzése szerint 90 foknál kisebbnek kell lenni, minthogy pedig $\alpha + \beta + \alpha' + \beta' = 180$, következik, hogy az adott α és β szögek összegének 90 foknál nagyobboknak kell lenni, a mi az előbbi cikk jegyzésével tökéletesen megegyez.

31. §.

A síkok lefordítása.

A feladatok természete gyakran úgy hozza magával, hogy egy adott síkban különböző mértani szerkezeteket kell végbevenni; e végre ilyenkor az adott síkot oly helyzetbe kell hozni, a melynél az egyik, vagy másik vetületi síkkal párhuzamos, vagy pedig az adott síkot a szelvéje körül kell addig forgatni, míg a vetületi síkkal magával egybe nem esik. A mértani szerkezetek bevégezése után azután a sík ismét az előbbi helyzetébe visszaállítatik. Ezen forgatás végbevitelére az adott síkban egy a szelvével párhuzamos vonal, vagy talán maga a szelvé, vétetik fel, mely vonal azután az egész forgás alatt változatlan marad, holott a sík többi pontjai oly körveket irnak le, melyek síkja a forgási tengelyre merőlegesek.

Legyen a 39-ik ábrában FSF' az adott sík, és (a, a') egy benne fekvő pont; ha most a síkot a FVS -ba kell lefordítani, akkor FS lesz a forgási tengely, az (a, a') pont pedig erre a tengelyre egy merőleges körívet fog leírni MA sugárral; hol MA azon derékszögű háromszög átlója, melynek egyik befogója (Ma) a pont fekvületének távolsága a forgási tengelytől, a másik befogója (ha') pedig ugyanazon pont magassága a feklap felett. Az A pont lefordítására tehát először (a) -ból húzzuk egy merőleges (Ma) a szelvére, azután (aA') merőleges (Ma) -ra, és erre felvitetik (a) -tól kezdve $aA' = ha'$, végre MA'

sugárral egy körív iratik le, míg ez a hosszított (Ma) vonalat A -ban nem éri, lesz (A) a lefordított (a, a') pont.

Mint hogy ezen eljárás folytán csak az MA vonal nagyságára van szükség, azért ezt egyszerűbben úgy is fel lehet találni, ha (h)-től kezdve a tengelyre felvitetik $hl=Ma$; lesz la' egyenlő a keresett MA hosszal.

Magából érthető, hogy MA nem egyéb, mint az ($Ma, m'a'$) vonal valódi hossza, ugy szinte, hogy az $A'MA$ szög az adott sík fekhajlási szöge.

32. §.

Feladat. Van adva egy sík, kerestetik azon szög valódi nagysága, melyet a két szelde egymásközt befoglal.

Feloldás. Ha az adott síkot, 39-ik ábra, a fekszeldeje körül a feklapba forgatjuk függszeldestől együtt, akkor a szeldek szöge valódi nagyságában lesz a feklapban szemlélhető. A fordítás alatt a fekszelde változatlanul megmarad, ugy szinte a függszeldeknek S pontja, mely még a forgási tengelyben fekszik; hogy tehát a lefektetett függszeldek végkép meghatározhassuk, csak abban még egy pontra leend szükségünk. Vegyük fel e végre a szeldeknek egy pontját (F', f') és fordítsuk azt az előbbi cikk szerint a feklapba, leend ennek helyzete a lefordítás után F'' , melyet ha S -el összekötünk, ered SF'' a lefordított függszelde, és FSF'' a szeldek által bezárt szögnek valódi nagysága.

33. §.

Két egyenes által képezett szög.

Hogy a két egymást metsző egyenes által képzett szöget meghatározhassuk, vezessünk azokon keresztül egy síkot, melyet ha a benne fekvő vonalokkal együtt a feklapba fordítunk, a keresett szög a valódi nagyságában fog előállani.

Ha a 40-ik ábrában az ($Ab, a'b'$) és ($Cd, c'd'$) vonalak egymást (o, o') pontban metszik, akkor a rajtok keresztül vezetett sík fekszeldeje AC az A és C feknyomok által meg van határozva, és ezen szelde lesz egyszersmind a forgási tengely. A két egyenes vonal lefektetésére most már elég a met-

sző O pont helyzetét meghatározni, minthogy az Ab vonal A pontja, úgy szinte a Cd vonal C pontja, mint a forgási tengely pontjai változatlanul maradnak.

A 31-ik cikkben előadott eljárás szerint az (o, o') pont a lefordítás után O -ba fog érkezni; ezen pontot tehát a megmaradt A és C pontokkal összekötvén, lesz AOC a két adott vonal által bezárt szögnek valódi nagysága.

Ha az adott két vonal egymást nem metszi át, akkor az egymáshoz hajlását szinte az említett módon fel lehet ugyan találni, csak hogy előbb az egyik adott vonal egy tetszőleges pontján keresztül, a másik adott vonallal egy párhuzamost kell vonni; minthogy a vonal iránya a párhuzamos elmozdítás által nem változik; most tehát a már egymást metsző két egyenes által befoglalt szög határoztatik meg, az előbbi mód szerint.

34. §.

Feladat. Egy adott ponton keresztül vezetessék egy egyenes, mely egy adott egyenes vonalat egy szintén adott szög alatt metsz.

Feloldás. Az adott ponton és az adott vonalon keresztül vezessünk egy síkot, fordítsuk ezt a fekvetületi lapba, a hol azután a kívánt szerkezetet végbevihetjük; minek megtörténte után a síkot az előbbi állásába visszahelyezzük.

A 41-ik ábrában (p, p') az adott pont, $(Bc, b'c')$ az adott egyenes; hogy ezen adatokon keresztül egy síkot lehessen vezetni, összekötöttük az adott vonal egy tetszőleges (c, c') pontját (p, p') -el, az így nyert két egymást metsző vonalon keresztül van téve azon sík, melynek BM fekszeldeje a B és M nyomok által lön meghatározva. A BM szelde mint forgási tengely körül most lefordítatik a $(Bc, b'c')$ egyenes, úgy szinte a (p, p') pont is; lesz a lefordítás után az egyenes helyzete BC , a ponté pedig P . Most már a P ponton keresztül vezettetik egy egyenes, mely BC -t az adott α szög alatt metszi; ily egyenes természetesen kettő lehetséges, úgymint FD és PE . Ha most a síkot ismét az előbbi állásába visszafordítjuk, akkor a P pont visszakerül (p, p') -be, a BC vonal pedig $(Bc, b'c')$ -be, ennek tehát D és E pontjai merőlegesen mozogván a forgási

tengelyre (d,d') és (e,e') -be fognak jutni. Végre összekötvén a (p,p') pontot a most talált pontokkal, lesznek $(pd,p'd')$ és $(pe,p'e')$ azon vonalak vetületei, melyek az adottat α szög alatt metszik át.

Könnyű észrevenni, hogy az $(epd,e'p'd')$ háromszög egyenszárú.

Egy adott pont távola egy adott egyenestől szinte ezen úton határozható meg, ha csak az adott α szög 90 foknak vétetik, a mely esetben természetesen csak egy feloldás fog lehetséges lenni; azonban ezen feladat még egy más feloldását is fogjuk adni alább a 40-ik cikkben.

35. §.

Az egyenes hajlása egy tetszőleges síkhoz.

Ha a vonal egy tetszőleges pontjából a síkra merőleges bocsájtatik, akkor ezen merőleges az adott vonallal egy oly szöget képez, mely a vonal hajlási szögét a síkhoz 90 fokra pótolja.

A 42-ik ábrában FSF' az adott sík, $(aB,a'b')$ pedig azon egyenes, melynek hajlása az FSF' síkhoz kerestetik; (a,a') ezen egyenes egy tetszőleges pontja, melyből a síkra az $(aC,a'c')$ merőleges van bocsájtva. MB azon sík fekszelője, mely az $(aC,a'c')$ és az $(aB,a'b')$ vonalokon van keresztül vezetve, és mely körül ezek a fekvületi síkba vannak lefektetve. CAB azon szög valódi nagysága, melyet az $(aB,a'b')$ és az $(aC,a'c')$ vonalak képeznek egymással, BAp szög derékszög, tehát CAp szög lesz a keresett hajlási szögnek valódi nagysága.

36. §.

Két sík hajlási szöge.

1. Hogy azon szöget megnyerjük, melyet két sík egymással képez, vegyünk fel egy tetszőleges pontot, bocsássunk abból merőlegeseket mind a két adott síkra, akkor ezen merőlegesek egymással a kívánt síkok hajlási szögét képezik, (vagy annak pótlását 180 fokra).

A 43-ik ábrában FSF' és $F_1S_1F_1'$ a két adott sík, melyek hajlási szöge kerestetik, (a,a') a tetszőlegesen felvett

pont, melyen keresztül van vezetve az $(aB, a'b')$ vonal merőlegesen az FSF' síkra, és $(aC, a'c')$ merőlegesen az $F_1S_1F_1'$ síkra. CB azon sík fekszeldéje, mely a két merőlegesen van keresztül vezetve, s a vonalak lefordításánál tengelyül szolgál; A a lefektetett (a, a') pont, BA a lefektetett $(aB, a'b')$ merőleges, és CA a lefordított $(Ca, c'a')$ vonal, tehát CAB , vagy BAD az adott síkok hajlási szöge valódi nagyságában.

2. Ezen feladat egy másik oldása az által létesíthető, ha a két adott sík metszési vonalára egy harmadik síkot vezetünk merőlegesen, ezen sík már a kívánt hajlási szöget fogja ki-metszeni, a mely azután a feklapbai befordítás által szemléltetvé tétetik.

A 44-ik ábrában FSF' és $F_1S_1F_1'$ a két adott sík, $(Ab, a'B')$ pedig azok metszési vonala, a melyben egy tetszőleges (p, p') pont vétetett fel. DE azon sík fekszeldéje, mely a (p, p') ponton keresztül menve, a síkok metszési vonalára merőleges. (21-ik §.) Ezen sík az FSF' síkot metszi azon vonal szerint, melynek fekvetülete Dp , az $F_1S_1F_1'$ síkot pedig oly vonal szerint, melynek fekvetülete pE . Ha most ezen síkot a DE szeldéje körül a feklapba befordítjuk, akkor a közös (p, p') pont P -be fog jutni, miért is a keresett hajlási szög valódi nagysága leend: DPE .

3. Végre két sík hajlását még úgy is fel lehet találni, ha azok metszési vonalára mindegyik síkban egy merőlegest húzunk, ezen merőlegesek szinte a kívánt hajlási szöget fogják bezárni.

A 45-ik ábrában FSF' és $F_1S_1F_1'$ a két adott sík és $(Ab, a'B')$ a közös átmetszési vonaluk, melyben tetszőlegesen felvétetett a (p, p') pont. Hogy most a (p, p') ponton keresztül az FSF' síkban a metszési vonalra merőlegest vezethessünk, előbb az FSF' síkot kell a feklapba lefordítani, mely alkalommal (p, p') pont P_1 -be, a metszési vonal pedig AP_1 -be jut; a melyre tehát már a P_1 pontban a P_1D merőleges emelhető. Ugy szinte ha az $F_1S_1F_1'$ síkban kívánunk (p, p') ponton keresztül a metszési vonalra merőlegest vonni, akkor az $F_1S_1F_1'$ síkot kell az F_1S_1 szeldéje körül lefordítani, mely alkalommal a (p, p') pont P_2 -be, a metszési vonal pedig AP_2 -be jut, erre tehát a P_2 -ben emelt merőleges leend P_2E . — Ha most a si-

kokat ismét visszafordítva képzeljük, akkor a D és E pontok, melyek a forgási tengelyekben fekszenek, helyöket nem változtatják, a P , és P'' pontok pedig (p, p') -be visszakerülnek, ered tehát egy háromszög DpE , a melyben a p -nél szög képezi a hajlási szög fekvetületét. Hogy ennek valódi nagyságát megnyerjük, csak azt kell észrevennünk, hogy a DpE háromszögnek DE oldala már a valódi nagyságában látszik, mint-hogy az a FVS -ban fekszik, a Dp oldalnak valódi nagysága DP_1 , a pE oldalé pedig EP'' ; ha tehát D -ből DP_1 sugárral, úgy szinte E -ből EP'' sugárral köríveket írunk le, míg ezek egymást P -ben nem metszik, lesz DPE a keresett szög valódi nagyságában.

Megjegyzendő itt 1-ször, hogy DE a metszési vonal Ab fekvetületére merőleges, mert DE azon sík fekszdélje, a mely a (p, p') ponton keresztül merőleges a metszési vonalra. 2-ször hogy a P_1P , és $P''P$ köríveknek egymást a metszési vonal Ab fekvetületében kell metszeni, mert a DPE háromszög nem egyéb, mint a DpE háromszög lefektetése, ezen lefordításnál pedig a p csúcsnak a forgási tengelyre merőleges pA vonalban kell mozogni.

Ezen megjegyzések folytán már a feladat megoldása az által egyszerűsíthető, hogy az $F_1S_1F_1'$ sík lefordítását egészen lehet mellőzni. Ugyanis a DE tetszőlegesen húzható, de merőlegesen bA -ra, D -ből azután merőleges vonatik a lefektetett AP_1 metszési vonalra, végre D -ből DP_1 sugárral körív húzódik, míg ez bA -t P -ben nem metszi; az így nyert P pont azután a D , és E pontokkal összekötve megadja a keresett hajlási szöget.

37. §.

Feladat. Két sík hajlási szögét egy harmadik sík által felezni.

Feloldás. A 46-ik ábrában FSF' és $F_1S_1F_1'$ a két adott sík, $(Ab, a'B')$ azok metszési vonala. Megkerestetett az előbbi czikk 3. pontja szerint mindenekelőtt a két sík hajlása szöge DHE , azután ez feleztetett a HG' vonal által, hol azután G' a keresett harmadik sík fekszdéljének egy pontja; minthogy pedig ezen síknak az adott síkok metszési vonalán szinte ke-

resztül kell menni, azért G összekötve A -val adja a keresett sík fekszeldejét, S_n , pedig összekötve B' -el a függszeldejét.

38. §.

A síknak átdöfése egy egyenes által.

Egy sík az egyenes vonal által csak egy pontban metszhetik, s hogy e pontot feltaláljuk, csak az egyenesen keresztül egy tetszőleges síkot kell vezetnünk, s ennek az adott síkkal metszését meghatároznunk. Minthogy a keresett átdöfési pontnak ezen metszési vonalban, úgy szinte az adott vonalban is kell fekvődni, azért az csak ezen vonalak közös metszése lehet.

1. Legyen a 47-ik ábrában FSF' az adott sík, és $(Ab, a'B')$ az egyenes, melynek a síkon átmenete kerestetik; akkor ezen a vonalon keresztül tétetett egy tetszőleges $F_1S_1F_1'$ sík, és megkerestetett ennek $(F_1f_1, F_1'f_1')$ metszése az adott síkkal; lesz az $(Ab, a'B')$ és $(F_1f_1, F_1'f_1')$ vonalak metszési (o, o') pontja a keresett átmenet.

2. Minthogy az $F_1S_1F_1'$ sík tetszőleges, azért a helyett egyszerűbben az $(Ab, a'B')$ egyik vetítő síkját lehet venni, például $Q'a'P$ fekvető síkot; ez által ugyan a keresett (o, o') pontnak csak egyik vetületét (o) fogjuk megnyerni, de minthogy egy pont két vetületének összeköttetési vonala a VT -re merőleges, azért a hiányzó (o') vetület egyszerű vetítés által meghatározható.

3. Ha az adott egyenes egy a VT -re merőleges síkban fekvődnék (48-ik ábra) $(ab, a'b')$, holott az adott sík $FSF'S$ az alapmetszettel párhuzamos, akkor az adott vonalat tartalmazó sík az F_1S_1 szeldejé körül a FVS -ba lesz lefordítandó. A lefordítás után az egyenes leendő AB , a két sík metszése pedig CD ; ezen vonalak közös M pontja tehát a keresett átdöfési pont, de még a feklapba lefordítva. Ha tehát az $F_1S_1F_1'$ síkot ismét visszafordítjuk az eredeti állásába, lesznek (m, m') a keresett átmenet vetületei.

39. §.

Egy pontnak távolsága egy adott síktól.

Az adott A pontból bocsássunk egy merőlegest az adott FSF' síkra, (20. §.); határozzuk meg ennek átmenetét B az

adott síkkal, (38. §.); végre keressük meg az AB vonal valódi nagyságát, (6. §.).

40. §.

Egy pont távolsága az egyenes vonaltól.

Az adott A ponton keresztül vezessünk egy síkot merőlegesen az adott CD vonalra, (21. §.), határozzuk meg ezen sík B átdőfését a CD vonal által, (38. §.), végre kössük össze az A és B pontokat, és keressük meg az AB vonal valódi nagyságát (6. §.), leendő ez a keresett távolság.

41. §.

Két párhuzamos sík távolsága.

Az egyik FSF' sík egy tetszőleges (a, a') pontjából bocsátatik egy merőleges a másik $F_1S_1F_1'$ síkra, míg ezt a (b, b') pontban átmetszi, azután megkerestetik az $(ab, a'b')$ vonal valódi hossza, lesz ez a két adott sík keresett távolsága.

Egyszerűbb azonban a következő eljárás. Vezessünk egy síkot merőlegesen az adottakra, s fordítsuk ezt a benne levő metszési vonalakkal együtt a feklapba, hol azután a párhuzamos vonalak távolsága egyszerűen levehető. Minthogy továbbá egy síkra merőlegesen számtalan síkot lehet tenni, azért legcélszerűbben azon $F''S''F'''$ síkot választjuk a 49-ik ábrában, mely egyszersmind a fekvetületi síkra is merőleges; ha azután ezen sík az $S''F'''$ függőzeldéje körül a függőlapba befördítatik, akkor a nyert metszési vonalak (ab) távolsága már egyúttal a keresett síkok távolságának valódi nagyságát adja meg.

42. §.

Két párhuzamos vonal távolsága.

Vezessünk egy síkot merőlegesen az adott párhuzamos vonalakra, keressük meg az átdőfési pontokat, kössük ezeket össze, és keressük meg az összeköttetési vonalnak valódi hosszát, lesz ez az adott párhuzamos vonalak távolsága.

Egyszerűbb azonban e következő eljárás. Legyenek az 50-ik ábrában (A, a') és (B, b') az adott párhuzamos vonalak,

lesz AB azon sík fekszeldéje, mely a párhuzamos vonalokon tétetett keresztül. Ha ezen síkot lefordítjuk a feklapba az AB szeldéje körül, akkor az A és B pontok, mint a forgási tengely pontjai változatlanul megmaradván, a (B, b') vonal egy tetszőleges (c, c') pontja C -be fog jutni, úgy, hogy az egyik párhuzamos helyzete a lefordítás után lesz BC ; a másik ehhez párhuzamosn volna az A ponton keresztül vezetendő. A vonalak távolára azonban elegendő, ha csak A -ból vonatik merőleges BC -re, lesz AD a keresett párhuzamosak távola.

43. §.

Két nem párhuzamos vonal távola.

Két vonal távola alatt értjük azon egyenest, mely mind a két adottra merőlegesen áll.

Ezen távol meghatározására nézve legyen az 51-dik ábrában A , és B a két adott vonal. Vezessünk az egyik A vonalon keresztül egy oly FF' síkot, mely a másik adott B vonallal párhuzamos, (mi úgy történik, hogy az A -ba felvett tetszőleges r ponton keresztül vezettedik egy párhuzamos vonal B -vel, azután a két egymást metsző vonalon keresztül tétetik a sík); azután a B vonal egy tetszőleges m pontján keresztül egy merőleges bocsájtatik az FF' síkra, ennek metszési n pontján keresztül pedig szinte egy (np) párhuzamos B -vel, lesz ez a B vonal vetülete az FF' síkon, a melynek tehát az A vonalat metszeni kell. Ha most a metsző p pontban emeltetik ismét egy merőleges pq az FF' síkra, akkor ez a B vonalat q pontban metszendi, s könnyű belátni, hogy pq mint az adott két vonalra merőleges, egyszersmind az adott vonalak keresett távola leend.

Ha csupán ezen távol nagysága kívántatnék, akkor az np , és a pq vonalak szerkesztése felesleges, mert $mn=pq$.

44. §.

Hogy tehát az előbbi cikkben előadottak szerint két adott vonal távolát feltalálhassuk, legyenek az 52-ik ábrában (A, a') és (b, b') az adott vonalak, akkor

1-ször. Az (A, a') vonal egy tetszőleges (r, r') pontján egy párhuzamos vonatík (b, b') -hez ;

2-szor ezen párhuzamoson és az (A, a') vonalon keresztül vezetetik az FSF' sík, mely tehát ekkép a (b, b') vonallal párhuzamos lesz,

3-szor a (b, b') vonal egy tetszőleges (m, m') pontján keresztül bocsájtatik egy merőleges $(mn, m'n')$ az FSF' síkra,

4-szer megkerestetik ezen merőleges átmenete (n, n') az FSF' síkon,

5-ször az így nyert (n, n') ponton keresztül vonatík egy párhuzamos a (b, b') vonallal, mely az (A, a') vonalat (p, p') -ben fogja metszeni,

6 szor a (p, p') pontban merőleges emeltetik az FSF' síkra, mely a (b, b') vonalat (q, q') pontban fogja átmetszeni, és lesznek pq , és $p'q'$ a keresett távol vetületei, végre

7-szer megkerestetik a $(pq, p'q')$ vonalnak valódi hossza.

45. §.

Ugyanezen feladat egy másik oldására jutunk a vetületi lapok elmozdítása, vagy az adott vonalak forgatása által. *) Ugyanis, ha az 53-ik ábrában az adott vonalak egyike (A, a') a FVS -ra merőlegesen áll, akkor az ily vonalak távola $(An, m'n')$ a feklappal párhuzamos lévén, annak valódi hossza az An fekvetületével lesz egyenlő. Azonfelől a valódi távol An fekvetülete a B vonal fekvetületére szinte merőleges, mint-hogy An merőleges a B vonal fekvetítő síkjára.

Hogy már most tetszőleges adatoknál az egyik vonal a FVS -ra merőleges legyen, szükséges lesz vagy a vetületi síkokat czélszerűen megváltoztatni, vagy pedig az adott vonalakat, megtartván azok egymás iránti helyzetöket, addig forgatni, míg az egyik a FVS -ra merőleges nem lesz.

46. §.

Két vonal távolának meghatározása a vetületi síkok átváltoztatása által.

Legyen az 54-ik ábrában (a, a') és (b, b') a két adott

*) Olivier, Cours de géométrie descriptive.

vonal, melyek egyszerűség okáért csak egy betűvel vannak jelölve. Hogy már ezen vonalak egyike, például az (a, a') a FVS -ra merőleges legyen, szükséges lesz a FVS -ot úgy mozdtani el, hogy az, az (a, a') vonalra merőleges legyen; hogy pedig a FVS ezen elmozdítás daczára is a $F'VS$ -ra merőleges maradjon, azért előbb szükséges lesz a $F'VS$ -ot úgy mozdtatni el, hogy az, az (a, a') vonallal párhuzamos legyen.

Ha egy vonal párhuzamos a függlappal, akkor annak fekvetülete párhuzamos a vetületi tengellyel, miért is először a függlapot úgy kell elmozdtítani, hogy az új vetületi tengely párhuzamos legyen az (a, a') vonal fekvetületével, vagy a mi egyszerűbb, vegyük fel az új $V'T'$ vetületi tengelyt magában az (a) fekvetületben; mi által az adott vonalak fekvetületei változatlanul megmaradnak, az új függvetületeket pedig az által fogjuk megnyerni, ha mindegyik vonalban két pontot választunk, azokat az új vetületi síkra vetítjük, és a magasságiakat, melyek szinte nem változnak, a régi rendszerből egyszerűen átvisszük. Így az (a, a') vonalban felvettettek az (A, a') és (Q, q') pontok, melyeknek új vetületei (A) és (Q, Q') ; a (b, b') vonalban pedig felvettettek a (B, b') és a (Q, r') pontok, melyek új vetületei: (B, B') és (Q, R') ; úgy hogy ezen első átváltoztatás után az adott vonalak vetületei lesznek: (AQ, AQ') és $(BQ, B'R')$.

Továbbá, ha egy vonal merőlegesen áll a feklapra, akkor annak függvetülete merőleges a vetületi tengelyre; miért is a feklapot most másodszor úgy kell átváltoztatni, hogy az új vetületi tengely az (AQ, AQ') vonal fekvetületére merőleges legyen. Ezen tengely ($V''T''$) ismét legegyszerűbben magán az A ponton vitetik keresztül merőlegesen AQ -ra; az előbb talált függvetületek ezen átváltoztatásnál megmaradnak, és csak az illető fekvetületeket kell felkeresni. Az egész (A) vonal fekvetülete az A pontra esik, minthogy a vonal maga a feklapra merőleges, a másik (B) vonalban pedig ismét két pontot kell felvenni, és ezeket vetíteni, megtartván a vetületek távolatát a $V'T'$ vetületi tengelytől. Így e vonalban felvettettek a (Q, R') és a (B, B') pontok, melyek új vetülete (R, R') és (B, B') , úgy hogy a két vonal vetületei a második átváltoztatás után lesznek: (A, AQ') és $(B, B'R')$.

A két vonal távolának meghatározására most már csak A -ból kell egy merőlegest húzni \mathfrak{A} -re, lesz $A\mathfrak{A}$ a keresett távol valódi hossza.

Ha még ezen távolnak vetületeit is meg kellene határozni az eredetileg adott vetületeken, akkor előbb a nyert $A\mathfrak{A}$ vonalat vetítjük merőlegesen a $V''T''$ tengelyre, megjegyezvén, hogy a távol a feklappal párhuzamos lévén, annak függvetülete is párhuzamos a $V''T''$ -lyel; a távol vetületei tehát a $V''T''$ tengelyre nézve: $(A\mathfrak{A}, M'N')$; most másodszor az M' és N' pontokat vetítjük merőlegesen a VT' tengelyre, hol most a távol vetületei: $(mn, M'N')$; végre harmadszor vetítvén az m és n pontokat az eredeti tengelyre, lesznek $(mn, m'n')$ a távol kívánt vetületei az adott vonalokon.

Probául szolgálhat, hogy az $(mn, m'n')$ vonal valódi hosszának $A\mathfrak{A}$ -nel egyenlőnek kell lenni.

47. §.

Két vonal távolának meghatározása a vonal

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

Ha ismét az 55-ik ábrában (a, a') és (b, b') a két adott vonal, melyek távola kerestetik, akkor azokat mind addig kell forgatnunk, míg az egyik, például (a, a') a feklapra merőleges nem lesz; hogy pedig ezen forgatásnál a forgási tengely a függlapra merőleges legyen, (mert csak ez esetben fognak az egyes pontok a függlapban köröket leírni) szükséges lesz előbb a vonalakat úgy forgatni, hogy az (a, a') a függlappal párhuzamos legyen.

Felvétetik tehát először egy a feklapra merőleges forgási tengely, legegyszerűbben a fekvetületek közös (o) pontjában, ezen tengely az (a, a') vonalat (o') -ben, a (b, b') vonalat pedig o'' -ben fogja átmetszeni, mely pontok tehát a forgás alatt változatlanul megmaradnak. Minthogy pedig az (a, a') vonalnak a függlappal kell párhuzamosnak lenni, azért annak fekvetülete oR párhuzamos lesz a VT' -lyel. Ezen átfordítás alkalmával az (a, a') vonal egy tetszőleges (r, r') pontja egy körivet ír le, melynek fekvetülete az rR körív valódi nagysá-

gában, függvetülete pedig a VT -lyel párhuzamos $r'R'$ vonal. Hogy pedig a vonalak viszonyos helyzete megmaradjon, szükség lesz, hogy a (b, b') vonal szintoly szög alatt forduljon el, mint az (a, a') vonal. E végre felvételik b -ben egy (p, p') pont, úgy hogy op legyen $= or$, a pP körív pedig $= rR$. A pP körív függvetülete $p'P'$ szinte párhuzamos lesz a VT -lyel. Az első elfordítás után tehát az (a, a') és (b, b') vonalak vetületei lesznek: $(oR, o'R')$ és $(oP, o''P')$.

Most felvételik másodszor egy oly forgási tengely, mely a függvetületi lapra merőlegesen áll, legegyszerűbben ismét azon \mathfrak{U} pontban, a melyben az $(oR, o'R')$ és $(oP, o''P')$ vonalak függvetületei egymást átmetszik; ezen tengely az $(oR, o'R')$ vonalat $(\mathfrak{U}, \mathfrak{U}')$, az $(oP, o''P')$ vonalat pedig $(\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}')$ -ben fogja átmetszeni; ezen pontok tehát a forgás alatt változatlanul megmaradnak. Minthogy továbbá az $(oR, o'R')$ vonalnak a feklapra merőlegesnek kell lenni, azért függvetülete merőleges lesz a VT -re, fekvetülete pedig lesz az \mathfrak{U} pont maga. A forgás alatt a vonalak egyes pontjai oly köröket írnak le, melyek síkjai a függglappal párhuzamosak, és melyek vetületei tehát a függglapban valódi nagyságokban fognak láthatók lenni, fekvetületei pedig a VT -lyel párhuzamos egyenesek lesznek. Ha tehát az $o'R'$ vetületben felvételik egy tetszőleges T' pont, ez a forgás után \mathfrak{U}' -be fog jutni; hogy pedig a vonalak viszonyos helyzete megmaradjon, azért az $O''P'$ vetületben szinte felvételik egy Q' pont, úgy hogy $\mathfrak{U}'T' = \mathfrak{U}'Q'$; a mely pont tehát azon $Q'D'$ körívet fogja leírni, mely a $T'\mathfrak{U}'$ körívvel egyenlő; s melynek fekvetülete a VT -lyel párhuzamos QD egyenes. A második elfordítás után tehát az adott vonalak vetületei lesznek: $(\mathfrak{U}, \mathfrak{U}'\mathfrak{U}')$ és $(\mathfrak{U}_1D, \mathfrak{U}'D')$.

Most tehát már csak \mathfrak{U} -ból kell az \mathfrak{U}_1D -ra egy merőlegest bocsájtani, lesz $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$ az adott vonalak távolának valódi hossza.

Ha még ezen távolnak vetületei kívántatnának az adott vonalakon, akkor a vonalakat, a rajtok már megjegyzett hosszal együtt vissza kell fordítani az eredeti állásokba. Ugyanis az $\mathfrak{U}\mathfrak{U}_1$ hosszának megfelelő függvetület a vetületi tengelylyel párhuzamos $\mathfrak{U}\mathfrak{U}'$. Ha tehát az \mathfrak{U}' és \mathfrak{U}_1 pontok az \mathfrak{U}' körül vissza fordítatnak az illető vonalak függvetületeire, lesz ezek

helyzete M' és N' , mely pontokat vetítve megnyerjük az M és N fekvetületeket. Az első visszafordításnál tehát a távol vetületei (MN , $M'N'$). Most másodszor az M és N pontokat kell az O pont körül visszafordítani az illető vonalak fekvetületeire mi által meg lesznek határozva az m , és az n pontok, melyek végre vetítve megadják az m' és n' pontokat, úgy, hogy a távol keresett vetületei lesznek (mn , $m'n'$).

48. §.

Vegyes feladatok.

Adva van a FVS -ban egy háromszög, melyet az egyik oldala körül addig kell forgatni, míg az ellentett szögének fekvetülete derékszöggé válik, kerestetnek a háromszög ezen állásának vetületei.

Feloldás. Ha az adott ABC háromszög az 56-ik ábrában az AB oldala körül forgattatik, akkor a C pont fekvetülete az AB forgási tengelyre merőleges Cc -ben fog mozogni, mint-hogy pedig az eredő háromszögnek c -nél derékszögűnek kell lenni, azért c -nek azon félkör kerületében is kell fekvődni, a melynek átmérője az AB oldal; mi által tehát az AcB fekvetület megvan határozva. — A függvetületet illetőleg az A és B pontok a tengelyre vetítetnek, minthogy AB a teklaupbau változatlanul megmaradt, a mi pedig a C pont c vetülete feletti magasságát illeti, ezt az által nyerjük meg, ha azon körívet, melyet a C pont forgása alatt leír, előbb a feklapba lefordítjuk, az így talált cC' magasságot azután a c vetületére a tengelytől kezdve felvisszük c' -ig; összekötvén végre c' -et a' és b' -el, lesz $a'b'c'$ a háromszög függvetülete.

49. §.

Kerestetik azon kör középpontja, mely három adott ponton megy keresztül.

Feloldás. Legyenek az 57-ik ábrában (a , a'), (b , b') és (c , c') az adott pontok, akkor ezeken keresztül vezettedik az FSF' sík, a melyet azután a benne fekvő pontokkal együtt a FVS -ba kell lefordítani, mi által az adott pontok valódi helyzete A , B , és C megnyeretik, hol már a kívánt mértani szer-

kezet végbevittele után megtaláltatik a keresett O pont, de szinte a feklapba befördítva. Ha tehát a sikot ismét az előbbi helyzetébe visszafordítjuk, meg lesznek határozva a keresett középpont (o, o') vetületei. Az eljárás pontosságáról az által lehet meggyőződünk, ha megkeressük az $(oa, o'a')$, $(ob, o'b')$ és az $(oc, o'c')$ vonalak valódi hosszát, melyeknek mint ugyanazon kör sugarainak egyenlőknek kell lenni.

50. §.

1. Szerkesztendő azon egyenoldalú háromszög, a melynek síkja, és az egyik oldalának fekvetülete meg van adva.

Feloldás. Az 58-dik ábrában FSF' az adott sík, és (ab) a benne fekvő egyenoldalú háromszög fekvetülete; a melynek mindenekelőtt az $(a'b')$ függvetülete fog meghatározatni. Most már az adott sikot le kell fordítani az egyik vetületi lapba, például mint az ábrában történt, a függlapba, hol az $(ab, a'b')$ vonal helyzete AB leendő; megkerestetik itt mértanilag a harmadik C pont, mely a sík visszafordítása által a (c, c') vetületeket fogja meghatározni.

2. Egy síkon meg van adva egy rendes ötszög középpontja, és egyik sarkpontja, kerestetnek az ötszög vetületei.

A feloldás ez esetben egészen azonos az előbbi feladattal.

51. §.

A síknak egy adott pontján keresztül kerestetik a legnagyobb esési vonal.

A sík legnagyobb esési vonala a legrövidebb vonal, melyet a síkon az adott pontból a feklaphoz lehet húzni. Mint-hogy pedig az adott sík felszeldéje nem egyéb, mint a sík- és a feklap közös vonala, azért a legnagyobb esési vonal lesz azon legrövidebb vonal, melyet az adott pontból a fekszeldéhez lehet vonni. De egy pontból egy vonalhoz a merőleges a legrövidebb, azért a jelen feladat oldására csak az adott pontból kell a fekszeldére merőlegest vonni. — Ha tehát az 59-ik ábrában FSF' az adott sík, és (a, a') a benne fekvő pont, akkor $(ab, a'b')$ lesz a legnagyobb esési vonal.

Ha fordítva meg van adva egy síknak legnagyobb esési vonala, akkor a sík szeldéjét is meg lehet határozni, e végre ugyanis a szeldéket az adott vonal illető nyomain fogjuk keresztül vezetni, a fekszeldét pedig azon felül a vonal fekvetületére merőlegesen.

52. §.

Egy adott vonalon keresztül vezetendő egy sík, mely a feklaphoz adott hajlással birjon.

Feloldás. Ha a 60-ik ábrában $(Ab, a'B')$ az adott vonal, akkor a keresett sík szeldéjének e vonal nyomain kell keresztül menni, és így még csak egy pontra van szükség, a melyen az egyik szeldét keresztül kell vezetni, és a mely azon feltételből lesz meghatározandó, hogy a sík fekhajlása meg van adva.

Képzeljünk az adott $(Ab, a'B')$ vonal egy tetszőleges (b, B') pontjából a keresett sík fekszeldéjére egy merőlegest bocsájtva, akkor ez, mint a sík legnagyobb esési vonala, ugyanazon fekhajlási szöggel bir, mint maga a sík. Képzeljük továbbá ezen merőlegest a (b, B') pont fekvető $B'b$ vonala körül addig forgatva, míg az a függlappal párhuzamos nem lesz, vagy mint az ábrában, míg az a függlapba magába bele nem esik, akkor ezen merőleges fekhajlási szöge α , a valódi nagyságában fog megjelenni, és azért a $B'd$ merőlegest ezen állásában szerkeszteni lehet; és így annak bd fekvetülete nagyságra nézve szinte meg van határozva. Ha most ezen merőlegest ismét visszafordítjuk, akkor a (b, B') pont marad, a (d) lábpont pedig (bd) sugárral egy körívet fog leírni. Mint-hogy pedig a szóban levő merőleges fekvetülete a fekszeldére merőleges, a fekszelde pedig azonfelől az A feknyomon megy keresztül, azért csak az A ponton kell a (dg) körívhez egy érintőt vonni, lesz ez a keresett sík fekszeldéje. — S könnyű egyszersmind belátni, hogy ezen feladat két feloldással bir, minthogy a körön kívüli pontból ehhez két érintő lehetséges. Ha az adott α szög addig kisebbítetik, míg $bd = bA$, vagyis ha az A feknyom a kör kerületére esik, akkor csak egy feloldás lehetséges, a mely eset akkor áll elő, ha a síknak megadott hajlási szöge épen annyi, mint az adott vonal fekhajlási szöge.

Ha pedig az adott szög a vonal fekhajlási szögénél kisebb volna, akkor a vonal A feknyoma a kör kerületén belől esik, és a feladat megoldása lehetetlenné válik.

53. §.

Adva van egy a fekvetületi sikkal párhuzamos kör $ABCD$, a 61-ik ábrában, melyet az adott $(BA, b'a')$ átmérője körül kell egy adott α szög alatt meghajtani.

Feloldás. Az (A, a') és (B, b') pontok, mint a forgási tengely pontjai mozdulatlanul megmaradnak, míg a kör többi pontjai AB -re merőleges köríveket fognak leírni, melyek megfelelő szöge α . Legmagasabbra fog emelkedni az AB -re merőleges oC sugár C végpontja, a mely azután az eredő kerületék kisebb tengelyének végpontját fogja képezni. Hogy a C pont állását meghatározzuk, fektessük le azon ívet, melyet a C pont forgása alatt leír, egy a feklaphoz párhuzamos síkba, hol a forgási α szög valódi nagyságában áll elő; akkor a C pont C_1 -be jut, ha $CoC_1 = \alpha$; ha tehát C_1 -et Co -ra vetítjük, meglesz a C pont fekvetülete c -ben, és ha ezt a pontot a függlapra vetítjük, és a C pont cC_1 magasságát a forgási tengely síkja felett felvisszük, megnyerjük a C pont c' függvetületét is. A kör D pontja éppen annyira fog súlyedni, mint a mennyire C emelkedett, miért is annak fekvetületét megnyerjük, ha $od = oc$; a függvetületét pedig, ha a d pont vetítő vonalára az $(a'b')$ tengelytől lefelé visszük a C pont cC_1 magasságát. A körnek fekvetülete tehát egy oly kerületék lesz, melynek nagyobb tengelye AB , kisebb tengelye pedig a most meghatározott cd vonal. Ezen tengelyek függvetületei $a'b$ és $c'd$; melyek a függvetületben eredő kerületéknek két társ átmérőjét képezik. — Különben a mint a C pont vetületeit feltaláltuk (c, c')-ben, éppen úgy a kör bármely más pontjának vetületeit is meg lehet határozni mind a két vetületben; ámbár a kerületék főtengelyeinek ismerete a kerületék pontos meghatározására elégséges.

Hátra van tehát még a függvetületbeni kerületék derékszögű átmérőinek meghatározása; a melyekhez e következő elmélkedés folytán jutunk. Fektesünk az adott $(AB, a'b')$ és a már meghatározott $(cd, c'd')$ vonalokon keresztül egy FSF' síkot, mely tehát a körnek síkja leend, ha az már az α szög

alatt meg van hajtván; és valamint a fekkerüléknek nagyobb AB átmérője ezen sík fekszeldejével párhuzamos, szintúgy a függkerülék nagyobb tengelyének a függszeldejével kell párhuzamosnak lenni, mert a feladatot most úgy lehet tekinteni, mintha a kör a függlappal volna párhuzamos, és egy bizonyos tengely körül addig volna fordítandó, míg az FSF' síkba esik, a mely fordításnál tehát a függszeldejével párhuzamos körátmérő változatlan marad. Hogy tehát a függkerülék nagyobb tengelyét megnyerjük, csak az o' ponton keresztül kell az SF' -el párhuzamost húzni, és erre o' -tól kezdve mind a két oldalra a körsugarat feltenni p' és q' -ig, lesz $p'q'$ a nagyobb tengely; és ha erre szinte az o' középponton keresztül egy merőleges vonatunk, lesz ez a kisebb tengely iránya. — Hogy még ennek nagyságát meghatározhassuk, képzeljünk a (o, o') ponton keresztül az SF' -re egy merőleges síkot vezetve, és ezt az $F'o'$ szelje körül a függlapba fordítva, lesz O' az (o, o') középpont helyzete a lefordítás után, ha $o'O' = oo''$. Minthogy pedig a metszés a kör középpontján vitetett végre, azért csak a metszési $F'G'$ vonalra O' -ből a körsugar mind a két oldalra felviendő G' és H' -ig, a mely pontok azután a visszafordítás-kor a h' és g' kisebb tengely végpontjait fogják meghatározni.

54. §.

Egy adott vonalon keresztül vezetendő egy sík, mely egy adott síkra merőleges.

Feloldás. Az adott vonal egy tetszőleges pontjából bocsájtassék egy merőleges az adott síkra, azután vezettessék ezen, és az adott vonalon keresztül egy sík, mely már az adott síkra merőleges lesz, minthogy az egy oly vonalon megy keresztül, mely a síkra merőleges.

Ha az adott sík, mint a 62-ik ábrában, a VT -lyel párhuzamos, akkor azon merőleges vetületei, mely az adott $(aB, A'b')$ vonal egy tetszőleges (c, c') pontjából bocsájtatik a síkra, magok is merőlegesek a vetületi tengelyre, hogy tehát ezen merőleges nyomait fellelhessük, czélszerű lesz azon keresztül egy a VT -re merőleges $F_1S_1F_1'$ síkot vezetni, és azt az F_1S_1 szelje körül a feklapba fordítani, lesz F_1F_1'' a lefordított

metszési vonal, C a lefordított (c, c') pont; ha tehát CH merőleges $F_1 F_1''$ -re, akkor CH azon merőleges lefordítása, mely a felvett (c, c') ponton keresztül vonatott az $FSSF'$ síkra; H tehát a fekvő, a V' függő, pedig a visszafordításkor V -be fog jutni. Minthogy végre az adott vonal nyomai B és A' , azért ezen pontok összekötve a merőleges talált H , és V nyomaival megadják a keresett sík szelvéit.

55. §.

Két vonal derékszög alatt metszi egymást, az egyiknek mind a két, a másiknak pedig csak fekvetülete van megadva, kerestetik ennek a függvetülete.

Feloldás. A 63-ik ábrában $(ab, a'b')$ az egyik vonal, (bc) pedig a másik vonal fekvetülete. Minthogy ezen második vonal az első átmettszi, azért b' egyszersmind a keresett vetülethez is fog tartozni; minthogy továbbá a második vonal az elsőre merőleges, azért az azon síkban fog feküdni, mely a (b, b') ponton keresztül merőlegesen vezetettik az $(ab, a'b')$ vonalra. Szerkesszük tehát ezen FSE' síkot, a melynek függőszelvéjében fog azután feküdni a második vonalnak C' függőnyoma, úgy hogy $C'b'$ lesz a keresett függvetület.

56. §.

Egy adott ponton keresztül vezetessék egy egyenes vonal, mely két adott egyenest átmetsz.

1-ső *Feloldás.* A 64-ik ábrában (a, a') az adott pont, $(Bc, b'C')$ és $(de, d'e')$ az adott egyenesek. Vezessünk az (a, a') ponton és a $(Bc, b'C')$ vonalon keresztül egy síkot FSE' , keressük meg ezen síknak (m, m') átdőfését a második $(de, d'e')$ vonal által, és kössük össze ezen így talált pontot az adott (a, a') ponttal, lesz $(am, a'm')$ a keresett vonal, mely az (a, a') ponton keresztül menve, mind a két vonalat átmetsz. Hogy az így talált vonal csakugyan átmetsz a $(de, d'e')$ vonalat, magából érthető, mert épen ezen vonal (m, m') pontját kötöttük össze az (a, a') ponttal; de átmetsz a $(Bc, b'C')$ vonalat is, mert ez az FSE' síkban fekszik, minthogy ezen keresztül vezetettik a sík, de ugyanazon síkban fekszik a talált $(am, a'm')$

vonalt is, minthogy az a síkban fekvő két (a, a') és (m, m') ponton megy keresztül; de két ugyanazon síkban fekvő vonalnak egymást mindig metszeni kell. — Az eljárás pontosságát fogja bizonyítani, ha ezen metsző (n, n') pont vetítő vonalai egy egyenesbe esnek.

2-ik *Feloldás*. Az elv itt ugyanaz, mint az előbbi feloldásnál, csak hogy az FSF' síknak gyakran alkalmatlan szelvéi felkeresése mellőztetik az által, hogy az adott (a, a') ponton keresztül két tetszőleges, de az FSF' síkban fekvő $(ap, a'p')$ és $(aq, a'q')$ vonal húzatik az (a, a') ponton, és a $(bc, b'c')$ vonal két tetszőleges pontján keresztül, a 65-ik ábrában.

Hogy most az FSF' sík átdöfését a második $(de, d'e')$ vonal által meghatározhassuk, képzeljük e vonal fekvetítő síkját megvonva, és határozzuk meg ennek $(pq, p'q')$ metszését az FSF' síkkal, az által, hogy a metszési p és q pontokat az illető vonalakra vetítjük. Az így talált metszési vonal a $(de, d'e')$ vonal által az (m, m') pontban vágatik által, melyet tehát, ha az adott (a, a') ponttal összekötjük, megnyerjük ismét a kívánt $(am, a'm')$ vonalat, mely az adottakat az (n, n') és (m, m') pontokban metszi át.

57. §.

Egy adott ponton keresztül vezettség egy vonal, mely két adott síkkal párhuzamos.

Feloldás. Szerkesszük a két adott sík metszési vonalát, és huzzunk ehhez az adott ponton keresztül egy párhuzamost.

58. §.

Egy adott ponton keresztül vezettség egy vonal, mely egy adott vonalt átmetsz, és egy adott síkhoz párhuzamos.

1-ső *Feloldás*. Vezessünk a 66-ik ábrában az adott (a, a') ponton keresztül egy $F_1S_1F_1'$ síkot, mely az adott FSF' síkkal párhuzamos; határozzuk meg azután ezen sík (m, m') átdöfési pontját az adott $(bc, b'c')$ vonal által, végre kössük össze ezen átdöfési pontot az adott (a, a') ponttal, lesz $(am, a'm')$ a keresett vonal, mely az (a, a') ponton keresztül megy, az adott $(bc, b'c')$ vonalat az (m, m') pontban átmetszi, és az adott FSF'

sikkal párhuzamos, minthogy egy oly síkban fekszik, mely maga is párhuzamos az adott sikkal. Az eljárás pontosságát fogja bizonyítani, ha az adott síkban lehet egy oly vonalat húzni, mely a találttal párhuzamos.

2-ik *Feloldás*. Az $F_1S_1F_1'$ sík szeldéi szerkesztése helyett a 67-ik ábrában ismét egyszerűbben az adott (a, a') ponton keresztül két egyenes huzatik, melyek a meghatározandó síkban fekszenek. E vonalakul legegyszerűbben vétetnek az $(ab, a'b')$, mely az adott sík fekszdéjével, és $(ac, a'c')$, mely annak függszeldéjével párhuzamos. Hogy most ismét az adott $(de, d'e')$ vonal átdöfését meghatározhassuk azon sikkal, mely az $(ab, a'b')$ és az $(ac, a'c')$ vonalak által vezethető, képzeljük meghuzva a $(de, d'e')$ vonal fekvető síkját, ennek azután, és az említett síknak $(bc, b'c')$ metszését a b , és c pontok egyszerű vetítése által lehet megnyerni. Ezen metszési vonal ad adott $(de, d'e')$ vonallal az (m, m') pontban találkozik; a melyet (a, a') ponttal összekötven, megnyerjük a kívánt $(am, a'm')$ vonalat.

A feladat azonban sokkal egyszerűbbé válik, ha az adott sík az egyik vetületi sikkal összeesőnek vétetik fel, mert ez esetben a keresett vonal egyik vetülete az alapmetszettel lesz párhuzamos, és így közvetlen meghuzható.

59. §.

Egy adott síkon kerestessék fel azon pont, mely három a térben adott ponttól egyenlő távolban van.

Feloldás. Kössük össze az adott három pontot egy háromszöggé, keressük meg (a 49-ik cikk szerint) azon kör középpontját, mely e háromszög körül vezethető, és bocsásunk ezen középpontból egy merőleget az adott síkra, akkor ezen merőleges és a sík metszési pontja lesz azon pont, mely a kívánt feladatnak eleget tesz.

60. §.

Vezetessék egy síkhoz, adott távolban egy párhuzamos sík.

Feloldás. A 68-ik ábrában FSF' az adott sík, és SES' egy oly sík, mely az adottnak fekszdéjére merőleges. For-

dítsuk ezen két sík $F'h$ metszési vonalát az $\mathfrak{E}\mathfrak{H}'$ szelde körül a függvetületi lapba, és emeljünk erre egy tetszőleges p pontban merőlegest, a melyre p -től kezdve mind a két oldalra felvisszük az adott $pm=pn$ távot. Az m , és n pontokon az $F'h$ metszési vonalhoz vont párhuzamosok lesznek a keresett síkok metszései az $\mathfrak{E}\mathfrak{H}'$ síkkal; ha tehát ezen metszési vonalak az $\mathfrak{E}\mathfrak{S}$ szelde körül ismét visszafordítatnak, akkor F_1 és F'' , úgy szinte F_1' és F_{11}' az illető szeldék pontjai, és ha azokon keresztül az adott sík szeldéjével párhuzamosokat vonunk, ezek a kívánt síkok szeldéjét fogják megadni, és azok a vetületi tengely S_1 és S_{11} pontjaiban fognak egyesülni.

61. §.

Vezetessék egy adott egyeneshez, adott távolban, egy oly párhuzamos, melynek fekvetülete szinte megvan adva.

1-ső *Feloldás*. A 69-dik ábrában $(ab, a'b')$ az adott vonal, és cd a vele párhuzamos vonal fekvetülete, melynek függvetülete kerestetik. Vezessünk az adott vonal egy tetszőleges (g, g') pontján keresztül egy merőleges FSF' síkot, és képzeljünk ebben a síkban a (g, g') középpontból az adott távollal, mint sugárral egy körvet leírva, akkor ez a keresett párhuzamost metszeni fogja. Fordítsuk azért az FSF' síkot az FS szeldéje körül a feklapba, és a lefektetett G pontból mint középpontból írjuk le valóban az adott távollal az említett kört, mely a keresett vonal adott fekvetületét K pontban metszi, mely tehát a keresett vonal és az FSF' sík átdöfési pontjának lefektetése. Ha tehát a síkot ismét visszafordítjuk, akkor ezen átdöfési pont vetületei lesznek (k, k') , a mely utóbbin át tehát csak a $c'k'$ párhuzamosan lesz $a'b'$ -el vonandó, a keresett függvetület meghatározására. — A körnek és az adott fekvetületnek második H metszése visszafordítás által még egy (h, h') pontot fog meghatározni, a melyen keresztül vezetett $h'd''$ párhuzamos a feladatnak egy második oldását fogja megadni.

2-ik *Feloldás*. Ha a vetületi síkokat úgy mozdítjuk el, hogy az adott vonal a fekvetületi lapra merőlegesen álljon, akkor a keresett vonal szinte merőleges lesz a feklapra, és az adott távol a valódi nagyságban lesz szemlélhető. A 70-dik ábrában először a $F'VS$ mozdított úgy el, hogy az új alap-

metszet $V'T'$ a keresett vonal adott cd fekvetületével össze-
essék; mi által az adott vonal új függvetülete lesz $\alpha'\beta'$, a kere-
sett vonal függvetülete pedig valahol az új $F'VS$ -ban, annak
feknyoma tehát a $V'T'$ -ben lesz. — Ha most másodszor a FVS
mozdítatik úgy el, hogy az új alapmetszet $V''T''$ az $\alpha'\beta'$ ve-
tületre legyen merőleges, akkor az adott vonal fekvetülete az
 \mathfrak{A} pontba egyesül, a keresett vonal fekvetülete szinte csak
egy pont lesz valahol a $V''T''$ tengelyben.

Ha tehát az adott távollal mint sugárral leírjuk a \mathfrak{A} kö-
zéppontból a kört, akkor ez a $V''T''$ tengelyt a \mathfrak{K} és \mathfrak{S} pon-
tokban metszi át, mely pontok tehát a keresett vonalak fek-
vetületei; függvetületei lesznek az ezen ponton keresztül $\alpha'\beta'$ -
el vezetett párhuzamosok. Ha tehát a vetületi síkokat az ere-
deti állásokba visszahelyezzük, akkor megkapjuk a (h, h') és
 (k, k') pontokat, mint a keresett vonalak feknymait; az ezen
ponton $a'b'$ -el párhuzamosan vont $h'd'$ és $k'd''$ vonalak pedig
a keresett függvetületeket fogják megadni.

62. §.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Kerestetnek azon pont vetületei, mely négy a térben
adott ponttól egyenlő távolban van.

Feloldás. Kössük össze az adott pontokat egymás kö-
zött, felezzük az összeköttetési vonalakat, és vezessünk ezen
felező pontokon keresztül oly síkokat, melyek az összekötte-
tési vonalakra merőlegesen állanak. Ezen síkok közös met-
szési pontja lesz a keresett pont. — A 71-ik ábrában (a, a') ,
 (b, b') , (c, c') és (d, d') az adott pontok; $(DC, D'C')$ azon sík,
mely a $(dc, d'c')$ vonal felező pontján keresztül van ugyanezen
vonalra merőlegesen vezetve, az $(AD, A'D')$ sík merőleges az
 $(ad, a'd')$ összeköttetési vonalra, és ennek középpontján megy
keresztül, végre a $(BC, B'C')$ sík a $(bc, b'c')$ vonalra merőleges
ennek felező pontjában. — Továbbá a $(dc.ad, d'c'.a'd')$ vonal
a $(DC, D'C')$ és az $(AD, A'D')$ síkok metszési vonala, úgy
szinte a $(bc.ad, b'c'.a'd')$ vonal a $(BC, B'C')$ és az $(AD, A'D')$
síkok metszési vonalát állítja elé; ezen utóbbi két vonal (o, o')
közös metszési pontja tehát, mint a felező síkok közös pontja,
lesz azon pont, mely a négy adott ponttól egyenlő távolban
van. — A feloldás pontosságáról meg lehet győződnünk, ha

az $(oa, o'a')$, $(ob, o'b')$, $(oc, o'c')$, és az $(od, o'd')$ vonalakat meghuzzuk, és azoknak valódi hosszait meghatározzuk, a melyek pontos munkálatnál mind egyenlők lesznek.

63. §.

Van adva egy egyenes vonal és egy sík, kerestetik azon sík, mely az egyenesen keresztül menve, a síkkal egy adott hajlási szöget képezzen.

Feloldás. Ezen feladatnál három esetet kell megkülönböztetnünk, ugyanis: 1-ször Ha az adott vonal magában az adott síkban fekszik; mely esetben tehát az adott egyenes egyszersmind metsző vonala az adott és a keresett síknak. Ezen feladat nem egyéb, mint a 36. §. 2. pontjában adott feladatnak megfordítása. Ugyanis a 44-ik ábrában FSF' az adott sík, $(Ab, a'B')$ a benne fekvő egyenes, a melynek egy tetszőleges (p, p') pontján keresztül vezettedik egy a metszési vonalra merőleges sík, melynek fekszeldeje DG . Ha ezen sík a feklapba befordítottatik, akkor a (p, p') pont helyzete lesz P -ben, a segéd sík, és az adott sík metszése pedig DP -ben. Most tehát csak a DP oldal mellé szerkesztetik az adott hajlási szög DPE , melynek PE szára addig hosszítatik, míg az a segéd sík szeldejét E -ben nem éri, lesz E a keresett sík fekszeldejének egy pontja, mely már a sík tökéletes meghatározására elegendő, minthogy a keresett szeldeknek az $(Ab, a'B')$ vonal nyomain kell keresztül menni.

Megjegyzendő, hogy ezen feladatnak két oldása lehetséges, a mint ugyanis az adott DPE szög a PD vonal egyik, vagy a másik oldalára szerkesztetik.

Legyen 2-szor az adott egyenes az adott síkkal párhuzamos. Ha a 72-ik ábrában FF' az adott sík, és AB az adott egyenes, akkor ezen utóbbinak egy tetszőleges B pontján keresztül vezessünk egy MN síkot merőlegesen AB -re, leend ez a hajlási szög síkja. Keressük meg azután a két sík CN metszési vonalát, és huzzuk meg az MN síkban a B ponton keresztül azon BC vonalat, mely a metszési vonallal az adott α hajlási szöget képezi; akkor BC a keresett sík egy vonala leend. Meg lehet még jegyezni, hogy a C ponton keresztül az AB -hez vont párhuzamos lesz az adott és a keresett sík át-

metszése, miért is ezen párhuzamos szinte a keresett sík vonala leend. A 73-ik ábrában FSF' az adott sík, $(Ab, a'b')$ pedig az adott egyenes, mely az FSF' síkkal párhuzamosan véttetett fel. Ezen egyenes egy tetszőleges (b, b') pontján van keresztül vezetve az $F_1S_1F_1'$ sík merőlegesen $(Ab, a'b')$ -re; $(gD, G'd')$ pedig a két sík metszési vonala. Hogy tehát most a kellő szerkezetet végbe lehessen vinni, szükség volt az $F_1S_1F_1'$ síkot az S_1F_1 szelvéje körül a feklapba lefordítani, mely műtétel után a (b, b') pont B -be, a metszési vonal pedig DG -be jutott. B -ből tehát most meghuzatott a BC vonal, mely GD -vel az adott $GCB=\alpha$ hajlási szöget képezi. BC tehát az előbb említettek szerint a keresett sík vonala leend, ha tehát azt addig hosszítjuk, míg a forgási tengelyt E -ben nem metszi, lesz E a keresett szelvének egy pontja, a melyen és az A ponton van keresztül vezetve az F_1S_1 fekszelde. A C pont fekvetülete visszafordítva c pontba fog jutni, a melyen tehát keresztül vezetve a Cch párhuzamost Ab -vel, lesz ez a metszési vonal fekvetülete, a h pont H' függvetülete pedig az adott és a keresett sík függszelvéjének közös pontja.

Megjegyzendő, hogy a feladatnak két oldása lehetséges, minthogy B -ből két oly vonalat lehet húzni, mely a CG metszési vonalat az adott $BCG=\alpha$ szög alatt metszi.

Végre 3-szor, ha az adott vonal az adott síkot átmetszi. — A feladat ez esetben azonos azzal, mely az 52-ik cikkben fejtetett meg, azon különbséggel mindazonáltal, hogy az ottani fekvetületi sík helyett most egy tetszőleges sík van megadva. A feloldás azonban itt is ugyanaz marad, csak hogy a szükséges szög és kör szerkesztése miatt az adott sík a feklapba fordíttatik be. Ha ugyanis a 74-ik ábrában FF' az adott sík, AB az adott egyenes, mely a síkot A pontban éri, akkor ezen egyenes egy tetszőleges B pontjából vonatik a BC merőlegesen a síkra, míg azt C pontban át nem dőfi; most már az FF' síkban vonatik a C ponton keresztül egy tetszőleges CD vonal, a melyhez B -ből vezettedik azon BD vonal, mely CD -vel az adott $CDB=\alpha$ szöget képezze, C -ből azután mint középpontból iratik le CD sugárral egy kör, a melyhez A -ból vezettedik az AE érintő, lesz ez az adott és a keresett síknak közös metszési vonala. Meg lehet itt még jegyezni, hogy a DE

vonala szinte a keresett sík vonala lesz, annak nyomai tehát szinte a keresett sík szelvéjében fognak feküdni.

A 75-ik ábrában FSF' az adott sík, $(bH, B'h')$ az adott egyenes, mely a síkot az (a, a') pontban metszi át, ezen egyenes egy tetszőleges (b, B') pontjából vonatott a síkra merőlegesen a $(bc, B'c')$ vonal, és meghatározott ennek (c, c') átdőfési pontja. Azután az adott sík az FS fekszelvéje körül a feklapba fordítottatott le, mely alkalommal az (a, a') pont A -ba, a (c, c') pont pedig C -be jutott, mely utóbbi pont a szerkesztendő kör középpontja leendő. Hogy ezen kör sugarát megnyerjük, szükség lesz szerkeszteni azon BCD derékszögű háromszöget, melynél a D -néli hegyes szög az adott α hajlási szög, az ellentett BC befogó pedig a $(bc, B'c')$ távol valódi hossza; a másik CD befogó lesz a keresett sugár, a melylyel tehát egy körív íratik le, és ehhez A -ból vonatik az AE érintő, mely már az adott és a keresett sík metszési vonala leendő, a feklapba befordítva; miért is, ha ezen érintőt addig hosszítjuk, míg az a forgási FS szelvé K-ban nem metszi, lesz K a keresett sík fekszelvéjének egy pontja; mely által már az $F_1S_1F_1'$ sík tökéletesen meg van határozva. — Ha az adatok nem elég kényelmesek, czélszerű az adott sík függszelvéjét is lefordítani, és azt addig hosszítani, míg a lefektetett AE metszési vonalat M -ben nem vágja, ezen pont azután visszafordítva, megadja az adott és a keresett síkok függszelvéjének közös pontját.

Megjegyzendő, hogy ezen feladat szinte két oldással bír, mert az A pontból a körhöz két érintőt lehet vonni.

64. §.

Adva van három pont: A, B , és C , kerestetik azok síkjában egy negyedik oly tulajdonságú pont: M , hogy az összekötve a három adott ponttal, az eredt AMB , és BMC szögek az adott α , és β szögekkel legyenek egyenlők.

Feloldás. Legyenek a 76-ik ábrában (a, a') , (b, b') és (c, c') az adott pontok, akkor összekötvén (b, b') -et (a, a') és (c, c') -el lesz DE azon sík fekszelvéje, mely az adott pontokon keresztül vezethető. Ha ezen síkot a talált fekszelvéje körül a feklapba lefordítjuk, akkor az adott pontok helyzete leendő

A , B , és C -ben. Ha most az AB vonal egy merőleges által feleztetik, és B -nél az adott α szögnek 90 fokrai pótléka szerkesztetik, míg annak szára a felező merőleget p -ben nem metszi, akkor a p középpontból pB sugárral leírt kör mindegyik pontja A és B -vel összekötve az α szöget fogja képezni. — Ugy szinte, ha a BC vonal feleztetik egy merőleges által, és C -nél szerkesztetik az adott β szögnek 90 fokrai pótléka, míg ennek szára a merőleget q -ban nem metszi, akkor a q középpontból qC sugárral leírt kör minden pontja összekötve a B és a C pontokkal, az adott β szöget fogja képezni; azon M pont tehát, hol ezen két kör egymást átmetszi, leendő a keresett negyedik pont a feklapba lefordítva. Ha tehát a pontok síkja ismét a DE fekszeldeje körül az eredeti állásába visszafordítatik, lesznek m , és m' a kérdéses pont vetületei. — Ezen feladatnak még egy más oldás is megfelel, mely az ábrában az N pont által van képviselve, s melyet úgy nyerünk meg, ha az α , és a β 90 fokrai pótlékait az illető vonalak másik oldalára szerkesztjük. Különbözik az adott pontok helyzetéhez, és az adott szögek nagyságához képest a feladat megoldásának száma is különböző; a mely is a legkedvezőbb esetben négyre terjedhet.

65. §.

Adva van egy derékszögű BAC háromszögnek fekvétele bac , a 77-ik ábrában, mely szinte derékszögű; kerestetik a forgási tengely, és a hajlási szög, ha a BAC háromszög szögei ismeretesek.

Feloldás. Hogy egy derékszög ismét derékszögű vetületet adjon, azt csak is az egyik szára körül lehet forgatni, vagy egy tengely körül, mely az egyik szárral párhuzamos. A jelen esetben tehát szinte a két befogó ab , vagy ac egyike lehet csak a forgási tengely, vagy egy oly egyenes, mely ezek valamelyikével párhuzamos. — Tegyük fel, hogy ab a forgási tengely, akkor ez egyszersmind a valódi BAC háromszög AB oldalával is egyenlő; fordítsuk le tehát a BAC háromszöget az AB oldala körül a feklapba, akkor a derékszögek miatt az AC szár ac -re fog esni, talán C_1 -ig, mely pont a és c közt fekszik, ha a B szög kisebb, mint a b szög, vagy C_2 -ig, mely

pont az ac meghosszításán fekszik, ha a B szög nagyobb a b szögnél. Minthogy pedig a valódi háromszögnek nagyobbnak kell lenni, mint a vetületnek, az ab befogót csakis akkor lehet forgási tengelynek venni, ha az adott B szög nagyobb b -nél. Ellenben, ha az adott B szög kisebb volna b -nél, akkor bizonyosan C nagyobb c -nél, ez esetben tehát az ac befogó volna a forgási tengely, mely körül tehát a BAC háromszöget lefektetve, az AB oldal ab -re fog esni, és a B pont az ab vonal meghosszabbítására eshet csak, például B_1 -ig.

Ezekből eléggé világos, hogy, ha egy derékszögű háromszög az egyik befogója körül forog, akkor az ezen befogó melletti hegyes szög vetülete folytonosan kisebbedik, míg az ellenes hegyes szög növekedik. Minthogy pedig a szög valódi nagysága meg van adva, a hegyes szögek egyszerű összehasonlításából már könnyű megbirálni, hogy a két befogó közül melyik a forgási tengely. A melyik vetületi szög ugyanis nagyobb a megfelelő valódi nagyságnál, az ezen szöggel átellenes befogó a forgási tengely.

Az említett elmélkedés folytán tehát nemcsak a forgási tengelyt lehet felismerni, de egyszersmind a BAC háromszög valódi nagyságát is, melyek után tehát a hajlási szög meghatározása az előbbieket folytán igen egyszerűen eszközölhető.

66. §.

Kerestetik egy ABC háromszögnek függvetülete, ha adva van mind a három szög, és a fekvetület.

Feloldás. Legyen 78-dik ábrában ABC a keresett háromszög, abc annak adott fekvetülete, s minthogy az ABC háromszög oldalai ismeretlenek, de ismertek annak szögei, legyen $\alpha\beta\gamma$ egy oly háromszög, mely az adottal hasonló, és hol az $\alpha\gamma$ oldal egészen tetszőlegesen vététt fel.

Ha már most az ABC háromszögben az AC oldalon lemetsetik egy tetszőleges AD rész, melynek vetülete ad , akkor az ABD háromszög vetülete lesz abd ; — ha továbbá az $\alpha\gamma$ oldalon szinte úgy metszetik le egy ad rész, hogy: $\alpha d : AD = \alpha\gamma : AC$, vagy a mi ugyanaz, hogy: $\alpha d : ad = \alpha\gamma : ac$; akkor az ABD és $\alpha\beta\delta$ háromszögek hasonlóak, minthogy az α szög egyenlő az

A szöggel, és a befogó oldalak aránylagosak; következik tehát, hogy az ABD szög is egyenlő az $\alpha\beta\delta$ szöggel. Hasonló okoknál fogva, ha az AC meghosszabbításán vétetik fel egy tetszőleges E pont, mely azután B -vel összeköttem, akkor a BCE háromszög vetülete bce , és CBE szög egyenlő a $\gamma\beta\epsilon$ szöggel, ha ϵ úgy választott, hogy:

$$\gamma\epsilon : \alpha\gamma = CE : AC = ce : ac$$

Ezeket előre bocsátván, már könnyű belátni, hogy azon sík meghatározásánál, melyben a keresett ABC háromszög fekszik, ezen háromszöget pótolhatja a DBE háromszög, melynek vetülete dbe , és a melynek valódi szögei a $\delta\beta\epsilon$ háromszög által vannak meghatározva.

Ha tehát a D és E pontokat úgy választjuk, hogy az által először a nyert $DBE = \delta\beta\epsilon$ szög derékszöggé váljék, de másodszor, hogy ezen szögnek dbe vetülete szinte derékszög legyen, akkor a feladatunkat visszavezettük az előbbi feladat feloldására. Hátra van tehát még csak megmutatni, hogy mikép kell a d , és e pontokat úgy megválasztani, hogy az által ne csak a dbe szög, de a $\delta\beta\epsilon$ szög is derékszögűvé legyen.

Mínthogy az $\alpha\gamma$ oldal egészen tetszőleges, czélszerű lesz azt az ac -vel egyenlőnek venni, mi által azután a lementszett vagy hozzácsatolt ad és $\gamma\epsilon$ részek az ad és ce részekkel szinte egyenlők leendenek, mínthogy továbbá a dbe , és a $\delta\beta\epsilon$ szögek derékszögek, azért azok csúcsai oly körökben fognak feküdni, melyek átmérői az ae illetőleg ae vonalokra esnek. Ha tehát az $\alpha\gamma\beta$ háromszöget úgy rajzoljuk, hogy annak $\alpha\gamma$ oldala az adott abc háromszög ac oldalára essék, mint a 79-dik ábrában, akkor a d és e pontok azon kör átmérőjének végpontjait fogják képezni, mely a (b) és (β) pontokon keresztül megy, és a melynek középpontja az ac vonalban fekszik; miért is ezen kör meghatározására csak is a $b\beta$ távolság kell merőleges által felezni; ezen merőleges és az ac vonal közös o pontja lesz a keresett kör középpontja; és $ob = o\beta$ a sugár; a leírt kör az ac vonalat a keresett d és e pontokban metszi át; úgy hogy az adott abc háromszög helyett veendő a dbe derékszögű háromszög, melynek megfelelő valódi DBE derékszögű háromszög szögei a $d\beta\epsilon$ háromszög szögeivel egyenlők.

A jelen ábrában tehát, hivatkozva az előbbi feladat fel-

oldására, minthogy a βde szög kisebb a megfelelő bde szögnél, azért ezen utóbbi szög átellenes befogója be lesz a forgási tengely, hogy pedig a dbe háromszög valódi nagyságát megtaláljuk csak a be befogó mellé rajzoljuk a valódi βed szöveget, a mi legegyszerűbben az által vitetik végbe, hogy a $b\beta$ ívet d -től kezdve reávísszük a körre folytatólag g -ig, minthogy a βed szög mérete a fél $\beta d = bg$ ív. — Ha tehát g pont e -vel összekötjük, és az eg egyenes addig hosszítatjuk, míg a bd merőlegest D -ben nem metszi, lesz bDe a bde vetülethez tartozó valódi hossz, és ennél fogva ω a hajlási szög.

A nyert be forgási tengely, úgy szintén az ω hajlási szög már most egyaránt érvényesek a dbe , mint az adott abc háromszögre is.

Az említett mód szerint mindig meghatározható a szükségelt kör o középpontja, kivéve azon egy esetet, hol a b és β pontok összekötetési vonala az ac oldalra merőleges; de ez esetben minden további szerkesztés nélkül könnyű belátni, hogy ac maga a forgási tengely.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára

Székelvudvarhely

Adva van három egymással párhuzamos egyenes vonal kerestetik egy negyedik, mely az adottaktól egyenlő távolban van.

Feloldás. Vezessünk egy síkot merőlegesen az adott egyenesekre, s keressük meg az átdőfési pontokat; — határozzuk meg továbbá a 49-ik cikk szerint azon kör középpontját, mely a három átdőfési ponton megy keresztül; végre a talált középponton keresztül vezessünk az egyenesekkel párhuzamost.

68. §.

Adva van három egymást ugyanazon pontban metsző egyenes vonal, kerestetik egy negyedik, mely az adottakkal egyenlő szögeket képezzen.

I. Feloldás. Legyenek a 80-ik ábrában SA , SB , és SC az adott egyenesek, a melyeken az S közös csúctól kezdve az egyenlő $SA = SB = SC$ részek vannak lemetszve. Határozzuk meg azon kör középpontját, mely az A , B , és C pon-

tokon megy keresztül, és kössük össze a nyert kör O középpontját a közös S csúcscsal, akkor az ASO , BSO és CSO háromszögek azonossága következtében az ASO , BSO , és CSO szögek is egyenlők lesznek. A kivétel a 81-ik ábrában van eszközölve, hol $(sa, s'a')$, $(sb, s'b')$ és $(sc, s'c')$ az adott egyenesek, ezeknek először is meghatározott a valódi hosszuk az által, hogy ugyanazon fekhajlás mellett addig forgattattak az S pont körül, míg a függlappal párhuzamosok nem lettek (sd, sd') , (sd, sd'') és (sd, sd''') , most levágattak az egyenlő $s'A'$, $s'B'$, és $s'\delta'''$ részek, és visszaforgatás után meghatározattak az (a, a') , (b, b') és a (c, c') pontok.

Most az $(abc, a'b'c')$ háromszög síkja a meghatározott fekszeldeje körül a feklapba fordítattott le, és mértanilag szerkesztetett a valódi nagyságú ABc háromszög O középpontja, (lásd a 49-ik §.), melynek vetületei a visszafordítás után (o, o') -be jutnak; mely pontot az (s, s') -el összekötve, lesznek $(so, s'o')$ a keresett vonal vetületei, melyek ugyanis az adottakkal egyenlő szögeket képeznek.

II. *Feloldás.* Minthogy a 80-dik ábrában O az ABC háromszög körül írt kör középpontja, azért az AC vonal D felezőpontjának O -vali összeköttetése AC -re merőleges, minthogy továbbá az ASD és CSD háromszögek azonossága folytán SD szinte merőleges AC -re, azért az SD és DO egyeneseken keresztül vezetett SDO sík szinte merőleges lesz AC -re, vagy fordítva, az S ponton keresztül AC -re merőlegesen vezetett sík az SO vonalon megy keresztül. Ugyanez áll az S ponton keresztül merő, és AB -re, vagy BC -re merőlegesen álló síkokról is. Miért is, ha a 82-ik ábrában már meg vannak határozva a közös (s, s') ponttól egyenlő távolságba eső (a, a') , (b, b') és (c, c') pontok, akkor csak az (s, s') ponton vezetettnek keresztül az $F'SF$ és $F_1'S_1F_1$ síkok, melyek illetőleg az $(ac, a'c')$ és $(bc, b'c')$ vonalokra merőlegesen állanak, ezen két sík közös metszési vonala leendő azután a keresett egyenes.

Meg lehet itt még jegyezni, hogy ezen feladatot általánosabban így is lehet fogalmazni: Adva van három tetszőleges egyenes vonal, és egy pont; vezetessék e ponton keresztül egy negyedik egyenes vonal, mely az adottakhoz egyenlő szögek alatt hajlik.

Ez esetben ugyanis előbb az adott ponton kell keresztül vezetni a három adott egyenest, és azután az előbbieket folytán a keresett egyenest meghatározni; minthogy az egyenes párhuzamos elmozdítása által, annak iránya nem változik meg.

69. §.

Adva van két egymást metsző egyenes vonal, kerestetik egy harmadik, mely szinte a metszési ponton keresztül menve, a két adott egyenessel, és a fekvületi lappal egyenlő szögeket képezzen.

Ezen feladat megoldására egy tömörmértani tételre van szükségünk, melyet mint még valószínűleg ismeretlent, következőkben röviden közlök; s melyet szavakba foglalva így adhatunk elő: Ha az $ACBD$ kerület (83-ik ábra) f gyupontjában egy merőleges emeltetik a kerület síkjára, és erre felvitetik a kerület kisebb féltengelye F -ig, úgy hogy $Ff = OD$; és az F pont egy oly kúp csúcsának vétetik, melynek irányvonala az adott kerület; akkor ezen kúp bármelyik alkotója FM húzatik is meg, azon szögek, melyeket ezen alkotó a tengellyel, és a kúp magasságával képez, együttvéve mindig egy derékszöget képeznek, vagyis minden tetszőleges alkotónál $\beta + \alpha = 90^\circ$.

E tétel bebizonyítására kössük össze a felvett M pontot a gyuponttal, és a kerület O középpontjával, úgy szinte M -ből huzzunk a nagyobb tengelyre egy Mm merőlegest, és nevezzük az Om metszékét x -nek, az Mm rendezőt pedig y -nak, akkor: az elemző síkmértan ismert tételei szerint

$$Mf = a - \varepsilon x \dots ^1)$$

ha (a) a kerület nagyobb féltengelye, ε pedig a külpontossági tényező. Továbbá az MfF derékszögű háromszögből, melyben $Ff = b = a$ kerület kisebb féltengelyével, következik:

$$MF = \sqrt{b^2 + (a - \varepsilon x)^2} \dots ^2)$$

az OmM háromszögből pedig:

$$OM = \sqrt{x^2 + y^2}$$

vagy minthogy a kerület egyenletéből $y^2 = b^2 - \frac{b^2 x^2}{a^2}$, azért

$$OM = \sqrt{b^2 + \varepsilon^2 x^2} \dots ^3)$$

tekintetbe véve ugyanis, hogy a külpontosság

$$ae = \sqrt{a^2 - b^2}$$

Ezeket előre bocsájtván az OFM háromszögből a Carnot tétele szerint következik, (tekintetbe véve még, hogy $OF=a$), hogy

$$\begin{aligned} \cos \beta &= \frac{OF^2 + FM^2 - OM^2}{2 \cdot OF \cdot FM} \\ &= \frac{a^2 + b^2 + (a - \varepsilon x)^2 - b^2 - \varepsilon^2 x^2}{2a \sqrt{b^2 + (a - \varepsilon x)^2}} \\ &= \frac{a - \varepsilon x}{\sqrt{b^2 + (a - \varepsilon x)^2}} \dots^4) \end{aligned}$$

az MfF háromszögből pedig :

$$\sin \alpha = \frac{Mf}{MF} = \frac{a - \varepsilon x}{\sqrt{b^2 + (a - \varepsilon x)^2}} \dots^5)$$

A nyert 4) és 5) egyenletek összehasonlításából következik, hogy : $\cos \beta = \sin \alpha$

innét pedig, hogy ; $\beta + \alpha = 90^\circ$, mely egyenlet által fentebbi tételünk be van bizonyítva.

E tételtől fordítva most már következik az is, hogy mind azon egyenesek lábpontjai, melyek az F ponton úgy vezetnek keresztül, hogy az eredő α és β szögek összege 90 fokot adjon, mind ezen egyenesek lábpontjai egy oly kerületbe esnek, melynek középpontja az FO tengely lábpontja, melynek nagyobb féltengelye maga az FO egyenes, kisebb tengelye pedig az F pont vetítő Ff vonala, a melynél tehát az F pont f vetülete a gyupont.

Minthogy továbbá az MfF háromszög derékszögű, azért az FM egyenes fekhajlási γ szöge az α -val együtt szinte 90 fokot képezvén, állandó szinte hogy $\beta = \gamma$; vagyis, hogy a szóban levő kúpnál minden tetszőleges alkotó a kúptengellyel, és a feklappal egyenlő szögeket képez.

Visszatérve ezek után a feladatunkra (e cikk elején) legyenek a 84-ik ábrában $(ac, a'c')$, és $(bc, b'c')$ az adott, és egymást (c, c') pontban metsző vonalak ; akkor tekintsük ac -t egy oly kerület külpontosságának, melynek nagyobb féltengelye az $(ac, a'c')$ vonal valódi hossza aC , melyet az $(acb, a'c'b')$ háromszögnek a feklapbai lefordítása által nyertünk.

Ha ac fekvületre az a pontban emelünk merőlegest, a

melyre a -tól kezdve mindegyik oldalra feltesszük a (c, c') pont fekvető pc' vonalát, megnyerjük a kerülék kisebb tengelyeit; ha pedig az ac meghosszabbítására szinte a -tól kezdve felvisszük az aC távot C_1 -ig, leend aC_1 a kerülék nagyobb féltengelye; és a szerkesztett EC_1DC_1 kerülék bármelyik pontja összekötve a (c, c') ponttal oly vonalat fog adni, melynek fekhajlási szöge egyenlő azon szöggel, melyet e vonal az $(ac, a'c')$ vonallal képez.

Úgy szinte ha egy másik GC_2H kerülék szerkesztetik, melynek bc a külpontossága, a nagyobb tengelye pedig a $(bc, b'c')$ vonal valódi hossza, akkor ezen kerülék bármelyik pontja összekötve a (c, c') ponttal egy oly egyenest ad, melynek szöge a $(bc, b'c')$ vonallal épen akkora lesz, mint a felvett vonal fekhajlási szöge.

Ha tehát a két kerülék közös m , és n pontjai köttetnek össze a (c, c') ponttal, akkor a nyert $(nc, n'c')$ és $(mc, m'c')$ egyenesek oly tulajdonnal birnak, hogy mind a két adott vonalhoz, és azonfelől a feklaphoz is egyenlő szög alatt fognak hajolni, s így e két vonal az adott feladatnak oldalait adják meg.

Megjegyzendő azonban, hogy e két kerülék egyikét egészen mellőzni lehet. Ha ugyanis meghuzzuk az adott két vonal felező (Cd) vonalát, és ezen a vonalon teszünk keresztül egy oly sikot, mely az adott vonalak síkjára merőleges, akkor bizonyos, hogy mind azon vonalak, melyek az adott egyenesekkel egyenlő szöget képeznek, csak is ebben a síkban fekehetnek, azok lábpontjai tehát, ezen sík fekszeldejébe fognak esni. Ha tehát például a (c, c') ponton keresztül vezetünk az ABC háromszög síkjára egy $(ck, c'k')$ merőlegest, és ezen, és a felező $(cd, c'd')$ vonalon egy sikot vezetünk keresztül, akkor ezen sík kd fekszeldejének szinte az m , és n pontokon kell keresztül menni; miért is ez egyenes fogja az egyik kerüléket pótolhatni.

Mínthogy továbbá ez utóbbi megjegyzés szerint csak egy egyenes és egy kerülék átdőfési pontjai kerestetnek, azért a másik kerülék is az egyszerűbb kör által lesz pótolandó; e célra nézve csak a GC_2H kerüléket a GH kisebb tengelye körül (a metsző vonallal együtt) addig képzeljük forgatva

míg a kerülék körbe vetítetik, meghatározzuk most a metszési M és N pontokat, és azokat visszafordítás által a vonal előbbi állásán határozzuk meg.

E feladat tiszta megoldása tehát a kerülékek nélkülözésével a 85-ik ábrában ismételtetett.

Végre könnyű belátni, hogy ezen feladatnak legáltalánosabb alakbani fogalmazása a következő lehet: Van adva két tetszőleges egyenes vonal A és B , azonfelül egy pont C , és egy sík M . Kivántatik, hogy a C ponton egy oly egyenest vezessünk keresztül, melynek az A és B vonalakhoz, úgy szinte az M síkhoz ugyanazon hajlása legyen.

II. Szakasz.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára

A háromél leíratí feloldása.

1. §.

Ha két nem egyenközü sík egy harmadik által metszetik, akkor mind a három sík egy közös pontban fog egyesülni; mert minthogy a harmadik (c) sík, a másik két (a) és (b) síkot metszi, metszeni fogja ezen utóbbiak közös vonalát is; ámde e közös vonal a metsző (c) síkot csak egy pontban dőfheti át, így hát a (c) síknak a másik kettővel is csak egy közös pontja lehet.

A három sík ezen közös pontja vagy végtelen, vagy véges távolba eshetik. Az első esetben a három sík hasábot képezend, az utóbbiban pedig a tér egy oldalról bekerítettik, és ered egy tömörszög, a háromél.

Minden háromélnak hat lényeges része van, melyek közül azon három szöget, melyet a három él képez, *oldalnak*, azon szöget pedig, melyet két lap képez egymással, egyszerűen *szögnek* fogjuk nevezni.

2. §.

Mielőtt a háromél leirati feloldásával foglalkoznánk, szükséges leend az e tárgyra vonatkozó leglényegesebb tan-tételeket előre bocsátani.

1. Két oldal összege nagyobb minden háromélben a harmadik oldalnál. Mert ha az adott oldalak egy síkba egyenítve rajzoltatnak egymásmellé (86. ábra), és (a) oldal nagyobb volna, mint (b) és (c) összege, akkor ez utóbbi oldalak síkjai SN , és SP' élek körül forgatva egymást nem metszhetnék, és így háromélt nem képezhetnének.

2. Mentől nagyobbak az egyes oldalak, annál tompább leend a tömörszög, míg végre, ha az oldalak összege 360 fokot képez, a tömörszög síkká válik, a miből következik, hogy az oldalak összege 0 és 360 fok határok közé van szorítva.

3. Ha a tér bármely pontjából, például Q -ból (87. ábra) merőlegeseket bocsájtunk a háromél három síkjára, akkor ezen három merőleges QA' , QB' és QC' egy új háromélt képezend, mely az előbbi *egészítőjének* neveztetik, és azon megjegyzendő tulajdonsággal bír, hogy oldalai az adott szögeit, szögei pedig az adott háromél oldalait 180 fokra egészítik ki. — E fontos tétel bebizonyítására képzeljünk QA' és QB' merőlegeseken keresztül egy síkot, mely sík tehát merőlegesen álland az (a) és (b) oldalak lapjaira, és azért merőlegesen ezek metsző PC vonalára is. Ha tehát az átdőfési C pont A' és B' -el összeköttetik, $B'CA'$ szög lesz az (a) és (b) oldalak hajlási szöge. De $CB'QA'$ négyszögben az A' és B' -nél szögek ép-szögek, tehát c' és C szögek összege 180 fok. — Ugyan ez áll a másik két oldalról is; úgy, hogy általában, ha valamely háromél három oldala (a) , (b) és (c) , három szöge pedig A , B , és C -vel jelöltetik, álland:

$$a + A' = 180^\circ; b + B' = 180^\circ; c + C' = 180^\circ \text{ és fordítva} \\ A + a' = 180^\circ; B + b' = 180^\circ; C + c' = 180^\circ.$$

4. Minden háromél három szöge együttvéve nagyobb 180° -nál, mert az egészítő háromélnél állani kell (a 2. pont szerint)

$$a' + b' + c' < 360^\circ$$

és helyettesítve a 3. pont egyenleteit:

$$(180 - A) + (180 - B) + (180 - C) < 360^\circ \text{ vagy}$$

$$A + B + C > 180^\circ$$

5. Ha valamely háromélben két oldal egyenlő, akkor az ellentett szögek szinte egyenlők. Mert legyenek (88-ik ábra) (b) és (c) oldalak egyenlők, és bocsássunk (a) oldalra az ellentett él bármely Q pontjából egy Qq merőlegest, továbbá szinte Q -ból QB és QC merőlegeseket SB , és SC élekre, és kössük össze B -t és C -t (q) ponttal, lesz QBq szög a (c) és (a) oldalak hajlási szöge, úgy szinte QCq szög a (b) és (a) oldalaké. — De SQB és SQC háromszögek azonosak, mert $b = c$ felvétel szerint, SQ közös, és $SQB = SQC = 90^\circ$, innét $QB = QC$; — továbbá QqB azonos QqC -vel, mert $QB = QC$, mint azt imént bebizonyítottuk, Qq közös, $QqB = AqC = 90^\circ$, és innét B szög $= C$ szöggel.

Innét továbbá következik; hogy 1. SQ -nak (a) sikrai vetülete (a) oldalt felezi; 2. hogy azon háromélben, melyben mind a három oldal egyenlő, egyszersmind mind a három szög is egyenlő.

Haáz Rezső Műcs. Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely

Legyen már most egy háromél vetületei által adva, keressük annak oldalait, és szögeit.

A 89-ik ábrában a fekvetületilap az adott háromél (a) oldalával azonos; ezen fölvétel következtében (a) oldal megtartja valódi nagyságát, SB és SC élek a fekvetületilapba esnek, a harmadik él vetületei pedig (sp , $s'p'$) vonalak által vannak megadva.

Hogy már (c) oldal valódi nagyságát és (a)-vali hajlási szögét föl lehessen találni, szükséges leendő ugyan ezen (c) oldal lapját SB fekszedéje körül mind addig forgatni, míg a feklappal magával össze nem esik. Ezen forgás alkalmával (c) lap bármelyik pontja, például (p , p') az SB forgási tengelyre merőleges körivet irand le, melynek középpontja B ; és melynek sugara BP'' , azon derékszögű háromszögnek átfogója, melynek egyik befogója Bp nem egyéb, mint a P pont fekvetületének távolsága a forgási tengelytől, a másik befogója pP'' a P pont függőleges magassága; mert BpP'' épháromszög tulajdonképp a feklapra merőleges és csak a szerkezet végbevihetése

okaért van Bp befogója körül a feklapba befordítva; a miből egyszersmind kitűnik, hogy $P''Bp$ szög a (c) lap keresett hajlási szöge; BSP szög pedig a (c) oldal maga. Ugyanezen eljárást kell ismételnünk a (b) oldal, és hajlási szöge feltalálására.

Most már nincs egyéb hátra, mint az (a) oldallal ellentett A szög feltalálása. — E célra vegyük tekintetbe, hogy A szög a (b) és (c) oldalak hajlási szöge, melyet tehát úgy fogunk megnyerni, ha a közös metszési $(sp, s'p')$ vonalra egy merőleges sítot teszünk, például (p, p') ponton keresztül; e sít a (b) , (c) és (a) lapot egy háromszögben metszi, melynek csúcsa (p, p') pont, alapja pedig a feklapban Sp vetületre merőleges leendő, az A szöget befogó szárak mindegyike pedig merőleges az (Sp, Sp') metsző vonalra. Ha tehát a lefektetett (c) lap P pontjában emelünk egy Pn merőleget, SP -re, úgy szinte (b) lap P pontjában egy $P'm$ merőleget a lefektetett $(Sp, S'p')$ vonalra, SP' -re, leendő mn a keresett háromszög alapja; Pn és Pm pedig az A szöget befogó szárak, mely adatok már most az nAm háromszög képzésére elégségesek.

Ezen eljárásból már most könnyen következik:

1. Hogy pP'' és pP''' egyenlők, mert mind a két vonal a (p, p') magassága a feklap felett.

2. Hogy PA és $P'A$ íveknek Sp vonal ugyanazon pontjában kell találkozniok, mert A nem egyéb mint az mn körül a feklapba lefordított (p, p') pont, melynek tehát a forgási mn tengelyre egy merőleges körívet kell leírni; de

3. mn vonalnak Sp -re merőlegesnek kell lenni, mert mn az nAm háromszög sítjának szeldéje, mely sít az (Sp, Sp') -re merőlegesnek vétetett fel.

4. SP és SP' vonalak egyenlők, mert mind kettő (Sp, Sp') vonalnak egyszerű lefordítása a feklapba, és így egyszersmind $(Sp, S'p')$ vonalnak valódi hosszai; végre

5. S, B, p , és C pontok egy kör területében fekszenek (mert $SBpC$ négyszögben a két ellentett B és C szögek összege 180°), mely kör átmérője Sp vonal, azért, mert a B és C szögek derékszögek.

4. §.

Ha a háromél hat része közül három adva van, a másik három szerkesztés által mindig fellelhető. Minthogy pedig hat elemből huszszor lehet más három adatot választani, öszvesen húsz feladat volna megoldandó. De ezen feladatok csak e következő, egymástól különböző hatféltre oszlanak :

1. Ha adva van a három oldal.
2. Ha adva van a három szög.
3. Ha adva van két oldal, és a közbefoglalt szög; mely adatokat háromszor lehet változtatni.
4. Ha adva van két szög, és a közbenfekvő oldal; szinte három változtatással.
5. Ha adva van két szög, és az egyikkel ellentétes oldal, mely adatokat hatszor lehet egymás közt felcserélni; és végre
6. Ha adva van két oldal, és az egyiknek ellentett szög; szinte hat módosítással.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
5. §. Székelyudvarhely

Első eset: Adva van a háromél három oldala, kerestetik a három szög.

Feloldás. Szerkeszszük a három adott szöget (90-ik ábra) a feklapba egymás mellé, válasszunk azután a közös metsző SP vonalon egy tetszőleges P pontot; — ha most a (c) oldal lapja SB él körül forgattatik, P pont SB -re egy merőleges kört irand le, melynek fekvetülete Pp . De minthogy P pont egyszersmind a (b) lapban is fekszik, vegyük $SP' = SP$, és forgassuk (b) lapot is SC éle körül, akkor P' pont szinte egy SC -re merőleges ívet irand le, melynek fekvetülete $P'p$. — Minthogy tehát P pont vetületének Pp és $P''p$ vonalakban kell feküdnie, ez nem lehet egyébütt, mint a közös (p) metszőpontban; (s) pont pedig, mint a forgási tengelyek közös pontja helyéből nem mozdulván, leend — miután az illető síkok éleik körül addig forgattattak, míg egymást metszik — sp a (b) és (c) lapok metsző vonalának fekvetülete. — Hogy még P , vagy P' pont magasságát megkapjuk, szükséges leend a PBp ívet a feklapba befördíteni, itt PP'' ív a (p) pontban emelt pP'' me-

rölegest P'' pontban metszi; és pP'' leend a P pont keresett magassága. Ugyanazon eredményre jutottunk volna, ha a PBp ív helyett a $P'CP$ ívet fektettük volna a feklapba. Összehasonlítva már most a jelen esetet az általános feladattal, könnyű észrevenni, hogy pBP'' szög az (a) és (c) lapok hajlási szöge, úgy szinte pCP'' az (a) és (b) lapoké. Az (a) oldal ellentett szöge már a 3-ik §. szerint könnyen feltalálható.

6. §.

A 91-ik ábrában ugyanezen feladat van megoldva azon esetre, ha mind a három oldal tompa szög; — az eljárás azonos azzal, melyet az előbbi §-ban kifejtünk, azon megjegyzéssel, hogy most a P és P' pontokból merőlegesek nem az élekre magokra, hanem azok visszshosszabbításaikra esnek, a miért is a nyert hajlási szögeket 180 fokra kell pótolni.

7. §.

Második eset: Adva van a háromél három szöge, keresetik a három oldal.

I. *Feloldás.* Legyen A, B , és C az adott három szög, melyek összege 180° -nál nagyobb, feltételeztetik (2. §. 4-ik pont). Pótolván az adott szög mindegyikét 180 fokra, erednek az egészítő háromélnek három oldalai: a' , b' és c' (2. §. 3-ik pont). Ezen három oldalból határozzuk meg (az 5-ik §. szerint) a három szögeket: A' , B' és C' -et. — Az így nyert szögek mindegyikét pótoljuk ismét 180 fokra, megkapjuk az adott háromél keresett három oldalát: a , b és c -et.

II. *Feloldás* az egészítő háromél nélkülözésével. Használjuk a (c) oldal lapját (92-ik ábra) feklapnak, és az egyik szárára függélyes lapot függvetületi lapnak, akkor az egyik adott szög A a függlapban valódi nagyságában forduland elő, minthogy a függlap a (b) és (c) lapok közös metszésére, és így magokra az említett lapokra is merőlegesen áll. Most csak még az (a) oldal lapja lesz úgy előállítandó, hogy a feklappal az adott B szöget, a már szerkezett (b) lappal pedig az adott C szöget képezze.

Megjegyzendő itt még, hogy az (a) és (b) oldalak közös metszési vonalának függvetülete szükségkép a (b) oldallal

függészeldéjébe fog esni, minthogy ez utóbbi lap a függlapra merőleges.

Vegyük tehát ezen metszési vonal bármely (p, p') pontját, és tekintsük úgy, mint egy kúp csúcsát, melynek alkotói a feklapot az adott B szög alatt metszik, akkor minden sík, mely ezen kúpot érinti, a feklappal szinte a B szöget fogja képezni. — Legyen továbbá (p, p') pont egy másik kúpnak csúcsa, melynek alkotói a (b) lappal az adott C szöget képzik, akkor minden sík, mely e kúpot érinti, a (b) lapot szinte a C szög alatt fogja metszeni. — Ha tehát egy oly síkot állítandunk elő, mely egyszerre mind a két kúpot érinti, azon sík egyszersmind a (c) lappal az adott B szöget, (b) lappal pedig az adott C szöget fogja képezni, és így feladatunknak eleget teend.

A 92-ik ábrában (p, p') a két kúp közös csúcsa, $(p, m'p')$ az egyiknek tengelye, és a (c) lapra függélyes, $(pn, p'n')$ a másik kúp tengelye, és ez a (b) lapra áll merőlegesen.

Hogy most e két kúphoz közös érintő lapot vezethessünk, a két kúpot egy tetszőleges, legcélszerűbben egy vízirányos MN lappal fogjuk átmetszeni; a metszés a (c) lapra merőleges kúpnál kör, a (b) lapra merőleges kúpnál pedig kerülék leend. Az e két görbéhez huzott közös érintő vonal a keresett érintő síkban fog feküdni; és minthogy ez egyenes egyszersmind vízirányos, azért a keresett sík fekszeldéjével leend egyenközű; de ezen SR fekszeldének egyúttal a (c) lapra merőleges kúp alapját is kell érintenie, azért csak ez alapkörhöz kell egy érintőt huzni, mely egyszersmind egyenközű legyen a kör és kerülék közös érintő vonalával, xy -al.

Jegyzet. Ha az említett kör és kerülék egymást nem metszik, hozzájuk négy közös érintőt lehet vonni, különben csak kettőt. Azonban ebből nem következik, hogy a feladatnak több mint egy feloldása van, mert az ábrának figyelmes megtekintéséből tüstént kitünendik, hogy ezen külön feloldások a B és $180-B$, C és $180-C$ szögeknek felelnek meg; és pedig, ha a kör a kerüléket nem metszi, akkor következő négy feladat oldatik meg:

1. Ha az adott szögek; A, B , és C
2. $n \quad n \quad n \quad n \quad A, 180-B, C$

3. Ha az adott szögek A, B , és $180 - C$

4. „ „ „ „ „ $A, 180 - B$, és $180 - C$

Ha pedig a kör a kerületet metszi, a feladatok ketteje lehetlenné válik, mert a szögek összege kisebb lesz 180 foknál.

III. *Feloldás.* Legyen a 93-ik ábrában ωSy az egyik A szög, mely valódi nagyságában a feklapra van rajzolva, akkor ezen felvétel folytán a (b) és (c) oldalak közös metszése a feklapra merőleges, és vetülete S -ben összpontosul. — Ezen merőlegesben lesz a háromél csúcsa; és képzelhetjük a háromélt magát addig lenyomva, míg ezen csúcs maga a feklapba esik, így tehát most S a háromél csúcsa, Sx pedig és Sy a (b) és illetőleg (c) oldalak síkjának fekszeldéi; és a feladatunk megfejtésére csak egy harmadik síkot kell felkeresnünk, mely az adott, és a feklapra merőleges Sx , és Sy síkokkal a szinte adott C , és illetőleg B hajlasi szögeket képezze.

Emeljünk S pontban Sx -re egy merőlegest, Ss_{11} , és tekintsük azt egy oly körkúp tengelyének, melynek alkotói az Sx síkhoz az adott C szög alatt hajolnak, akkor bizonyosan mind azon síkok, melyeket az S ponton keresztül Sx hez C hajlasi szög alatt vezethetünk, e körkúpot érinteni fogják.

Hasonlóan, ha Sy -ra emeljük S -ben az Ss_1 merőlegest akkor ez szinte egy oly körkúp tengelyének tekinthető, melynek alkotói a Sy síkhoz az adott B szög alatt hajolnak, és így fordítva, mind azon síkok, melyek az Sy síkkal B szöget képezve az S ponton mennek keresztül, e körkúpot érinteni fogják.

Azon sík tehát, mely az S ponton keresztül menve az Sx és Sy síkokhoz az adott C és B szögek alatt hajlik, az említett két körkúp közös érintője leend. Ezen érintő sík szerkesztésére nézve képzeljünk a két különböző nyílású kúpba két egyenlő gömböt beírva, melyek közül az egyik középpontja lehet a tetszőlegesen felvett s_{11} pont, sugara tehát $s_{11}u$; a másik gömb r középpontját pedig úgy választjuk, hogy a gömb rv sugara az előbbi $s_{11}u$ -val legyen egyenlő, akkor ezen két gömb az érintő sík felkeresésére nézve a két kúpot egyelőre helyettesítheti.

Minthogy pedig a gömbök egyenlők, azért az érintési pontok összeköttetése, úgy szinte az érintő sík fekszeldéje is,

a középpontok összeköttetésével lesz párhuzamos, s minthogy továbbá az érintő síknak a feklapban fekvő közös S csúcson kell keresztül menni, azért csak az S ponton keresztül kell az rs_{11} középponti vonalhoz az SF párhuzamost vonni, leendő ez a keresett érintő sík fekszeldeje.

Ezen érintő sík végleges meghatározására nézve vegyük fel a vetületi tengelyt az egyik kúp Ss_{11} tengelyére merőlegesen, akkor az ehhez tartozó függlapon a lemetezett kör s_{11} középpontból leírva valódi nagyságában lesz látható, s a függszelde e kört q -ban érinteni fogja. — Úgy szinte, ha a másik kúp Ss_1 tengelyére vétetik merőlegesen a vetületi tengely, akkor az s_1 középpontból leírt kört érintő QF' egyenes lesz a függszelde.

Hogy végre a háromél keresett oldalait szerkeszthessük, képzeljük az egész háromélt ismét egy tetszőleges magasságra felemelkedve, úgy hogy például az S pont magassága legyen s_1m , akkor ez által az érintési p és q pontok szinte emelkedni fognak p' és q' pontokig, ha ugyanis $pp' = qq' = s_1m$. Az érintő síkszeldek párhuzamosan fognak elmozdulni, nevezetesen a függszeldek a p' és q' pontokon fognak keresztül menni, az új fekszelde pedig, mely az előbbivel szinte párhuzamos marad, úgy kapjuk meg, ha a függszeldeknek a vetületi tengelyekkel metszéseit összekötjük. — Ezen új fekszelde az Sx és Sy szeldek a D és E pontokban metszván, lesz a háromél fekvetülete EDS , az S pont magassága pedig egyenlő s_1m -el.

Ha tehát a DSx síkot szeldejé körül a feklapba lefordítva képzeljük, akkor a háromél S csúcsa Sx -re merőlegesen S_{11} -be jut, (ha $SS_{11} = ms_1$), melyet a változatlan maradt D ponttal összekötve megadja a keresett b oldalt. — Hasonlóan az Sy síkot fektetve le a feklapba, és a háromél S_1 csúcsát (hol $SS_1 = ms_1$, és $SS_1 \perp Sy$) E -vel összekötván, megnyerjük a c oldalt.

Végre ha az ESD háromszöget fektetjük le ED körül a feklapba, megjegyezvén, hogy az ES valódi hossza $= ES_1$, úgy szinte a DS valódi hossza $= DS_{11}$, akkor az eredt $ES_{11}D = a$ szög lesz a keresett harmadik oldal.

8. §.

Harmadik eset: Adva van a két oldal, (a) és (b) és a közbefoglalt C szög, kerestetik a harmadik (c) oldal, és a két hiányzó szög: A és B .

Feloldás. Szerkeszszük (90-ik ábra) az adott (a) és (b) oldalakat egymásmellé a feklapba, forgassuk azután (b) oldal lapját SC éle körül mindaddig, míg a feklappal az adott C szöget nem képi. E célra veszünk ismét SP' élen egy tetszőleges P' pontot, P' -ből bocsátjuk a $P'p$ merőleget SC -re, C -nél szerkeszszük az adott C szöget, melynek CP''' szárát addig hosszabbítjuk, míg a C központból CP' sugárral leirt $P'P'''$ körív által nem metszetik, végre P''' -ből $P'''p$ merőleget vonván pP' -re, leend (p) a P pont fekvője, pP''' pedig ugyanazon pont magassága; ha már most a talált (p) -ből merőleget bocsátunk SB -re, és addig hosszabbítjuk, míg az S központból SP' sugárral leirt $F'P$ körív által nem metszetik P pontban, és P -t S -el összekötjük, leend BSP a keresett (c) oldal. — A többi részek már most az előbbieket szerint könnyen felrakhatók.

Az eljárás helyessége az első, vagyis fő eset és a jelen eset egyszerű összehasonlításából könnyen kitünendik.

9. §.

Negyedik eset: Adva van két szög: A és B , és a köztük fekvő (c) oldal; kerestetik C szög és (a) és (b) oldalak.

I. *Feloldás.* Pótoljuk az adatokat 180° fokra, leend: $180^\circ - A = a'$, $180^\circ - B = b'$ a kiegészítő háromél két oldala, $180^\circ - c = C'$ pedig a közbefoglalt szög. Szerkeszszük az előbbi §. szerint a hiányzó részeket, és pótoljuk a találtakat ismét 180° fokra, leend $180^\circ - A' = a$, és $180^\circ - B' = b$ a keresett két oldal, és $180^\circ - c' = C$ a harmadik szög.

II. *Feloldás* a kiegészítő háromél nélkülözésével.

Vegyük az adott (c) oldal lapját (94-ik ábra) fekvőjelel lapnak, függőlegesen pedig egy oly síkot, mely az SA élre merőleges, legyen ennek alaplanszete MM . Ezen függőlegesen A szög valódi nagyságában fog vetítettetni és azért A -nál szerkeszthető. — Vegyünk másodszor függőlegesen egy oly síkot, mely a

másik SB élre merőleges és melynek alapmetszete \mathfrak{M}' ; ezen síkban B szög fog valódi nagyságában előfordulni. Ha már most a BP' és AP'' vonalak az SB és SA éleken úgy mozdulnak, hogy a feklaphoz hajlásuk ne változzék, mindaddig, míg az ugyanazon magasságban lévő P' és F'' pontok P pontban nem találkoznak, leend P a közös metszésnek egy pontja; és (p) ennek fekvetülete. Kössük össze p -t S -el, leend Sp az (a) és (b) lapok metszésének fekvetülete, $P'm = P''n$ pedig a P pont magassága, és e szerint a jelen feladat az általános esetre (3-ik §.) van visszahozva.

10. §.

Ötödik eset. Adva van egy oldal (b) , egy megfekvő C , és az ellentett B szög, kerestetik a harmadik szög, és a másik két oldal.

Feloldás. Vegyük (95-ik ábra) a keresett (a) oldal lapját fekvetületi lapnak, és szerkeszszük benne az adott b oldalt. Forgassuk azután ugyanezen oldalt SC éle körül mindaddig, míg a feklappal az adott C szöget nem képi (8-ik §.). Ez által felleljük P pont fekvetületét p -t, és magasságát pP''' -et; tekintsük most ezen P pontot mint egy kúp csúcsát, melynek alkotói a feklappal az adott B szöget képezik, úgy azon sík, mely e kúpot érinti, és egyszersmind S ponton keresztül megy, leend a (c) oldal lapja; minthogy ezen sík az (a) feklappal az adott B szöget fogja képezni. Az említett kúp alapja egy kör, melynek középpontja (p) , sugara pedig azon derékszögű háromszög befogója, melynél az egyik befogó a kúp magassága: pP''' , és az átfogójának (a kúp alkotójának) B hajlása ösmeretese. Ha tehát e kör leiratik, és hozzá S -ből egy érintő húzatik, leend ez az (a) oldalszög szára. A többi részek már most az előbbieket szerint könnyen feltalálhatók.

Jegyzet. Minthogy S pontból a körhöz két érintőt lehet húzni, azért ezen feladatnak két feloldása lehetséges. Ha azonban S pont magába a körbe esnék, vagyis, ha a kör sugara ps -nél nagyobb lenne, a feloldás az adatokból lehetlenné válik.

11. §.

Hatodik eset. Adva van két oldal (a) és (b) és az egyik oldalnak ellentett szög B , kerestetik a harmadik oldal (c), és a másik két szög.

I. *Feloldás.* Pótoljuk az adatokat 180 fokra, lesz $180 - B = b'$ az egészítő háromél egyik oldala, $180 - b = B'$ az ellentett szög, $180 - a = A'$ pedig egy megfekvő szög, melyekből az előbbi §. szerint C' , a' és b' fellelhetők; ezen talált részeket ismét 180 fokra pótolván, leend $180 - C' = c$ a keresett oldal, $180 - a' = A$, és $180 - b' = B$ pedig a keresett szögek.

II. *Feloldás,* a kiegészítő háromél nélkülözésével.

Vegyük (a) oldal lapját fekvetületi lapnak (96-ik ábra), és szerkeszszük benne az (a) és (b) szögeket egymás mellé, függlapul pedig vegyünk egy oly síkot, mely az (a) és (b) oldalak közös szárára, SC -re, merőleges, és melynek alapszöge $P'T$. — Ha már most (c) oldal lapját ST fekszeldeje körül addig forgatjuk, míg a feklappal az adott B szöget nem képi, (b) oldal lapját SC éle körül addig, míg az előbbi lapot nem metszi, az oldalak ez állásokban a kívánt háromélt fogják alkotni. (b) lap forgatása alkalmával SP' él valamely P' pontja egy ($P'p$, $P'P'''$) körívet fog leírni, CP' sugárral, és a hol e körív a már felállítva képzelt (c) lapot átdöfi, ott lesz a metszésnek egyik pontja. E pont meghatározása okáért még csak (c) oldallap függszeldéjének meghatározása leend szükséges, melyre nézve az adatok: a fekszelde, és a fekhajlási szög. Húzzuk tehát Bm' -et merőlegesen ST -re, $m'M'$ -et merőlegesen Bm' -re, szerkeszszük B -nél az adott B szöget, melynek szára $M'm'$ -et, M' -ben metszeni fogja; továbbá Mm' -et merőlegesen $P'T$ -re, és $m'M = m'M'$, végre kössük az így talált M -et T -vel össze, lesz TM a (c) oldallap függszeldéje azon függvetületi lappal, melyben PF'' körív fekszik; és így a keresett átdöfési pont P'' lesz és (p) a fekvetülete; mely vetület által most a jelen feladat ismét vissza van vité az általános esetre (3-ik §.).

Jegyzet. Ezen feladatnak ismét két feloldása lehetséges, mert TV egyenes a körívet két pontban P''' és P'' -ben metszi.

— Ha pedig TV a köríven kül esik, s így a körívet nem metszi, a feloldás az adatokból lehetlenné válik.

12. §.

Feladatok.

Egy adott vonal fekvymán keresztül vezettség a fekvületi síkban egy vonal, mely az adott vonallal egy adott α szöget képezzen.

Feloldás. A 97-ik ábrában legyen AB az adott vonal, A annak fekvyma, és Ab a fekvülete, legyen továbbá AC a keresett egyenes, akkor az AB , Ab , és az AC vonalak egy háromlét képeznek, a melyben adva van a $BAb = h$ oldal, mely az adott vonal fekhajlási szöge, azután adva van a $BAC = \alpha$ oldal, végre ösmeretes a BAb és bAC oldalak által képzett hajlási szög, mely is egyenlő 90 fokkal; ezen adatokból tehát meghatározható a harmadik bAC oldal, melynek AC szára lesz a keresett vonal. — A 98-ik ábrában ($Ab, a'b'$) az adott vonal, mely is a fekvetítő síkjának szeldéje körül a feklapba van AB -be lefordítva, mi által megnyerjük a $LAB = h$ fekhajlási szöget; a mely mellé szerkesztetett az adott $BAC_1 = \alpha$ szög. Minthogy pedig a háromlétben az α oldalnak ellentett szög derékszög, azért az α oldalnak AB él körüli forgása után az AC_1 élnek vetülete Ab -be fog esni; azért egy tetszőleges C_1 pontból merőleges vonatott AB -re, és ez addig hosszítatott, míg az Ab élt c -ben nem éri, c -ben emeltetett merőleges C_1c -re, a mely G -ből GC_1 sugárral C_{11} -ben átmetszetett; leend cC_{11} a C pont magassága c felett. Ha tehát a keresett harmadik oldal Ab körül lefordítatik, akkor csak c -ben kell merőlegest emelni Ab -re, és erre a cC_{11} magasságot átvinni C -ig, a mely pont A -val összekötve megadja a kívánt vonalat.

Minthogy a háromlét elvei szerint AC_1 -nek egyenlőnek kell lenni AC -vel, azért az eljárás egyszerűen ez lesz: Egy tetszőleges C_1 pontból vonatik merőleges AB -re, és meghosszabbítatik c -ig, ebben a pontban emeltetik merőleges, mely A -ból AC_1 sugárral átmetszetik C -ben.

A feladatnak két oldása lehetséges, minthogy az egész feklapi szerkezetet az Ab fekvület körül 180 fokkal képzelhetjük átfordítva.

13. §.

Adva van egy sík, és egy egyenes vonal, mely a síkot átmetszi; huzassék a metsző ponton keresztül a síkon egy vonal, mely az adott vonallal egy adott α szöget képezzen.

Feloldás. A jelen feladat az előbbivel azonos, csak hogy itt általánosabban a feklap helyett egy tetszőleges sík vétetett. A feloldás elve is tehát ugyanaz lesz, mint az előbbi feladatnál, csak hogy a szükséges szerkezet végbevitelére az adott sík a fekszeldeje körül a feklapba fog befordítatni. A 99-ik ábrában FSF' az adott sík, $(ab, a'b')$ az adott egyenes, (a, a') pedig az átdöfési pont. — A vonalnak egy tetszőleges (b, b') pontjából vonatott a síkra egy merőleges $(bc, b'c')$ és meghatározott ennek a síkhoz (c, c') átdöfési pontja; azután a sík az FS szeldejé körül a feklapba fordítottatott le, mely alkalommal az (a, a') pont A -ba, a (c, c') pont C -be jutott, hol AC nem egyéb, mint az $(ab, a'b')$ vonalnak az FSF' síkrai vetülete; miért is C -ben emeltetett AB -re egy merőleges, a melyre a $(bc, b'c')$ merőleges valódi hossza felvitetett B -ig, lett $CAB = H$ szög a vonalnak a síkhoz AB hajlasi szöge. Ezen szög mellé szerkesztetett az adott $BAD_1 = \alpha$ szög, és az előbbi feladat eljárása szerint meghatározottatott a háromél harmadik β oldala, a melynek szárán egy tetszőleges D pont jelöltetett meg, mely a sík visszafordításánál (d, d') -be jut, úgy hogy $(ad, a'd')$ lesznek a keresett vonal vetületei.

A feladatnak szinte van még egy második oldása, melyet úgy nyerünk meg, ha a sík lefordítása után az egész feklapbani szerkezetet az AC vonal körül képzeljük 180 fokkal átfordítva.

14. §.

Adva van két sík, és egy pont; vezettessék a ponton keresztül egy harmadik sík, mely az előbbiekhöz adott α , és β hajlással birjon.

Feloldás. Legyen a 100-ik ábrában FSF' az egyik, $F_1S_1F_1'$ pedig a másik sík, és képzeljük a keresett síkot szinte már meghuzva, mely is az adottakat a CD és CE vonalak szerint metszi át; akkor ezen metszési vonalak, és az adott síkok

CA metszési vonala egy háromélt képeznek, a melyben a CA éleni hajlási szög ösmeretes, mint az adott síkok hajlási szöge, a másik két hajlási szög pedig meg van adva; miért is a 7-ik §. szerint meghatározhatók az ACD és az ACE oldalak. — Képzeljük ezután az FSF' síkot az SF szelvéje körül a feklapba fordítva, vegyünk fel azután a lefordított AC élen egy tetszőleges C pontot, és szerkesszük a talált ACD szöget, a melynek CD szára a forgási szelvé átvágásával meghatározza a keresett sík fekszelvéjének D pontját. Épen így határoztatik meg a keresett szelvének E pontja az $F_1S_1F_1'$ sík lefordítása által; mely két pont által a fekszelvé meg lesz határozva. — A függőszelvé meghatározására nézve pedig szolgál a keresett síkban fekvő C pont. — Az így meghatározott síkhoz végre az adott ponton keresztül egy párhuzamos sík lesz vezetendő.

A 101-ik ábrában FSF' és $F_1S_1F_1'$ az adott síkok. Az előbbi sík az FS éle körül fordítottatott a feklapba, hol azután a közös AB él AB_1 -be jutott; a másik sík az F_1S_1 szelvéje körül fordítottatott le, és az AB él helyzete lett AB_{11} . Most a B_1m , és $B_{11}n$ merőlegesek által meghatározottatott a két sík hajlási szöge mBn . — A 102-ik ábrában MBN az adott síkok hajlási szögének 180 fokrai pótlása, úgy szinte 180 fokra pótolattak az adott hajlási szögek, és azok az MBN szög mellé rajzoltattak, MBP_1 és NBP_{11} -be; a B -től egyenlő távolba vett P_1 és P_{11} pontok forgatása által meghatározottattak a $P_1'qp$, és $P_{11}'rp$ hajlási szögek, a melyek ismét 180 fokra pótolva átvittettek a 101-ik ábrába AB_1D , és $AB_{11}E$ -be, mi által meg lett határozva a keresett sík DE fekszelvéje. — Minthogy pedig a tetszőleges C pont helyett a jelen esetben a (b, b') vétetett fel, mely magában a függővetületi síkban fekszik, azért a függőszelvé csak a B' ponton kellett keresztül vezetni. — A sík irányra nézve ekkép meg lévén határozva, még csak ehhez az adott ponton keresztül kell egy párhuzamos síkot vezetni.

15 §.

Van adva a térben egy szög, és a szárainak fekhajlási szögei, kerestetik az adott szög fekvővetülete. (Egy szöget a látókör síkjára hozni).

Feloldás. Legyen a 103-ik ábrában BAC az adott α szög,

és képzeljük annak A csucsából a feklapra egy merőlegest bocsájtva, míg ezt α -ban nem éri, akkor ered A -nál egy háromél, a melyben $BAC = \alpha$ oldal meg van adva, továbbá a BAa és a CAa oldalak nem egyebek, mint az adott β és γ fekhajlási szögek 90 fokrai pótlása; a mely adatokból tehát az 5-ik §. szerint könnyen meghatározható az α oldalnak ellentett hajlási szög, mely már a kívánt BaC vetületet fogja képezni.

16. §.

Van adva egy vonal, és ezen egy pont; vezettessék ezen ponton keresztül egy vonal, mely az előbbivel egy adott α szöget képezzen, és egy szinte adott fekvetülettel birjon.

Feloldás. Legyen a 103-ik ábrában BA az adott vonal, és A annak egy pontja, aC pedig a keresett vonal fekvetülete. Képzeljük a keresett AC vonalat már meghúzva, akkor ered A -nál egy háromél, a melyben adva van először a $BAC = \alpha$ oldal, másodszor a $BAa = 90 - \beta$ oldal, hol β az adott vonal fekhajlási szöge, és harmadszor a BaC szög; mint a BaA , és CaA oldalak hajlási szöge. Ezen adatokból tehát a 11-ik §. szerint feltalálható a hiányzó harmadik oldal aAC . Képzeljük most már az aAC háromszöget az aC oldala körül a feklapba lefordítva, akkor ezen háromszögben ismeretes az aA befogó, és a már meghatározott aAC szög, miért is a háromszög szerkeszthető, és az átfogó AC lesz a keresett vonal, C pedig annak feknyma.

17. §.

Adva van egy sík, és kivüle egy pont; vezettessék a ponton keresztül egy egyenes vonal, mely adott fekhajlás mellett a síkkal egy adott szöget képezzen.

Feloldás. Legyen a 104-ik ábrában FSF' az adott sík, A a kivüle adott pont, VS_1 a fekvetületi sík; bocsássunk A -ból az adott síkra egy merőlegest AB , és képzeljük szinte a kívánt AE egyenest már meghúzva, akkor ezen egyenes, a síkrai merőleges, és az A pont vetítő Aa vonala egy háromélt képeznek, melyben ismeretes 1-ször az aAB oldal, mely az aBA háromszögnek az aB oldala körüli lefektetése által megnyer-

hető, 2-szor ismeretes az EAB oldal, mely is a keresett vonal és a sík adott β hajlásának 90 fokrai pótléka, végre 3-szor ismeretes az $aAE=90-\alpha$ oldal, hol α a keresett vonalnak adott hajlási szöge. Ezen adatokból tehát az 5-ik §. szerint meghatározható a $90-\beta$ oldalnak ellentett hajlási szög BaE ; a mely is az ismert fekvésű aB mellé szerkesztetik. Ha most az aAE háromszöget a talált aE vonal körül képzeljük a feklapba lefordítva, akkor az A pont A_1 -be jut, hol aA_1 merőleges aE -re, és egyenlő aA -val, A_1 -nél szerkesztetik a $90-\alpha$ szög, melynek A_1E szára által meghatározatik a keresett vonalnak feknyma E .

A 105-ik ábrában FSF' az adott sík, (a, a') kívül egy pont; ebből vonatott az $(aB, a'b')$ merőlegesen a síkra, és meghatároztatott a B feknyma, aB körül azután az aBA háromszög lefordított, mi által az (a, a') pont A -ba jutott; a nyert aAB szög mellé szerkesztettek a $90-\beta$, és a $90-\alpha$ szögek, hol α az adott fekhajlási szög, β pedig azon szög, melyet a keresett vonalnak képezni kell a síkkal, a mely tehát szinte meg van adva. Az 5-ik §. szerint most a lefordított AE_1 és AE_1 élen felvételük egy tetszőleges pont; e helyett itt legcélszerűbben azon E_1 pont vétetik, melyet nyerünk, ha a Ba vonalat addig hosszítjuk, míg az, az aE_1 élt nem metszi. Ekkép tehát meg lesz határozva a $90-\beta$ oldalnak ellentett e_1aE hajlási szög, és ezen szerkesztés mellett egyszersmind E a keresett feknymom. Ugyanis E meghatározására most az EaA háromszöget kell aE körül lefektetni, miért is aA_1 merőleges aE -re, és egyenlő aA -val, A -nál pedig szerkesztendő a $90-\alpha$ szög; de az így nyert aA_1E háromszög azonos az aE_1A háromszöggel, mert mind a kettő derékszögű, azonfelül az aA befogó egyenlő aA_1 -el, és az A -nál szögek $=90-\alpha$ szerkezet szerint, azért tehát az aE_1 -nek is egyenlőnek kell lenni aE -vel. Ha tehát végre a meghatározott (E, e') pont az adott (a, a') -el összekötetik, lesznek $(aE, a'e')$ a keresett vonal vetületei.

18. §.

Adva van egy pont, és két sík; vezettessék a ponton keresztül egy egyenes vonal, mely a síkokkal adott hajlási szögeket képez.

Feloldás. Ezen feladat az előbbi cikkben tárgyalttal azonos, azon különbséggel mindazonáltal, hogy itt a fekvetületi sík helyett általánosabban egy tetszőleges sík van megadva; a feloldás is tehát elvileg az előbbenivel egyenlő leend, csak hogy a szükséges szerkezetek végbevitelére az adott síkok egyike a feklapba lesz befordítandó.

A 106-ik ábrában FSF' és $F_1S_1F_1'$ az adott síkok, (a, a') pedig az adott pont, a melyből vonattak mind a két síkra az $(ab, a'b')$ és $(ac, a'c')$ merőlegesek, meghatároztattak azután ezen két vonal átdőfései az egyik FSF' síkkal, nevezetesen az $(ab, a'b')$ átdőfése (b, b') -ben, az $(ac, a'c')$ átdőfése pedig ugyanazon FSF' síkkal (c, c') -ben van. Most az FSF' sík az FS fekszeldeje körül a feklapba fordítottatott le, mely alkalommal a (b, b') pontja B -be, a (c, c') pontja pedig C -be jutott. Ezután a BCA háromszög fordítottatott le a feklapba a BC oldal körül, megjegyezvén, hogy BA -nak BC -re merőlegesnek kell lenni, és egyenlőnek az $(ab, a'b')$ merőleges valódi hosszával. Ekkép tehát ösmeretes a CAB szög, melyet a két merőleges egymással befoglal; e mellé szerkesztetik tehát az AC szárhoz a $90 - \beta$ szög, hol β azon szög, mely alatt a keresett vonal fogja az $F_1S_1F_1'$ síkot metszeni, az AB szárhoz pedig szerkesztetik a $90 - \alpha$ szög, hol α a keresett vonalnak hajlási szöge az FSF' síkhoz. Ezen három szögből, mint egy háromél oldalaiból szerkesztetik most már, az előbbi cikk észrevétele szerint a $90 - \beta$ oldalnak ellentett e_1BE hajlási szög, hol azután egyszersmind E lesz a keresett vonalnak és az FSF' síknak átdőfési pontja a feklapba befordítva. Ha tehát a sík az FS szeldéje körül ismét az eredeti állásába visszafordítottatik, lesznek (e, e') az E pont vetületei, melyek azután az adott (a, a') ponttal összekötve megadják az $(ae, a'e')$ keresett vonalat.

Ezen feladatnak egy második oldását az által nyerjük meg, ha a talált e_1BE hajlási szöget a BC vonal másik oldalára szerkesztjük.

III. Szakasz.

A síkok által bezárt testekről.

1. §.

A hasáb.

Ha egy egyenes vonal magával párhuzamosan úgy mozog, hogy az egy adott sokszöget folytonosan átmetsz, ered egy test, melynek neve *hasáb*. Az alkotó egyenes vonal azon állásában, hol a sokszög csúcsain megy keresztül, élnek neveztetik; és ezen élek vetületei a hasáb meghatározására elegendők. A 107-ik ábrában ($abcde, a'b'c'd'e'$) az adott sokszög, ($A_1a, a_1'a'$) pedig az adott egyenes, melyhez azután a sokszög csúcsain keresztül párhuzamosak vonattak. — Az adott sokszögre nézve megjegyzendő, hogy ámbár annak egyik vetülete tetszőlegesen felvehető, a másik vetületben mindazonáltal csak három csúcspont vetülete lehet megadva, ha azt akarjuk, hogy a sokszög csúcsai egy síkban fekvő legyenek, minthogy három pont által a sík már meg van határozva; a hiányzó pontok tehát azon feltételből határozandók meg, hogy a csúcsok a már adott három pont síkjába fekvő legyenek. Erre nézve azonban a sík szelvéi meghatározása nem szükséges, ha az adott vetületben az átszegellők meghuzatnak. Így ha a fekvetület $abcde$, a függvetületben pedig az $a'b'e'$ pontok volnának megadva, akkor a hiányzó c' , és d' pontok meghatározására meghuzatik először c ($be, b'e'$) átló, továbbá a fekvetületben az ac , és ad átlók vetületei, és ezek metszése be -vel vetítetik $b'e'$ -re, mi által az $a'c'$, és $a'd'$ vetületek iránya, és a d , és e pontok vetítése által magok a c' , és d' pontok lesznek meghatározva.

Ha valamennyi él fekvő nyomait meghatározzuk, akkor ered az $A_1B_1C_1D_1E_1$ sokszög, mely a hasáb alapjának mon-

datik; és a hasábnak minden metszése oly *mn* síkok által, melyek a feklappal párhuzamosak, ezen sokszöggel lesz azonos. — Minthogy pedig ugyanazon hasáb ered, akár ezen alap, akár az adott sokszög vétetik irányvonalul, azért ha az irány sokszög különösen megadja nincsen, ez mindig magában a feklapban vétetik fel, és így az egyszersmind a hasáb alapját képezi.

Ha a hasáb élei a feklapra merőlegesen állanak, akkor a hasáb egyenesnek mondatik; ez esetben annak fekvetülete maga az adott sokszög, a függvetületben pedig az élek vetületei a *VT*-re merőlegesek. — Különben könnyű belátni, hogy a vetületi síkok czélszerű átváltoztatása által, minden hasáb egyenes hasábbá változtathatik által; a miről azonban alább bővebb alkalmunk leend szólani.

2. §.

Hogy a vetületekből a testek alakját mentől világosabban meg lehessen ösmerni, igen fontos azon vonalakat, melyek a test látható részén fekszenek, megkülönböztetni azoktól, a melyek a test által elfedettek. Miért is ezen utóbbi vonalakat pontozva fogjuk kihúzni. Hogy pedig megtudjuk, mely vonalak láthatók, és melyek fedettek az egyes vetületekben, szolgálанд a következő megjegyzés. Egy test fekvetülete annak *felülnézetét* állítja elő, a mit úgy lehet képzelni, mintha a test a feklap és vizsgáló szeme között feküdne, de úgy, hogy a látsugarak a feklapra merőlegesen álljanak. Innét tehát következik, hogy két egymás felett levő pont, vagy vonal közül az leend látható, a melyik a feklaptól távolabbra esik. De a feklap feletti távolságokat a függvetület adja meg, miért is a fekvetületben azon részek lesznek láthatók, melyek függvetületei a *VT*-től távolabbra esnek. Úgy szinte a test függvetülete annak *oldalnézetét* állítja elő, mintha a test a szem, és a függlap közé úgy volna helyezve, hogy a látsugarak a függlapra merőlegesen legyenek; miért is a függvetületben azon részek lesznek láthatók, melyek a függlaptól távolabbra esnek. Minthogy pedig a függlaptól távolságok a fekvetületből veendők, azért a függvetületben látható részek a fekvetületben szinte a *VT*-től távolabbra esnek. — Ha tehát a

108-ik ábrában $(p_1q, p'q_1')$ és $(p_{11}q, p'q_{11}')$ két adott vonal, akkor annak megbírlására, vajjon a fekvetületben melyik látható a vonalak közül, felvesszük azon q pontot, melyben a két vonal fekvetülete egymást átmetszi, és megkeressük a hozzá tartozó q_1' és q_{11}' függvetületeket. — S minthogy a vonalak felvett állásánál q_{11}' a VT -től távolabbra esik, és az a $(p_{11}q, p'q_{11}')$ vonal pontja, azért ezen vonal fekvetülete lesz a látható. — Hogy továbbá megbírlhassuk, hogy melyik vonal lesz a függvetületben egészen kihuzandó, vegyük fel azon p' pontot, a melyben a függvetületek egymást átmetszik, és keressük meg a hozzátartozó p_1 és p_{11} fekvetületeket. Ezek közül p_1 távolabbra esvén a VT -től, a függvetületben $p'q_1'$ lesz a látható vonal.

Magából érthető azonban, hogy a test véghatárvonalai mindig láthatók, és azért mind a két vetületben a szélvonalak mindenkor kihuzandók.

Különben a látható és fedett vonalak megismerésére ezen most adott módszer csak kétes esetekben fog használatni, minthogy úgy is a kissé gyakorlott szem első tekintetre meg fogja bírálhatni, hogy mely részek vannak a test látható oldalán.

A mi nevezetesen a hasáb éleit illeti, itt e következő egyszerű szabály fog tekintetbe vétetni. A 107-ik ábrában $A_1B_1C_1D_1E_1$ a hasáb alapja; képzeljünk ennek csúcsaiból merőlegeseket vezetve a VT -re, melyek közül a szélsők a C_1 és E_1 -en mennek keresztül. Azon élek tehát, a melyek ezen szélmerőlegesek között a *tengely felé* esnek, (itt csak a D_1 él), a *függvetületben* pontozandók, a többiek mint láthatók, egészen kihúzatnak. A fekvetületben pedig a két szélső *alkotó* között (D_1 és A_1) azon élek, melyek a *hasáb felé* esnek, (itt csak az E_1 él), pontozandók, a többiek, mint láthatók, egészen kihúzatandók.

3. §.

Feladat. Adva van egy hasáb, és egy a felületén fekvő pontnak fekvetülete, kerestetik ennek függvetülete.

Feloldás. A 109-ik ábrában elő van állítva egy hasáb, melynek irányokszőge $(ABC, a'b'c')$ és alkotója $(Cd, c'd')$;

a felületén fekvő pontnak fekvetülete legyen g -ben; akkor ezen ponton keresztül vezettedik egy alkotó fekvetülete gh_1 vagy gh_{11} , megkerestetnek az illető függvetületek $g_1'h_1'$ vagy $g_{11}'h_{11}'$, a melyre azután a g pont egyszerűen vetítetik g_1' vagy g_{11}' -be. — Egy ily fekvetületnek tehát, mint látható két függvetület felel meg, a mint az adott pont a hasáb felső CB , vagy alsó CA oldalfelületén fekszik; ezek közül a függvetületben g_1' látható, a g_{11}' pedig az elfedett $c'b'$ oldalfelületen fekszik.

Fordítva, ha egy a hasábon fekvő pontnak függvetülete volna megadva, akkor szint ezen eljárás szerint a fekvetületben két pontra jutunk, a mint tudniillik a pont a hasáb előli, vagy hátulsó részén fekszik.

4. §.

Feladat. Adva van egy hasáb, és egy egyenes vonal, mely rajta keresztül megy, kerestetnek az átmeneti pontok.

Feloldás. Ha az egyenes vonalon keresztül képzelünk egy tetszőleges síkot vezetve, akkor ez a hasábot metszeni fogja, ha az egyenes a hasábon megy keresztül, az átmeneti pontok tehát a sík és a hasáb metszési vonalában, és egyzersmind az adott egyenesben is fekszenek, azért csak ezen említett vonalak közös pontjait kell meghatározni. — Ha tehát a 110-ik ábrában ($A_1B_1C_1D_1$, $a_1'b_1'c_1'd_1'q'$) az adott hasáb (oP , $o'p'$) az adott egyenes, akkor képzeljük az egyenes vonalon keresztül téve annak fekvetitő síkját; ez a hasábot egy oly sokszögben fogja metszeni, melynek fekvetülete a vonal fekvetületével egybeesik, a függvetület meghatározására tehát csak az éleket metsző a , b , c , és d pontokat kell felvetíteni ($a'b'c'd'$)-be; ezen négyszöget az adott vonal m' és n' -ben metszi által, melyek vetítve megadják az m , és n fekvetületeket is; és így az (m, m') és (n, n') pontok lesznek a keresett átmeneti pontok. — Az (m, m') pont az A_1B_1 felületen fekszik, mely mind a két vetületben látható, azért a vonal (om , $o'm'$) része kihúzandó. A vonal (mn , $m'n'$) része a hasáb belsejében lévén, természetesen nem látható. Az (n, n') pont pedig a C_1D_1 felületen lévén, mely mind a két vetületben el van fedve, a vonal (n , n')-tőli része szinte nem látható, míg az a hasáb szélvonalain túl nem megy.

A fekvetítő sík helyett épen oly egyszerűen lehetett volna a függvetítő síkot is venni, mely esetben a metsző vonal függvetülete esett volna össze a vonal függvetületével, a fekvetületbe tehát azon pontokat kellett volna vetíteni, a melyekben a vonal függvetülete metszi az éleket.

Az adott vonalon keresztül azonban igen czélszerűen vezethető egy oly sík, mely a hasáb alkotó vonalával párhuzamos; minthogy ezen sík a hasábot az éllel párhuzamos vonalak szerint metszi. Ezen sík fekszeldejének meghatározására felvétetik az adott egyenesben egy tetszőleges (o, o') pont, melyen keresztül vonatik egy az alkotóval párhuzamos $(O_1 o, o_1' o')$ vonal; e két vonal O_1 és P fekvőpontjait összekötve, lesz $O_1 P$ a keresett sík fekszeldeje, mely a hasáb alapját az M_1 és N_1 pontokban metszi át. Az ezen pontokon keresztül vezetett $(M_1 m, m_1' m')$ és $(N_1 n, n_1' n')$ alkotók tehát az átmeneti pontokon fognak keresztül menni.

5. §.

Feladat. Adva van egy hasáb, és egy sík, mely a hasábot átmetszi, kerestetik a metszési sokszög.

Feloldás. Keressük meg az adott hasáb minden éleinek átdöfését az adott síkkal, és a nyert pontokat kössük össze ugyanazon rendben, a melyben az élék következnek egymásra. A 111-ik ábrában $(A_1 B_1 C_1 D_1 q, a_1' b_1' c_1' d_1' q')$ az adott hasáb, FSF' a metsző sík; az átdöfési pontok meghatározására az élék függvetítő síkjai használtattak, melyek segítségével lett (a, a') az A_1 él, (b, b') a B_1 él, s. i. t. átdöfési pontja, melyek rendre összekötve megadták az $(abcd, a'b'c'd')$ metszési sokszög vetületeit. — Minthogy az adott sík az ábrában feszített sík, azért a két vetületben a lemetszett hasáb két különböző fele látható. — Hogy még a metszési sokszög valódi nagyságát feltaláljuk, csak az adott síkot kell az FS szeldejé körül a feklapba lefordítani, és a csúcsok helyzetét a lefordítás után meghatározni. Hogy pedig a szerkezet a hasáb rajzán túl essék, czélszerű előbb, mint az ábrában történt, az adott sík szeldejét párhuzamosan elmozdítani, és csak azután a lefordítást szerkeszteni. $F_1 S_1$ a párhuzamosan elmozdított forgási tengely és $ABCD$ a metszési sokszög valódi alakja.

6. §.

Ha egy hasáb oldalfelületeit, úgy szinte annak alapjait is egy síkba képzeljük egymásmellé ugyanazon rendben helyezve, melyben azok a hasábon voltak, megkapjuk a hasáb *kifejtését*, vagy *halóját*.

A kifejtés szerkesztésére nézve szükségünk van minde-
nek előtt a hasáb *derékmetszetére*, vagyis a hasábnak azon
síkkali metszésére, mely az éleire merőlegesen áll. Az ezen
metszés által nyert sokszög ugyanis a hasáb kifejtésénél egye-
nes vonallá válik, és az egyes oldalai az illető élek valódi tá-
volságait adják meg. A 112. ábrában előállított $(A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 q,$
 $a_1' b_1' c_1' d_1' e_1' q')$ hasáb kifejtésére először a függvetületi lap oly
állásba hozott, melynél a hasáb éleivel párhuzamos, az
alapsíkmetszet tehát $V'T$ -ben húzatott az élek fekvetületeivel
párhuzamosan. A hasáb alapjának minden egyes pontja az új
tengelyre vetített, $(a_{11}' b_{11}' c_{11}' d_{11}' e_{11}')$ -be, minthogy az alap
magában a függglapban fekszik; az élek iránya pedig az új
függvetületben az által határozottat meg, hogy az egyik $(A_1 q,$
 $a_1' q')$ élnek (q, q') pontja úgy vetített az új függglapba q'' -be
hogy annak tengely feletti magassága a régi és új függvetü-
letben ugyanaz maradjon. — A függvetület ezen elhelyezése
által azt nyertük, hogy először az élek az új függglapban a va-
lódi nagyságokban fordulnak elő, és hogy másodszor a derék-
metszet megnyerésére szükségelt sík az új függglapra merőle-
gesen álland. — Meghúzatott tehát továbbá a hasáb éleire
merőleges FSE' sík, az által, hogy az $F'S$ függszeldéje merő-
legesnek vétetett az új függvetületére, fekszeldéje pedig
merőlegesen az új tengelyre; azután pedig a derékmetszet
valódi nagyságának megnyerésére esen sík az FS fekszeldéje
körül a feklapba fordítottat le, úgy hogy a keresett derék-
metszet valódi alakjában $ABCDE$ -ben nyertett meg.

A kifejtés megnyerésére tehát vonatik egy egyenes vo-
nal, aa , melyre a derékmetszeti sokszög egyes oldalai rendre
felrakatnak, $ab=AB$, $bc=BC$, s. i. t.; az így nyert a, b, c , stb.
pontokon keresztül aa -ra merőleges vonalakra pedig a függ-
vetületből vett élek valódi hosszai vitetnek fel, úgy hogy, $a'a_{11}'$
 $=aa$, $b'b_{11}'=bb$, stb. Végre az így nyert pontok rendre össze-

köttenek; a nyert ($\mathfrak{A}\mathfrak{B}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}_1$) kerület lesz a hasáb oldalfelületének kifejtése, melyhez azután a két szélén még a fekvetületből vett alap valódi nagysága hozzárajzoltatik. — Könnyű itt észrevenni, hogy a nyert $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}\mathfrak{C}$, $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$, stb. távolaknak, az alap A_1B_1 , B_1C_1 , C_1D_1 stb. oldalaival egyenlőknek kell lenni.

Ha a hasábon egy adott (m, m') pont volna a kifejtésben kijegyzendő, akkor ezen a ponton keresztül vonatik egy alkotó mM_1 , melynek új függvetülete $m_{11}'m''$ -ben lesz képviselve, úgy hogy m'' az (m, m') pontnak új függvetülete. Kijegyeztetik azután a kifejtésben az $\mathfrak{M}\mathfrak{M}$ alkotó (az által, hogy az $\mathfrak{C}\mathfrak{D}$ oldalra E -től felvitetik $\mathfrak{C}\mathfrak{M} = E_1M_1$ távol) és erre átvitetik végre a keresett M pont az által, hogy $\mathfrak{M}\mathfrak{M} = m_{11}'m''$.

7. §.

Ha a kifejtendő hasáb csak kevés oldalfelülettel bír, akkor czélszerűen fog alkalmaztatni a következő módszer. A 113-ik ábrában előállított $(A_1B_1C_1a, a_1'b_1'c_1'a')$ hasábnak $(A_1B_1ab, a_1'b_1'a'b')$ oldallapja az A_1B_1 szeldéje körül a feklapba képzelgetik lefordítva, mely alkalommal a (b, b') pont B' -be fog jutni; (ha bl merőleges az A_1B_1 -re, és lB' egyenlő azon derékszögű háromszög átlójával, melynek egyik befogója bl , a másik befogója pedig a (b, b') pont magassága a fekvetület felett), ha tehát a talált B' pont a mozdulatlanul maradt B_1 -el összekötteszik, lesz B_1B' a $(B_1b, b_1'b')$ élnek valódi hossza; minthogy továbbá a lefektetett lapban fekvő (A) él (B) -vel párhuzamos, és az A_1 pontja, mint a forgási tengely pontja, mozdulatlan marad, azért az A_1 -ből B_1B' -re (vagy annak meghosszabbítására) bocsájtott A_1n merőleges lesz az (A) és (B) élek valódi távola. — Ezután képzeljük a $(B_1C_1bc, b_1'c_1'b'c')$ oldallapot lefektetve a B_1C_1 szeldéje körül, akkor a (b, b') pont B -be fog jutni, (ha b -ből merőleges vonatik B_1C_1 -re, és ez a B_1 középpontból B_1B' sugárral átmetszetik) és a C_1 -ből B_1B -re bocsájtott C_1r merőleges lesz a (B) és (C) élek távola. Végre az A_1C_1 szelde körül lefordítatott az $(A_1C_1ac, a_1'c_1'a'c')$ oldallap, mely alkalommal az (a, a') pont A -ba jutott, és a C_1 -ből A_1A -ra bocsájtott C_1s lesz az (A) és (C) élek távolának valódi hossza.

Meghúzzatik most már egy tetszőleges \mathfrak{A} egyenes vonal, és erre rendre átvitetnek a talált élek távolai, úgy hogy $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = A_1n$; $\mathfrak{B}\mathfrak{C} = C_1r$; és $\mathfrak{C}\mathfrak{A} = C_1s$; azután a nyert pontokon keresztül merőlegesek vonatnak \mathfrak{A} -ra. Az első merőleges egy tetszőleges A_1' pontjából mint középpontból vonatik A_1B_1 sugárral egy körív, míg ez a második $\mathfrak{B}B_1'$ merőlegest B_1' -ben nem metszi; ezen pontból mint középpontból átmetszetik B_1C_1 sugárral a jövő merőleges, C_1' -ben, a melyből végre C_1A_1 sugárral metszetik át az utolsó merőleges. Végre az élek talált valódi hossza valamennyi merőlegesre átvitetik a talált pontokból, mi által lesz $(A_1'B_1'C_1'A_1', ABCA)$ a keresett kifejtés.

Megjegyzendő itt, hogy az A_1' -ből A_1B_1 sugárral vont körív a $B_1'\mathfrak{B}$ merőlegest két pontban metszheti által, úgy szinte a B_1' -ből B_1C_1 sugárral leírt körív a jövő merőlegest szinte két pontban és így tovább. A tévedések mellőzésére tehát észre kell vennünk, hogy az A_1 -ből B_1B' -re vont A_1n merőleges csak ennek meghosszabbítását találja, miért is a kifejtésnél szinte az A_1n -nek csak $\mathfrak{B}B_1'$ él meghosszabbítását kell találni; ellenben a C_1 -ből B_1B -re vont merőleges ezt valóban metszi, miért is a kifejtésben is a C_1 pont úgy lesz megválasztandó, hogy a belőle $B_1'\mathfrak{B}$ -re vont merőleges ezt még a kifejtésben találja s. i. t., végre az $A_1'A_1'$ végpontok összeköttetési vonalának \mathfrak{A} -val párhuzamosnak kell lenni.

Ha a hasábon egy (m, m') pont volna megadva, a melynek helyzete a kifejtésben is felkeresendő, akkor ezen ponton keresztül vezettetik egy alkotó $(M_1m, m_1'm')$, mely szinte a hozzátartozó oldallap szeldéje körül a feklapba fordíttatik le (az által, hogy M_1M párhuzamosan húzzatik A_1A -hoz), és meghatároztatik rajta a lefektetett M pont (az által, hogy mM merőlegesen vonatik a forgási tengelyre), azután a kifejtésben A_1' től C_1' felé felvitetik az A_1M_1 távol, a nyert M_1' ponton keresztül párhuzamos vonatik a hasáb alkotóihoz, a melyre végre M_1' -től felvitetik az M_1M távol.

8. §.

Feladat. Egy adott háromoldalú hasábot úgy metszeni egy sík által, hogy a metszési háromszög egyenoldalú legyen.

Feloldás. Legyen a 113-ik ábrában $(A_1B_1C_1a, a_1'b_1'c_1'a')$

az adott háromoldalú hasáb, akkor ennek mindenekelőtt meghatároztatik az előbbi cikk szerint az $A_1'A_1AA$ kifejtése, azután húzzatik egy tetszőleges $\mathfrak{A}\mathfrak{A}$ vonal merőlegesen az alkotókra, lesz \mathfrak{A} a keresett egyenoldalú háromszögnek az (A) élhez tartozó csúcspontja. Meghatároztatik azután a (B) és (C) éleken a másik két P és Q pont úgy, hogy $\mathfrak{A}P=PQ=Q\mathfrak{A}$ legyen, a mi legegyszerűbben próba által történik épen oly könnyűséggel és pontossággal, mint például egy egyenes vonal három egyenlő részre osztása. — Miután így a kifejtésben a kívánt háromszög meg van határozva, még csak az illető pontok a vetületekre visszavezetendők, a mi az által történik, hogy az $A_1'\mathfrak{A}$, $B_1'P$ és $C_1'Q$ távolok a kifejtésből az illető lefektetett élekre vitetnek által, melyek azután az élek visszafordítása alkalmával a keresett pontok vetületeit fogják meghatározni.

Ezen feladatnál, minden tetszőlegesen felvett (\mathfrak{A}) ponthoz, két feloldás lehetséges, a mint ugyanis az $\mathfrak{A}PQ\mathfrak{A}$ tört vonal az $\mathfrak{A}\mathfrak{A}$ vonal egyik, vagy másik oldalára szerkesztetik.

Megjegyzendő még, hogy ezen feladatnak egy szigorú mértani feloldása is van, a melyre egyszerűen az I. Szakasz 64 és 65-ik cikkeiben tárgyalt feladatok oldása által vezetettünk, ott ugyanis csak az $\alpha\beta\gamma$ háromszöget egyenoldalúnak kell venni.

Említést érdemel még, hogy a háromoldalú hasábból kismetszett egyenoldalú háromszög oldala x e következő képlet által fejezhető ki:

$$x = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2 + 2\sqrt{a^2(a^2 - b^2) + b^2(b^2 - c^2) + c^2(c^2 - a^2)}}{3}}$$

hol a , b , és c a hasáb derékmetszetének oldalait jelentik.

9. §.

Feladat. Kerestetnek azon hasábnak vetületei, melynek alapja, magassága, és két egymásra következő oldalfelületnek az alapphozi hajlási szöge van megadva.

Feloldás. Szerkesszük a 114-ik ábrában a hasáb adott alapját úgy a feklapba, hogy annak egyik oldala AB a vetületi tengelyre merőlegesen álljon; akkor az ezen oldalhoz tar-

tozó oldalfelület síkja merőleges leend a függvetületi lapra, miért is annak adott (k) fekhajlási szöge szinte szerkeszthető leend. Képzeljünk most már a jövő BC oldal egy tetszőleges (E) pontjában egy merőleges síkot vezetve, és azt az EF fekszeldéje körül a feklapba lefordítva, akkor a BC oldalfelület (k') fekhajlási szöge szinte a valódi nagyságában leend látható; ezen szögnek EG szárát tehát addig kell meghosszabbítani, míg a (k') szög GF keble a hasáb adott magasságával nem lesz egyenlő. Ha most az EFG háromszöget az EF oldala körül ismét visszafordítjuk, míg FG a feklapra nem lesz merőleges, akkor a G pont függvetülete g' -be jut, ha $FG = f'g'$. Ha ezen háromszöget végre magával párhuzamosan úgy fogjuk elmozdítani, hogy annak E csúspontja folytonosan a BC oldalon mozogjon, akkor a G csúcspont az AB oldal síkját h' -ben fogja átdöfni, mely pontnak egyszerű vetítése által meghatároztatik annak (h) fekvetülete is. Kössük össze tehát B -t h -val, húzzunk az alap többi csúsaiból Bh -hoz párhuzamosakat, és vigyük azokra fel a Bh vetület nagyságát, lesznek $(ABCD, a'b'c'd'h')$ a hasáb keresett vetületei.

Székelyudvarhely

10. §.

Két hasáb metszése.

Ha két hasábnak alkotói párhuzamosak, akkor két oly hasáb egymást vagy épen nem metszi, vagy ha igen, akkor a metszési vonalak szinte az alkotóval lesznek párhuzamosak. Ezen metszési vonalak feltalálására nézve metszük a két hasábot legegyszerűbben a fekvetületi síkkal, vagy egy oly síkkal, mely ahhoz párhuzamos; azután csak a nyert sokszögek közös pontjain kell keresztül párhuzamosakat vonni az alkotóval.

Ha pedig a két hasáb alkotói nem párhuzamosak, akkor azok szinte vagy elmennek egymás mellett, vagy metszik egymást. A metszés ez esetben kétféle lehet, vagy ugyanis az egyik hasáb a másikon úgy megy keresztül, hogy annak minden éle keresztül hat a másik hasábon, és az ily metszés átdöfésnek, vagy áthatásnak neveztetik; vagy pedig az éleknek csak egy része megy a másik hasábon keresztül, a többi él

pedig már a másik hasábon kívül megy el, a mely esetben csak *bemetszés*, vagy *bevágás* áll elő.

Az áthatásnál két külön vált metszési sokszöget nyerünk, egyet ugyanis a bemenetnél, a másikat a kijövetnél, holott a *bevágásnál* csak egy sokszög jön létre, minthogy a bemeneti és a kijöveti sokszög egygyé olvad. Ha ugyanis egy hasábot (123, 1'2'3') a 115-dik ábrában, mely a másik (*Abcd*, *a'b'c'd'*) hasábot átdöfi, magával párhuzamosan képzeljük mozdulva, a (*b*, *b'*) él felé, akkor az (1, 1') él két átdöfési (*m*, *m'*) és (*n*, *n'*) pontja folyvást közeledni fognak egymáshoz, míg azok a (*b*, *b'*) élen nem egyesülnek, mely esetben az (1, 1') és a (*b*, *b'*) élek magok is metszik egymást; — ha pedig a hasáb még tovább is mozdittatik, akkor az (1, 1') él már szabad lesz, az többé a másik hasábon nem megy keresztül, de a helyett a kijöveti sokszög a bemenetivel egyesülve csak egy zárt sokszöget fog képezni.

11. §.

Két hasáb átdöfésének meghatározására legyen adva a 115-ik ábrában az (*Abcd*, *a'b'c'd'*) és az (123, 1'2'3') hasáb, a melyek metszései a feklappal megadva nincsenek. Ez esetben legcélszerűbben fogjuk minden egyes élnek átmenetét meghatározni a másik hasábon (a 4-ik §. szerint) és a nyert átdöfési pontokat kellően összekötni. Ugyanis vesszük először az (1, 1') élt, fektetünk rajta keresztül egy fekvető síkot, mely is az (*Abcd*, *a'b'c'd'*) hasábot az ($\alpha\beta\gamma\delta$, $\alpha'\beta'\gamma'\delta'$) négyszög szerint fogja metszeni; minthogy pedig az átdöfésnek nem csak ezen négyszögben, hanem egyszersmind az (1, 1') élen is kell feküdnie, azért az átmeneti pontok lesznek (*m*, *m'*) és (*n*, *n'*); melyek közül a bemeneti (*n*, *n'*) pont az (*Ab*, *a'b'*) hasáb oldalon fekszik, (minthogy az 1' a négyszög $\alpha'\beta'$ oldalát metszi) a kijöveti (*m*, *m'*) pont pedig a (*bc*, *b'c'*) hasáb oldalán van, (minthogy 1' a négyszög $\beta'\gamma'$ oldalát metszi).

Hasonló eljárás útján határozatnak meg a (2, 2') és a (3, 3') élek átmeneti pontjai is.

Minthogy az egymásra következő (1, 1') és (3, 3') élek mindegyike a másik hasáb ugyanazon (*Ab*, *a'b'*) oldalán megy be, az (*n*, *n'*) és a (*p*, *p'*) pontokon, azért ezeket egyszerűen

össze lehet kötni a $(pn, p'n')$ vonal által. De a harmadik $(2, 2')$ él a hasáb $(A', a'd')$ oldalán menvén keresztül, a nyert (q, q') pontot se (n, n') -el se (p, p') -el összekötni nem szabad, minthogy mind a két összeköttetési vonal, az $(Ab, a'b')$ és az $(Ad, a'd')$ oldalak közös (A, a') élén megtöretik. — Azért most előbb meg kell határozni, hogy hol megy át az (A, a') él az $(123, 1'2'3')$ hasábon; mely meghatározás ismét úgy vitetik véghez, hogy az (A, a') élen keresztül vezettedik a fekvető sík, mely az $(123, 1'2'3')$ hasábot a $(456, 4'5'6')$ háromszög szerint metszi, melyet (a') az (r') és (s') pontokban találván, lesznek egyszerű vetítés által (r, r') és (s, s') a keresett átmeneti pontok; a melyek közül (r, r') az $(12, 1'2')$ oldalhoz tartozván, az $(nq, n'q')$ összeköttetési vonal törési pontját fogja megadni, úgy szinte az (s, s') , minthogy az a $(23, 2'3')$ -on fekszik, a $(pq, p'q')$ összeköttetési vonal törési pontját állítja elő. Az egész bemeneti sokszög tehát: $(nrqspn, n'r'q's'p'u')$. A kijövetnél a $(2, 2')$ és $(3, 3')$ élek vannak ugyanazon a $(dc, d'c')$ hasáb oldalán, miért is azok egyszerűen összekötöttek; holott a harmadik $(1, 1')$ él a $(bc, b'c')$ oldalon jöven ki, előbb meg kellett a közös (c, c') él átmenetét az $(123, 1'2'3')$ hasábon határozni.

A talált metszési sokszögek kihúzására nézve még megjegyzendő, hogy azok közül csak azon vonalak lesznek telt vonallal kihúzandók, a melyek *mind a két* hasáb látható oldalain fekszenek; így a fekvületben a bemenetnél csak az (np) vonal húzatott ki telt vonallal, a többi vonalak pedig, melyek vagy csak az egyik, vagy mind a két hasáb fedett oldalain fekszenek, csak pontozva jelöltetnek ki. Ezek folytán tehát a függvetületi bemenetnél csak az $(r'q')$ és a $(q's')$ vonalak húzattak ki telt vonallal, a többiek pontoztattak.

12. §.

Ha adva van ismét két hasáb: $(ABCD, a'b'c'd')$ és $(1234, 1'2'3'4')$ a 116-ik ábrában, és megkeressük ez utóbbi hasáb minden egyes éleinek átmenetét a másik hasábon, tapasztalni fogjuk, hogy a $(3, 3')$ él már szabad, az ugyanis az $(ABCD, a'b'c'd')$ hasábon kívül megy el, ezen az élen tehát átdőfési pontok nem is létezhetnek, jelölül annak, hogy ez eset-

ben nem áthatás, hanem csak bemetszés van, s ennek folytán metszési vonalul is csak egy zárt sokszöget fogunk nyerni. Az eljárás azonban itt is csak ugyanaz marad, mint az előbbi cikkekben, csak a nyert átdőfési pontok összeköttetésére nézve kell némi megjegyzést tennünk. Ugyanis az $(1, 1')$ és $(2, 2')$ élek mindegyike a $(BC, b'c')$ oldallapba menvén be, az (m, m') és (l, l') pontok összeköthetők; továbbá a $(4, 4')$ él a $(DC, d'c')$ oldallapba megy be, s minthogy az $(1, 1')$ élre következik, azért az (o, o') pont (m, m') -el volna összekötendő; de az összeköttetési vonal a közbeeső (C, c') élen megtörik (n, n') pontban. Most már a $(4, 4')$ élről a $(3, 3')$ -re kellene átmenni, de ezen él szabad, azon tehát átdőfési pontok nincsenek, miért is a $(4, 4')$ él bemenetét ugyanazon él kimenetével (q, q') -el kell összekötni, minthogy pedig az (o, o') és a (q, q') pontok két különböző síkon fekszenek, azért előbb a közös (D, d') éli megtörést (p, p') -t kellett meghatározni.

A $(4, 4')$ él kimenetétől (q, q') -től kezdve most a metszési vonalon ismét az $(1, 1')$ él felé fordulván vissza, megkeressük ennek (s, s') kimenetét, mely is az $(AB, a'b')$ oldalon lévén, előbb az (A, a') közös éli megtörés (r, r') határoztatik meg. Azután következik a $(2, 2')$ él kimenete (u, u') ; mely pont az előbbi (s, s') -el van összekötve, miután előbb az (A, a') éli (t, t') törés pont meg volt határozva. Végre a $(2, 2')$ élről ismét a $(3, 3')$ -re kellene átmenni, s minthogy ezen átdőfési pont nincsen, azért $(2, 2')$ kimenete, ugyanazon él bemenetével (l, l') -el köttetik össze, csakhogy előbb a közbeeső (D, d') és a (C, c') élek törési pontjai (w, w') és (v, v') határozandók meg.

A fekvetületben kihúzandók az sr, rq , és qp vonalak, úgy szinte a függvetületben az $u'w', w'v', q'p'$, és $p'o'$ vonalak, minthogy ezek mind a két adott hasáb látható oldalain fekszenek; a metszési vonal többi része pontozandó.

13. §.

Ha azonban a két hasábnak a fekvetületi sikkal képzett metszései meg vannak adva, vagy azok könnyen meghatározhatók, akkor az átmetszési vonal meghatározására egy egyszerűbb és pontosabb módszer is létezik. Ha ugyanis a két

hasábot oly síkokkal metszük, melyek mind a két hasáb alkotóival párhuzamosak, akkor az ily síkok mind a két hasábot csak oly egyenes vonalak szerint metszhetik, a melyek magok is az illető alkotókkal párhuzamosak. Ha tehát egy ily sík az egyik hasáb élén vezetetik keresztül, akkor az a másik hasábot két alkotó szerint fogja metszeni, a hol tehát az említett él ezen alkotókat átmetszi, ott lesz ezen élnek bemenete, és kimenete.

Legyen a 117-ik ábrában $(ABCD, a'b'c'd')$ és $(1234, 1'2'3'4')$ a két adott hasáb, melyek metszése kerestetik, akkor mindenk előtt egy tetszőlegesen felvett (o, o') ponton keresztül vezetünk két egyenest, melyek egyike $(op, o'p')$ az $(ABCD, a'b'c'd')$, — másika $(oq, o'q')$ pedig az $(1234, 1'2'3'4')$ hasáb alkotóival párhuzamos, és megkeressük az ezen két egymást metsző egyenesen keresztül fektetett sík (pq) fekszeldejét.

Az így nyert szeldéhez azután a két hasáb alapjainak minden csücspontján keresztül párhuzamosak vonatnak. Mint-hogy az (1) és a (2) pontokon keresztül vont párhuzamosak az $ABCD$ alapot nem metszik, következék, hogy az $(1, 1')$ és a $(2, 2')$ élek a másik hasádba nem hatnak, hanem mellette szabadon mennek el. A jövő párhuzamos a (B) ponton vezet-tetett keresztül, és ez az (1234) alapot az (5) és (6) pontok-ban metszi át; ezen a pontokon keresztül tehát meghúzatnak az $(1234, 1'2'3'4')$ hasáb alkotói, melyeket a (B, b') él a $(7, 7')$ és $(8, 8')$ pontokban metsz át, mely pontok már a keresett metszési vonalhoz tartoznak. Ugyan ezen az úton ha-tároztatik meg minden egyes élnek a másik hasábbai beme-nete és kijöve. Az egyes nyert pontok összeköttetésére néz-ve pedig ugyanazon elvek követendők, a melyek az előbbi §-ben előadattak, ugyanis ha két egymásra következő él ugyanazon az oldallapon hat keresztül, akkor az átdőfési pon-tok egyszerűen egybekötendők; ha pedig ezen átdőfési pon-tok két külön síkra esnek, akkor előbb a közös metszési élen, (vagy éleken) a törési pontok keresendők fel.

Ezen módszer használatánál két adott hasábnál előlege-sen is meg lehet tudni, hogy csak bemetszés vagy pedig át-metszés áll-e elő. Ugyanis a felvett esetben a szélső B ponton

keresztül vont párhuzamos bemegy az (1234) alapba, az (1, 1') és a (2, 2') élek tehát szabadok, a másik szélső párhuzamos, mely mind a két alapot metszi a (4) ponton vezethető keresztül, így tehát az $(ABCD, a'b'c'd')$ hasáb (C, c') és (D, d') élei szinte szabadok, s ennek folytán tehát a jelen esetben csak bemetszésnek van helye.

Ha pedig az egyik alap két szélső pontján keresztül vezetett párhuzamosak mindegyike metszené a másik hasáb alapját, akkor tökéletes áthatásnak volna helye.

A 118-ik ábrában az (1234, 1'2'3'4') hasáb átmetszése nagyobb világosság kedvéért külön rajzoltatott le, miután a másik $(ABCD, a'b'c'd')$ hasáb elmozdított.

Végre megjegyzendő még, hogy ezen módszer még akkor is alkalmazható, ha a hasábok alapjai a rajzlapra fel nem vehetők, ez esetben ugyanis előbb az adott hasábokat egy a fekvetületi lappal párhuzamos sikkal kell metszeni, és azután a nyert metszési vonalakat tekinteni alapul.

14. §. Haáz Rezső Múzeumi Tudományos Könyvtára

Minthogy a 117-ik ábrában ~~(gl) nem~~ egyéb, mint az (AD) és (43) oldallapok átmetszése, ezen oldallapok pedig oly síkok, a melyek fekszeldei épen az (AD) és illetőleg (43) vonalakkal egybeesnek, azért ezen síkok metszési vonalának is a szeldék átmetszési (M) pontján kell keresztül mennie; épen így a (hk) vonal, mint (BC) és (43) oldalak metsző vonala a fekszeldek közös (N) pontján megy keresztül, s. i. t., mely megjegyzésből ismét egy egyszerű előállítási módja következik a metszési vonalnak, azon esetben, ha a hasábok alapjai meg vannak adva.

15. §.

A gúla.

A gúlát az által képzelhetjük előállítva, ha egy egyenes vonal, folytonosan egy adott ponton keresztül menve, úgy mozog, hogy egyszersmind egy szinte adott sokszöget átmessen. Az adott pont leend a gúla csúcsa, vagy orma; a mozgó egyenes minden tetszőleges állásában *alkotó*-nak, azon különös

esetben pedig, hol az az adott sokszög csúcsain megy keresztül, ℓ -nek, maga az adott sokszög pedig irányvonalnak neveztetik.

A 119-ik ábrában (o, o') az adott pont, a melyen az egyes alkotóknak keresztül kell menni, és $(abcde, a'b'e'd'e')$ az irányvonalul szolgáló sokszög. — Ezen sokszögre nézve megjegyzendő, hogy az ugyan lehet egészen tetszőleges is, és ez esetben valamennyi csúcsa tetszőlegesen vétethetik fel, de közönségesen sík sokszög, vagyis olyan, a melynek minden pontja ugyanazon síkban fekszik; és ez esetben csak három csúcspont vétethetik tetszőlegesen fel, és a többi csúcsnak egyik vetülete; — az ezen pontokhoz tartozó második vetület pedig azon feltételből határozandó meg, hogy azok a három tetszőlegesen felvett pont síkjában feküdjének. Az ide tartozó szerkezet legegyszerűbben az átlók meghúzása által eszközölhető.

Ha az egyes éleknek fekvései meghatározatnak, akkor ezek kellő rendben összekötve egy új sokszöget fognak képezni, mely a gúla alapjának neveztetik; és a mely igen czélszerűen vétetik az irányvonal helyett az egyes alkotók meghatározására.

Ha az O csúcsnak (o) fekvetülete az alap sokszögbe esik, mint a 119-ik ábrában, akkor a fekvetületben minden él, úgy szinte minden a gúlán húzott vonal látható leend. Ha pedig a csúcs (o) fekvetülete az alap sokszögén kívül fekszik mint a 120-ik ábrában, akkor azon élek, melyek a két szélső Co , és EO élek között a csúcs felé esnek, el vannak fedve, a többiek láthatók, úgy szinte az alapnak is csak azon része van elfedve, mely az említett szélső Co , és EO élek között a csúcs felé eső oldalon fekszik, mint az ábrában CD , és ED , a többi oldal látható. A függvetületben pedig mindegyik esetben a látható részek meghatározására az alap két szélső vetítő vonala AA' és DD' szolgál irányadóul; ugyanis azon élek, a melyek ezen vonalak között a vetületi tengely felé eső részen fekszenek, a függvetületben el vannak fedve, mint $B'o$, és $C'o$; — azon élek pedig, melyek az említett szélvetítő vonalak között a vetületi tengelytől elfordult részen fekszenek, a függvetületben mint láthatók, telt vonal által jegyeztetnek,

mint $E'o'$ a 119 és 120-ik ábrákban. Ha azonban az élek a függvetületben a csúcson túl hosszítatnak meg, akkor ezen részen éppen azon élek vetületei lesznek láthatók, melyek az alsó részen fedve valának, holott az alant látható élek, fent el lesznek takarva. Magából érthető azonban, hogy a kerethez tartozó vonalak minden vetületben láthatók.

16. §.

Feladat. Adva van egy gúlán fekvő pontnak fekvetülete, kerestetik annak függvetülete.

Legyen a 120-ik ábrában $(ABCDE, A'B'C'D'E')$ az adott gúlának iránysokszöge, (o, o') pedig a csúcsa, (m) a felületén fekvő M pontnak fekvetülete, akkor a függvetület meghatározására vezessünk az M ponton keresztül egy gúla alkotót, a melynek fekvetülete az (m) ponton menvén keresztül, lesz oR ; függvetülete pedig $o'R'$, a melyre azután csak az adott m pontot vetíteni kell, és lesz m' a keresett függvetület. Az $(oR, o'R')$ alkotó helyett lehetett volna az M ponton keresztül egy bármely más tetszőleges PQ egyenest is vezetni, a melynek fekvetülete tehát, egy az adott (m) ponton keresztül menő tetszőleges pq vonal; ezen vonal az A , és B éleket a p , és q pontokban metszi, mely pontok vetítése által meg lesz határozva a PQ vonal függvetülete is $(p'q')$ -ben; a melyre tehát ismét csak az adott m pontot lesz szükség felvetíteni.

Az eljárás az előadottal azonos marad akkor is, ha fordítva a gúlán fekvő M pontnak függvetülete volna megadva, csakhoggy akkor az alkotónak először a függvetülete vonatik meg, és ebből határoztatik meg a hozzá tartozó fekvetület.

17. §.

Feladat. Megkeresendő egy egyenes vonal átmenete egy gúlán. Legyen a 121-ik ábrában $(ABCDEo, A'B'C'D'E'o')$ az adott gúla, (a, a') a rajta keresztül menő egyenes vonal, akkor az átdőfési pontok meghatározására nézve az egyenesen keresztül vezettedik egy tetszőleges sík, mely a gúlát általánosan egy sokszög szerint fogja metszeni, és a keresett átdőfési pontok okvetlen ezen sokszög kerületén fognak feküdni, mint-

hogy pedig azok az adott egyenesnek szinte pontjai, azért csak ezen sokszögnek, és az adott egyenesnek metszési pontjai lesznek meghatározandók.

Minthogy az egyenesen keresztül egy tetszőleges síkot lehet tenni, azért ezen síkot úgy fogjuk választani, hogy a nyert metszés szerkezete a lehető legegyszerűbb legyen; miért is 1-ször az egyenesen keresztül vezethető egy vetítő sík, például a függvetítő sík, minthogy ennek metszése a gúlával a függglapban a vetítő sík szeldéjébe, vagy is az adott egyenes függvetületébe esik, és így a másik hozzátartozó fekvetület egyszerűen az átmetszési pontoknak az illető élekrei vetítése által állítható elő; — ezen eljárás szerint taláztatott az $(abcde)$ sokszög; és ennek (p, p') és (q, q') metszései az adott vonallal a keresett átmeneti pontokat fogják megadni.

Vagy 2-szor az adott egyenesen keresztül egy oly sík vezetettik, mely egyszersmind a gúla csúcsán is keresztül megy; az ily sík ugyanis a gúlát csak alkotók szerint metszhetvén, a metszés előállítása eléggé egyszerű. Az említett sík megnyerésére kössük össze az adott egyenes egy tetszőleges (r, r') pontját a gúla csúcsával, és keressük meg a nyert $(or, o'r')$ segéd vonal (F, f') fekvőjét, melyet az adott egyenes fekvőjével összekötve, megnyerjük FG -ben a keresett sík fekszeldéjét; — ez a gúla alapját H és K pontokban metszi át, miért is $(Ho, h'o')$ és $(Ko, k'o')$ azon alkotók, a melyek szerint a gúla a felvett sík által metszetik; ezen alkotókon fognak tehát a keresett átdőfési pontok feküdni.

18. §.

Feladat. Kerestetik egy gúlának egy tetszőleges sikkali átmetszése. A 122-ik ábrában $(ABCDEo, A'B'C'D'E'o')$ az adott gúla, és FSF' a metsző sík, melynek metszését legegyszerűbben úgy lehet meghatározni, ha megkeressük a gúla minden egyes éleinek átmenetét a síkon, és a nyert pontokat a kellő rendben összekötjük. Így például az $(Ao, A'o')$ él átdőfési pontjának meghatározására, ezen élen keresztül vezetett a fekvetítő síkja (agG') , meghatározatott ennek az adott sikkali metszése $(G'h')$ s végre ezen vonalnak és $A'o'$ élnek metszésében a keresett átdőfési pont (a, a') . Ugyanezen az

uton meg lehet határozni a többi élek átdöfési pontjait is; a melyek összeköttetése azután megadja a metszési sokszög $(abcde, a'a'c'd'e')$ vetületeit.

Ha azonban a vetítő síkok szeldéji az adott sík szeldéjit igen távol metszenék által, vagy ha talán a metszések a rajztérről egészen kiesnének, akkor igen célszerűen alkalmazható e következő módszer. — A függvetületi síkot helyéből elmozdítva, azt oly állásba hoztuk, hogy a vetületi tengely $(V_1 T_1)$ az adott sík szeldéjére merőlegesen álljon, mi által azután a metsző sík maga is merőleges lesz az új függlapra, és így a metszési sokszög ebben egy egyenes vonalban fog látszani, minthogy az egészen a metsző sík függszeldéjébe esik. Ha tehát $V_1 T_1$ merőlegesen meghúzatott SF -re, akkor a gúla alapja erre a tengelyre vetítetik $(A_1'B_1'C_1'D_1'E_1)$; úgy szinte a gúla csúcsa is, csakhogy ezen vetítő vonalra a gúla magassága a régi függlapból vitetik át o_1' -ig; ezen pont összekötve a már vetített alappal, megadja a gúla vetületét az új függvetületi lapra.

Azonfelől szükség még meghatározni az új függszeldét, a mi az által történik, hogy a régi függszelde egy tetszőleges (gG') pontját az új tengelyre merőlegesen vetítjük, és reá a tengelytől kezdve a régi magasságát felvisszük, úgy hogy $(f_1F_1') = (gG')$; az így nyert F_1' pontot, mint az új függszelde egy pontját összekötjük azon F ponttal, melyben a fekszelde az új tengelyt metszi, leend FF_1' az új függszelde, mely is a gúla éleit az $a_1'b_1'c_1'd_1'e_1'$ pontokban metszvé, csak ezen pontok lesznek az illető élekre először a feklapba, azután ismét a régi függlapba vetítendőek.

Hogy a nyert metszési sokszög vetületeiből annak valódi nagyságát is meghatározhassuk, célszerű lesz a metsző síkot, annak SF fekszeldéje körül a feklapba befordítani. Ezen fordítás alkalmával az egyes csúcspontok köríveket fognak leírni, melyek a feklapon a forgási szeldére merőleges vonalakban, az új függlapban pedig valódi nagyságokban fognak vetítenni; ha tehát az F középpontból az Fa_1' , Fb_1' sat. sugarakkal párhuzamos körívek iratnak le, míg ezek az új $V_1 T_1$ tengelyt nem metszik, akkor a nyert pontok vetítése, úgy szinte az (a, b, c, d, e) pontokból az SF -re vont merőlegesek

meghúzója által, meg lesz határozva a metszési sokszög kívánt valódi nagysága $A_{11}B_{11}C_{11}D_{11}E_{11}$.

19. §.

Feladat. Van adva egy gúla, kerestetik a hálójá.

A gúla hálójának meghatározásánál tekintetbe kell venni, hogy a gúla alapja egy tetszőleges sokszög lehet, az oldalfelületét pedig annyi háromszög képezi, a mennyi oldalal bir az alap, azonfelől két egymásmelletti háromszög egy közös oldallal bírván, a háló kifejtésnél is ezen oldalak egyenlők lesznek. Ennélfogva tehát e két eljárás követhető.

1-ször. A 123-ik ábrában a gúla $ABCD$ alapja a feklapban úgy is valódi nagyságában fordul elő, azért ez meghagyatik; az oldalfelületet képző háromszögek pedig az illető alapvonalak körül a feklapba fordítatnak le; ezen alkalommal az (o, o') csúcs egy körívet fog leírni, melynek fekvetülete egy a forgási tengelyre merőleges egyenes vonal. Ha tehát az $(AEo, A'E'o')$ háromszöget akarjuk lefordítani, akkor annak AE oldala marad, az (o) csúcs fekvetületből pedig AE -re vonatik az oO_1 merőleges; az (o, o') pont forgási középpontja (h) , a forgási sugár (hO_1) pedig átlója azon derékszögű háromszögnek, melynek egyik befogója (ho) a fekvetület távolsága a forgási tengelytől, másik befogója (po') pedig az (o, o') pont magassága a feklap felett. — A mellette fekvő $(DEo, D'E'o')$ háromszög lefordítására nézve csak ismét o -ból merőleges vonatik DE -re, a mely is E középpontból EO_1 sugárral metszetik O_{11} , lesz ezen pont a lefektetett háromszög csúcsa, minthogy az $(Eo, E'o')$ él közös, tehát szinte $EO_1 = EO_{11}$.

Czélyszerűbb azonban 2-szor e következő eljárás. Megkerestetik minden egyes élnek valódi hossza, s azután az illető háromszögeket azok három ismert oldalaiból úgy szerkesztjük egymás mellé, hogy valamennyinek csúcsa ugyanazon egy pontba essék. E szerint a 124-ik ábrában a csúcs (o) fekvetületén keresztül vonatott egy párhuzamos a vetületi tengellyel, és az egyes élek az (o) pont körül ezen párhuzamosba fordítottattak be, és végpontjaik vetítése által a függőlegesben meghatározottattak az élek valódi hosszai: $A_1'o', B_1'o',$ sat. Ezután a 125-ik ábrában meghúzatott tetszőlegesen az OA vonal, a

melyre O -tól kezdve felvitetett az $A_1'o'$ valódi hossza A -ig, A -ból az alaptól nyert AB sugárral egy körív iratott le, a mely O -ból az $o'B_1'$ sugárral metszetett B -ben; B -ből ismét az alap BC sugárral iratott le egy körív, mely O -ból $o'C_1'$ sugárral átmetszetett C -ben, és e műtétel addig folytatottatott, míg valamennyi háromszög egymás mellé szerkesztve nem volt; végre az alapot képviselő $ABCDEA$ tört vonal egyik tetszőleges oldala mellé szerkesztetett az alap sokszög.

Ha még azonfelül a gúlán adott pontok vagy vonalak fordulnak elő, melyek a hálón szinte megjegyzendők, akkor ezen pontok csak az illető élek valódi nagyságára viendők által, a tengelyhez húzott párhuzamosok által, és innét a kifejtésre átteendő. Így a 124-ik ábrában az $(abcde, a'b'e'd'e')$ metszés csúspontjai átvitettek a valódi hosszakra $a_1b_1c_1d_1e_1$ -ben, innét pedig a hálóra tétettek által, úgy hogy $aO = a_1o'$; $bO = b_1o'$; stb.

20. §.

Feladat. Meg van adva egy gúlának az alapja, az oldalt képző háromszögek egyike, és egy másodikkal az alaphoz hajlási szöge, kerestetnek a gúlának vetületei.

A 126-ik ábrában $ABCDE$ az adott alap, AO_1E az egyik háromszög, mely az illető AE oldal mellé előlegesen a feklapba van befördítva; azonfelül még legyen megadva a BC oldalhoz tartozó háromszög fekhajlása (α) . — Ha az AEO_1 háromszöget az AE alapja körül addig képzeljük forgatva, míg az O_1 csúcsa a BC háromszög síkját át nem dőfi, akkor ezen át-dőfési pont fogja képezni a keresett gúla csúcsát. De ezen forgatásnál az O_1 csúcs egy oly körívet fog leírni, O_1r sugárral, melynek síkja a forgási AE tengelyre merőleges, melynek fekvetülete tehát az AE -re merőleges O_1rf egyenes leendő; a gúla csúcsának fekvetülete tehát szinte ezen egyenesben fog valahol feküdni. Minthogy pedig ezen körnek a BC oldal síkját kell átmetszeni, azért előbb szerkeszszük ezen síkot, — a melynek fekszeldeje maga a BC oldal, — az adott (α) hajlási szög alatt. Minthogy továbbá a keresett csúcsnak a most szerkesztett síkban, de egyszersmind a feklapra merőleges kör síkjában is kell feküdnie, azért az csak e két sík közös met-

szési vonalában lehet; — ezen metszési vonal vetületei (Mf , $m'F'$). Nincs tehát még egyéb hátra, mint a kör, és az (Mf , $m'F'$) vonalak átmetszésének meghatározása, a mely pont ugyanis a keresett gúla csúcsát fogja képezni.

Minthogy pedig mind a két említett vonal az O_1fF' síkban fekszik, azért czélszerű lesz ezen síkot az O_1f szelvéje körül a feklapba befordítani, akkor a kör valódi nagyságában fog előállni, a mely ugyanis rO_1 sugárral iratik le az (r) középpontból, az (Mf , $m'F'$) egyenes pedig a lefordítás után MP_1' -be fog jutni; és így a két vonal keresett metszése leend O_{11} -ben; mely pont egyszerű visszavetítése által megnyerjük a gúla csúcsának (o, o') vetületeit. Ezen pontot tehát csak az alap minden csúcsával kell még összekötni, hogy magokat a gúla vetületeit megnyerhessük.

21. §.

Feladat. Meg van adva egy gúlának az alapja, magassága, és két egymásra következő oldalháromszög fekhajlási szöge, kerestetnek a gúlának vetületei.

Legyen a 127-ik ábrában $ABCD$ az adott alap, (α) és (β) szögek pedig az AD és DC oldalakhoz tartozó hajlási szögek, (m) a magasság. — Képzeljünk az adott magasságban egy a feklappal párhuzamos síkot fektetve, akkor ez az AD oldal síkját egy alkotó szerint fogja metszeni, melynek fekvetülete az AD szelvével lesz párhuzamos, úgy szinte metszeni fogja a DC oldal síkját ezen sík alkotója szerint, melynek tehát fekvetülete a DC szelvéhez leend párhuzamos. Ezen két alkotó közös metszési pontja lesz a keresett gúlának csúcsa. A szerkesztés a II. Szakasz 9-ik §. (94. ábra) elve szerint vitetett végbe. Ugyanis az AD egy tetszőleges A pontjában vétetett reá merőlegesen egy új függlap, melyben az AD oldalsík hajlási szöge (α) valódi nagyságában látható, ezen szög A_1P_1 oldalán azután megkerestetett azon P_1 pont, melynek magassága a feklap felett $A_1'p_1 = m$. A P_1 ponton keresztül vezetett AD -hez párhuzamos vonal P_1o lesz az egyik alkotó. Ugyanezen az úton találhatik a (β) szög szerkesztése által a másik DC -vel párhuzamos alkotó $P_{11}o$. — Ezen két alkotó fekvetületei egymást az (o) pontban metszven át, lesz ezen pont egyszersmind

a gúla csúcsának fekvetülete; függvetületének meghatározására pedig csak a vetítő vonalra a tengelytől kezdve felvitetik a gúlának adott (m) magassága. Ha még végre a gúla alapjának egyes csúcsai a talált (o, o') csúcscsal összeköttenek, ered a gúlának két vetülete.

22. §.

Két gúla átmetszése.

Két oly gúla, melynek csúcsa közös, egymást vagy épen nem metszi, vagy ha igen, akkor a metszés csak alkotók irányában lehetséges; — és a metsző alkotók feltalálására ez esetben csak a két gúlát egy oly síkkal kell metszeni, mely a feklappal párhuzamos, és a nyert metszések közös pontjait a csúcscsal összekötni.

Ha a csúcs nem közös, akkor egy tökéletes átmenetnél különvált két sokszöget nyerünk, az egyikét a bemenetnél, a másikat a kijövetnél; — ezen két sokszög egygyé olvad, ha az egyik gúla a másikon nem megy úgy keresztül, hogy annak valamennyi éle átdörje a másik gúlát, hanem egy vagy több él szabad marad, mely esetben a nyert metszés bevágásnak mondatik.

23. §.

Két tetszőleges gúla átmetszésének meghatározására a következő módszereket lehet használni:

Legyen a 128-ik ábrában ($ABCDEo, A'B'C'D'E'o'$) az egyik, (12345, 1'2'3'4'5') pedig a másik gúla. Messük e két gúlát oly síkokkal, melyek mind a kettőt csak alkotók szerint metszik, akkor minden ilyen metszéshez tartozó alkotók közös pontjai egyszersmind a keresett metszési sokszöghez is fognak tartozni. — De azon sík, mely a gúlát alkotó szerint metszi, a csúcson megy keresztül, hogy tehát a segéd síkok mind a két gúlát alkotók szerint metszhessek, szükség, hogy azok mind a két gúla csúcsán keresztül menjenek, vagyis a segéd síkok azon egyenes vonalon vezetendők keresztül, mely a gúlák csúcsait összeköti, a segéd síkok fekszeldei tehát a

csúcsokat összekötő ($o5, o'5'$) egyenes G fekadőfési pontján fognak keresztül menni.

Ha az így talált G pontot összekötjük az ($135, 1'3'5$) gúla alapjának legszélsőbb (2) pontjával, akkor ezen szelde a másik gúla alapján kívül marad, jelölül annak, hogy a ($25, 2'5'$) a másik gúlán nem megy keresztül, ezen él tehát szabad. Úgy szinte, ha a másik felén a D pontot kötjük össze G -vel, akkor a nyert szelde szinte nem metszi az (1234) gúla alapot, következésképp a ($Do, D'o'$) él szinte szabad. A jelen esetben tehát nem tökéletes átmenet, hanem csak bevágás áll elő.

A bemetszés meghatározását meg lehet (B) pontnál kezdeni. Ha ugyanis ezen pontot összekötjük (G)-vel, akkor a nyert szelde a számmal jelölt gúla alapját átmetszi az (α) és (β) pontokban; a segéd sík tehát ezen gúlát az ($\alpha5$), és ($\beta5$) alkotók szerint, a másik gúlát pedig a (Bo) él folytán metszi, ezen alkotók közös (α) és (b) pontjai tehát a keresett metszési sokszög csúcspontjai. A legközelebbi segédsík az (1) csúcsra fog keresztül vezetetni, mely a másik gúla alapját (γ) és (δ) pontokban metszi, az ezen segéd síkban fekvő alkotók tehát egyrészt (15), a másik résztől pedig (γo) (δo), ezek közös metszése adja a (c) és (d) csúcspontokat; melyeket (α)-val tüstént össze lehet kötni. — Az ($1G$) szelde ugyan a (23) alapot szinte átmetszi, de a metszés gúla alap csúcsra nem találván, ezen pont tekintetbe nem vétetik, az így nyert pontok ugyanis a metszési sokszög oldalaira, nem pedig csúcspontjaira fognának esni. A következő segéd szelde az (A) ponton fogna keresztül vezetetni, és ez által meg lesznek határozva az (AO) élnek átdőfési pontjai, melynek egyike (b)-vel, a másika (c)-vel fog összekötteni, és ezen műtétel ezen az uton mindaddig folytatatik, míg valamennyi csúcspont meghatározva nincsen, vagyis míg a metszési sokszög tökéletesen bezáródva nincsen.

Ezen sokszög függvetületét a már megtalált fekvetületből egyszerűen az által fogjuk megnyerni, ha az egyes csúcspontokat, melyek mindig egyik, vagy másik gúla élein fekszenek, az illető élekre vetítjük, és a nyert pontokat ugyanazon rendben kötjük össze, mint a fekvetületben.

Vége a kihúzásra nézve csak azon általános szabályt kell szem előtt tartanunk, hogy a nyert sokszög csak azon oldalai lehetnek láthatók az egyes vetületekben, melyek *mind a két* gúla látható oldalháromszögein fekszenek; csak ezen oldalakat kell tehát telt vonal által jelölni, a többiek vagy pontozandók, vagy igen vékony vonalak által jelölendők.

24. §.

Gyakran történik azonban, hogy az adott két gúla magasságai között csak csekély különbség legyen, ez esetben tehát a csúcsok összeköttetési vonala is a feklaphoz csak kevés hajlással bír, és így a fekátdőfési pont igen messzire, vagy talán a rajzlapból egészen ki is esik, hol tehát az előbbi módszerrel használni nem lehet; miért is e következő mód fog czél-szerűen alkalmaztatni.

Legyenek a 129-ik ábrában ($ABCD_o$, $A'B'C'D'o'$) és (1234, 1'2'3'4') az adott gúlák. Meghatározzuk először is az (124) és a (BC_o) háromszögek átmetszését az által, hogy megkeressük az (14) él átmenetét a (BC_o) háromszögön. Ha e végre az (14, 1'4') élen képzelünk keresztül vezetve egy függvetítő síkot, ez a $B'C'o'$ háromszöget az m' és n' pontokban metszi, ezen pontok vetülete által nyeretik az (mn) vonal, és ennek metszése (14)-el ezen élnek (a) átmenetét határozza meg a (BC_o) háromszögön.

Ekkép meg van határozva a metszésnek egyik pontja (a). Egy második pontot kapunk, ha az illető háromszögek (12) és (CB) szeldéjét meghosszabbítjuk, míg egymást (P)-ben nem metszik. Az így nyert (P) pontot összekötjük (a)-val, de az összeköttetési vonal csak azon (ab) részét fogjuk kihúzni, mely mind a két háromszögben közös.

Ha most (a)-tól (b) felé indulunk a metszési vonal felkeresésében, tüstént észrevesszük, hogy a (CB_o) háromszögből kifogytunk, holott még az (125)-ben az (ab) vonalat tovább is lehetett volna húzni, azért meghagyjuk az (124) háromszöget, és a (CB_o) háromszög helyett vesszük a reá következő (BA_o) háromszöget; úgy hogy jelenleg kerestetik az (124) és a (BA_o) háromszögek metszése, és ezen metszésnek egy pontja (b) már ismeretes; miért is csak ismét az illető háromszögek szel-

déjit kell azok (Q) átmetszésökig meghosszabbítani, és a (Qb) vonalnak azon (bc) részét kihúzni, mely a szóban levő háromszögekben közös. — Most az (124) háromszög fogyott el az (14) élnél, miért is helyette a jövő (134) háromszög met-szése kerestetik (BAo)-val, — meghosszabbítva a szeldéket, ezek egymást R -ben metszik, ezen pontot összekötve (c)-vel, az összeköttetési vonalat (AO) élig lehet meghúzni. Ezen eljárás ezen az uton addig folytattatik, míg az egész metszési sokszög, vagy tökéletes áthatásnál, míg a metszési sokszögek, egészen be nem zárodnak.

Ha ezen eljárásnál két oly háromszögre jutunk, például (134) és (ADo), melyek szeldéi egymást felette nagy távolságban metszik át, akkor a hiányzó pont meghatározására a kezdetben említett mód ismétlendő, vagyis a jelen példában felkeresendő a (34) él átmenete az (ADo) háromszögön, az által, hogy az említett élen egy függvetítő sík vezettetik keresztül.

Végre a függvetület, és a látható részek meghatározására az előbbi czikk végén adott eljárás követendő.

Székelyudvarhely

25. §.

Ha egy gúlának egy hasábbali átmetszése kerestetik, akkor legcélszerűbben ismét oly segédsíkok fognak felvételni, melyek mind a két testet alkotók szerint metszik. Az ily síkok általánosan mind a két testet két-két alkotó szerint metszik, a melyek közös pontjai egyszersmind a metszési sokszög pontjai lesznek; minthogy azonban a keresett sokszög oldalai egyenes vonalak, azért a segédsíkok csak az adott két test élein fognak keresztül vezettetni.

Hogy pedig ezen segédsíkok a gúlát csak alkotók szerint messék által, szükség, hogy azok a gúla csúcsán menjenek keresztül, hogy a hasábot szinte alkotók szerint messék, szükséges, hogy egy oly egyenesen menjenek keresztül, mely az alkotókkal párhuzamos; — miért is az adott gúla csúcsán keresztül vezettetik egy az alkotókkal párhuzamos vonal, megkerestetik ennek fek-átdőfési pontja, és a segédsíkok fekszeldéi mind ezen az így meghatározott ponton

vezetendők keresztül. — A többi ide tartozó szerkesztés azonos azon eljárással, mely a 22-ik cikkben (128-ik ábra) adott elő.

26. §.

Ha azonban egyik vagy másik testnek a feklappali metszése igen távolra esnék, mint például a 130-ik ábrában, hol $(ABCD\sigma, A'B'C'D'\sigma')$ az adott gúla, $(12345, 1'2'3'4'5')$ az adott hasáb, akkor megkeresztetik a gúla minden élének átmenete a hasábon, és a nyert pontok a kellő rendben egymással összeköttetnek. Az élek átdőfési pontjainak meghatározására legegyszerűbben az élek vetítő síkjai használatnak. Így az említett ábrában meghatározott először is az $(A\sigma, A'\sigma')$ él átmenete a hasábon az által, hogy ezen az élen képzeltetett keresztül vezetve a függvetítő sík, mely is a hasábot az (I. II. III IV) négyszög szerint metszi át; azon (m) és (n) pontok tehát, hol ezen négyszöget az $(A\sigma)$ él átmetszi, már az átmeneti pontok lesznek; s könnyen látható egyuttal, hogy az (m) pont a (34) oldal síkjában, az (n) pont pedig az (12) oldal síkjában fog feküdni. — Ugy szinte meghatározott a $(4, 4')$ hasáb élnek átmenete a gúlán az által, hogy ismét ezen az élen keresztül vezetett a függvetítő sík, mely is a gúlát az $(abcd)$ négyszög szerint metszette, ezen négyszögnek tehát, és a (4) élnek közös (p) és (q) pontjai szinte a metszési sokszöghöz fognak tartozni, melyek közül a (p) pont (m) -el tüstént összeköthető, minthogy mind a két pont ugyanazon a síkon (a 34 él síkján) fekszik. Ezután a hasáb $(1, 1')$ élének metszete keresztetett fel a gúlával, és miután találtatott, hogy ezen él épen a gúla $(D\sigma, D'\sigma')$ élén megy keresztül, a talált élek metszési pontja összeköttetett (p) -vel, úgy szinte (n) -nel, minthogy az előbbi összeköttesi vonal egészen az (14) él síkján, az utóbbi pedig az (12) él síkján fekszik. Az eljárás azután ezen az úton mind addig folytatatik, míg a metszési sokszög, vagy tökéletes átmenetnél a metszési sokszögek, egészen bezárva nincsenek.

A metszési vonalnak ismét csak azon részei lesznek telt vonal által kihúzandók, melyek mind a két test látható oldallapjain fekszenek.

27. §.

A rendes testek.

Rendes testeknek neveztetnek azok, melyek felülete csupa egynemű rendes sokszögekből áll. Ezen sokszögek csücsai egyesülvén az eredő test csücsait fogják képezni; úgy szinte két sokszög közös oldala leendő az eredő test éle.

Minthogy pedig egy tömörszög képzésére legalább három síknak kell egy pontban egyesülni, a legkevesebb oldalú sokszög pedig az egyenoldalú háromszög, azért az első rendes test ered, ha egy tömörszög képzésre három egyenoldalú háromszög csücsa egyesül. Ezen test áll négy egyenoldalú háromszögből, van négy csücsa, és hat éle. A test neve *rendes négylap*.

Egy tömörszög képzésére egyesülhet azonban négy egyenoldalú háromszög csücsa is. Ez esetben az eredő test nyolcz háromszögből áll, van 6 csücsa és 12 éle. Ezen test *ren les nyolczlapnak* neveztetik.

Ha a tömörszög képzésére 5 egyenoldalú háromszög egyesül, akkor az eredő test képzésére 20 háromszögre van szükség, melyek 12 csücsöt, és 30 élet alkotnak. E testet *rendes húszlapnak* nevezzük.

Ha még tovább akarnók szaporítani az egyenoldalú háromszögek számát, akkor most a tömörszög képzésére már 6 háromszög csücsának kellene egyesülni. De az egyenoldalú háromszög mindegyik szöge 60 fokot képez, ez tehát 6-szorozva adna 360 fokot; és így az egymásmellé illesztett 6 háromszög csücsai már többé nem képeznének tömörszöget, minthogy azok mind egy síkba fognának esni. Annyival kevésbbé lehetséges a test képzése, ha a háromszögek száma még nagyítatik. — Rendes háromszögekből tehát csak az említett három test lehetséges.

Ha továbbá egy rendes test csupa rendes négyszögekből alakul, és egy tömörszög képzésére 3 négyszögcsücs egyesül, akkor a nyert test *rendes hatlap*-nak, vagy *köb*-nek neveztetik, áll 6 rendes négyszögből, van 8 csücsa, és 12 éle. — Ha négy négyszögcsücsöt kellene ismét egy tömörszög alakítására összeállítani, akkor a szögek összege ismét $4 \cdot 90 = 360$

fok lévén, tömörszög nem áll elő, és a test képzése lehetetlen.

Végre, ha rendes ötszögekből kívánunk testet képezni, és egy tömörszög képzésére három rendes ötszög csúcsát egyesítjük, akkor az eredő test, mely ez esetben rendes *tizenkétlap* nevet visel, áll 12 rendes ötszögből, bir 20 csúcscsal, és 30 éllel. — Egy rendes ötszög csúcsa 108 fokkal birván, a tömörszög képzésére háromnál több nem alkalmazható. — Úgy szinte csupa rendes hatszögekből testet alakítani is lehetetlen, minthogy a hatszögben mindegyik szög már 120 fokot tészon, és így három közülök $3 \cdot 120 = 360^\circ$; a szögek tehát mind egy síkba fognának esni. Ha pedig még több oldalú rendes sokszögek vétetnek, akkor a három egy csúcsba egyesülő szögek összege 360 foknál még több lévén, tömörszöget annyival kevésbé képezhetnek.

Összesen tehát csak öt rendes test létezhet.

28. §.

Meg lehet itt még jegyezni, hogy a rendes testek képzésére szükségelt sokszögek minőségéből, és számából könnyen fel lehet találni az élek és a csúcsok számát is. Tegyük fel ugyanis, hogy a test képeztetik csupa n szögekből, és van szükség azokból m -re, azonfelül egy csúcs képzésére p szög egyesül, akkor rendelkezésünkre áll összesen m -szer n szög, tehát $m \cdot n$ szög, ezekből egy csúcs képzésére megkívántatik p szög, tehát a csúcsok száma leend:

$$Cs = \frac{m \cdot n}{p}$$

továbbá minden n szögnek n oldala is van, tehát összesen lesz m -szer n , vagy is $m \cdot n$ oldalunk, melyekből egy él képzésére mindig 2 egyesül, az élek száma e szerint:

$$Él = \frac{m \cdot n}{2}$$

Így a rendes négylapnál $C = \frac{3 \cdot 4}{3} = 4$; és $E = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6$

„ nyolczlapnál $C = \frac{3 \cdot 8}{4} = 6$ és $E = \frac{3 \cdot 8}{2} = 12$

„ húszlapnál $C = \frac{3 \cdot 20}{5} = 12$ és $E = \frac{3 \cdot 20}{2} = 30$

a rendes hatlapnál $C = \frac{4.6}{3} = 8$ és $\dot{E} = \frac{4.6}{2} = 12$

„ tizenkétlap. $C = \frac{5.12}{3} = 20$ és $\dot{E} = \frac{5.12}{2} = 30$.

29. §.

A rendes négylap.

A rendes négylap vetületeinek előállítására nézve legcélszerűbbnek látszik, a testet egyik lapjára fektetni; ez esetben ugyanis az nem egyéb, mint egy három oldalú gúla, melynek alapja az oldal háromszögekkel egyenlő. Ha tehát ezen gúla alapját valódi nagyságában a feklapra rajzoljuk, ABC a 131-ik ábrában, akkor az AB , BC , és CA oldalakhoz tartozó háromszögek, szinte a feklapba befordítva, a már felrajzolt ABC háromszögre fognak esni, és azt tökéletesen fedik. Ha tehát az AC oldalhoz tartozó háromszöget vesszük tekintetbe, és ezt a feklapból a kellő állásába visszafordítjuk, akkor a B -ben létező négylap csúcsa egy az AC -re, merőleges körívet fog leírni, melynek fekvetülete Br , és a csúcs vetületének ezen vonalon kell feküdni; épen így, ha a BC oldalhoz tartozó háromszöget fordítjuk a BC tengely körül, akkor a négylap csúcsa, mely ez esetben A -ban volt, szinte egy körívet fog leírni, melynek fekvetülete As . A négylap csúcsának fekvetülete e szerint tehát csak a Br , és az As vonalak közös (d) átmetszésében lehet; és ha még a talált (d) pontot, mely nem egyéb, mint az alap háromszög középpontja, a három csúcscsal összekötjük, meglesz a rendes négylap fekvetülete; függvetületének meghatározására pedig csak a (d, d') csúcs magasságát kell felkeresnünk, minthogy az ABC alap a fekvetületi síkon lévén, annak függvetülete a tengelybe esik. A (d') magasságának meghatározására pedig csak az (r) középpontból, (rB) sugárnál leírt kört kell a feklapba lefektetni az (rB) átmérője körül, akkor a d -ből rB -re emelt dD a gúla keresett magasságát fogja megadni, mely tehát a csúcs vetítő vonalára a tengelytől kezdve egyszerűen felvihető.

Meg lehet itt még jegyezni, hogy a Brd szög azon szög, mely alatt az ACD síkja hajlik az alaphoz; minthogy pedig a

háromszög tan elvei szerint $ro = \frac{1}{3} rB$, továbbá minthogy $rB = rD$, azért

$$\cos BrD = \frac{rd}{rD} = \frac{\frac{1}{3} rD}{rD} = \frac{1}{3}$$

de a rendes négylapnál bármely két háromszög egymáshozói hajlása egyenlő, azért egyszerűen mondhatjuk, hogy a rendes négylapnál a hajlási szögek pótkeble egyenlő egy harmaddal.

Maga a kiszámított hajlási szög $= 70^{\circ} 31' 43.6''$.

30. §.

A rendes négylap minden egyes éle a többi éleket 60 fok alatt metszi át, egyet kivéve, melyet épen nem metsz, és a melyhezi hajlási szöge 90° -nyi. Ha két ily ellentett élek középpontjait egyenesek által összekötve képzeljük, nyerünk három egymásra merőleges tengelyt. Ha tehát a rendes négylapot oly állásba hozzuk, hogy ezen tengelyek egyike a feklapra, másika pedig a függlapra legyen merőleges, (mely esetben a harmadik tengely a vetületi tengelylyel leendő párhuzamos) akkor annak mind a két vetülete (a 132-ik ábrában) rendes négyszögek által lesz előállítva, melyek négy oldala és két átlója képviselik a test 6 élét. A feklapra merőleges tengely (1, 1'1'); a függlapra merőleges tengely (22, 2'); végre a vetületi tengelylyel párhuzamos harmadik tengely (34, 3'4') által van megadva.

A rendes négylap legegyszerűbb vetületére azonban úgy jutunk, ha annak egyik élet a feklapra merőlegesen, az ellentett élet pedig a függlapra vesszük merőlegesen. Az ide tartozó vetületek a 133-ik ábrában vannak előállítva; a feklapban cd , a függlapban pedig $a'b'$ oldalak vannak valódi nagyságokban, és az ezen oldalaknak ellentett ($c ab d$) $=$ ($b' c' d' a'$) szögek a hajlási szög valódi nagyságát adják meg; végre az ezen szögeket befogó oldalak azon egyenoldalú háromszög *magasságával* egyenlők, melynek oldalait a rendes négylap élei képzik.

A 131-ik, 132-ik, és 133-ik ábrában előállított négylapokhoz tartozó háló, vagy kifejtés a 134-ik, vagy a 135-ik ábrában van rajzolva helygazdálkodás tekintetéből félnagy-
ságban.



31. §.

Ha egy adott rendes négylapon, egy másik vele tökéletesen egyenlő négylapot úgy képzelünk keresztül vezetve, hogy a két négylap élei egymást merőlegesen felezzék, akkor egy igen sajátságos csillagforma ikertest áll elő, melynek legegyszerűbb vetületei a 136-ik ábrában vannak előállítva; ($abcd, a'b'c'd'$) az egyik négylap, ($ghef, g'h'e'f'$) pedig a másik vele ellentett. Az 12, 23, 34, 41, 15, 25, 16, stb. vonalak a két test átmetszési vonalait állítják elő; ezen élek a test homorú hajlási szögeihez tartoznak, szám szerint van tizenkettő, melyek közül négy négy egymásra következő egy rendes négyszöget, és együttvéve valamennyi egy rendes nyolczlapot képez, s ennek folytán a testet úgy is képzelhetjük előállítva, ha egy rendes nyolczlap minden lapjára egy oly rendes négylap ragasztatik, melynek bezáró háromszögei a nyolczlapéival azonosak.

Könnyebb szem elé idézés miatt ezen test, egy később előadandó módszer szerint a 139-ik ábrában kettőzött léptek alkalmazása mellett a háromméretű Mohsféle vetületbe helyeztetett.

140-ik ábrában van kifejtve az egész test hálójá félnagyságban, azon megjegyzéssel mindazonáltal, hogy a vastagabban kihúzott és számokkal ellátott vonalak képezik a két négylap átmetszési vonalait, és így az egész testnek, (azt egynek tekintve) a beeső éleit; ha tehát ezen testet valóban el akarjuk papírpépből, vagy lemezekből készíteni, akkor a ki-metszett hálónak ezen számokkal jegyzett élei ellenkező oldalra hajtandók össze, mint a vékonyabb vonalak, ez által azután az ugyanazon számmal jegyzett élek, mint (1, 1), (2, 2) sat. egymásra illeszthetők, és összeragaszthatók.

A 137-ik ábrában a vetületek azon esetre állítottak elő, ha a négylap egyik lapja ($a b c$) mint a 131 ik ábrában a feklappal párhuzamos; a 138-ik ábrában pedig azon eset van tekintetbe véve, ha a négylap két tengelye (mint a 132-ik ábrában) a fek és illetőleg a függlapra merőleges, a harmadik tengely pedig az alapmetszettel párhuzamos.

32. §.

A rendes nyolczlap.

Ha a 131-ik ábrában előállított rendes négylap egyik például ($Ad, A'd'$) oldalát elfelezzük, és a felező ponton keresztül egy sítot vezetünk az ABC alaphoz párhuzamosan, akkor ezen sít a négylapból egy részt lemetesz, mely szinte rendes négylap, és a melynek élei az eredeti négylap éleinek felével egyenlők; az eredeti négylap (o, o') csúcsa elesik, és helyette lesz egy rendes háromszög. Ha pedig ezen műtétel a négylap mind a négy csúcsánál ismételtetik, s így tehát az eredeti négylapból négy kisebb négylap lemetsetett, akkor a még megmaradt rész lesz a rendes nyolczlap.

A rendes nyolczlap áll nyolcz egyenoldalú háromszögből, és mindegyik tömörszögnek képzésére négy háromszög csúcsa egyesül; ha tehát a nyolczlapot, mint a 141-ik ábrában az egyik csúcsára állítjuk, akkor a legsó (a, a') pontból négy él fog felfelé menni, melyek végpontjai, minthogy az élek egyenlők, és egyenlő fekhajlással birnak, egy a feklappal párhuzamos síkban fognak feküdni, és minthogy az élek által befogott szögek szinte egyenlők, azért ezen végpontok egy rendes négyszöget fognak képezni ($b c d e$). Ezen négyszög, melynek minden oldala szinte a rendes nyolczlap élet képezi, az egész testet két egyenlő részre osztja, miért is a nyolczlap nem egyéb, mint két alapjaival összeillesztett négyoldalú gúla.

Négy ilyen rendes négyszöget lehet a nyolczlapon körülvezetni, a melyek síkjai egymásra merőlegesen állanak; s melynek mindegyike a másik kettő két ellentett csúcsán megy keresztül; ezen négyszögek átlói képezik a test három egymásra merőleges tengelyét, és ha a test csúcsán áll, annak magasságát; miért is a függvetület meghatározására csak is ezen átlót kell a csúcs vetítő vonalára felvinni; magából értetődven, hogy a $b c d e$ négyszög függvetülete szinte ezen átló félmagasságába esik.

33. §.

A $(bcde)$ négyszög állása a függglaphoz az adott vetítés-nél egészen tetszőleges volt; ha azonban ezen négyszög úgy állitatik, hogy annak egyik oldala a függglaphoz is párhuzamos legyen, mint a 142-ik ábrában, akkor a függvetület igen megegyeszerül, minthogy a (bae) , (bfe) , (cad) , (cfd) háromszögek síkjai a függglapra merőlegesek lévén, ezen háromszögek vetületei egyenes vonalak; azonfelül az ead , és efd háromszögek, a hátul levő (bac) , és (bfc) háromszögeket épen fedik. A függglapban tehát egy ferdény áll elő, melynek kisebb átmérője a nyolczlap élével, nagyobb átmérője a nyolczlap átlójával, oldalai pedig azon egyenoldalú háromszög magasságaival egyenlők, a melynek oldalait a nyolczlap élei képezik.

Ezen vetületből azonban nemcsak a nyolczlap említett méreteit lehet valódi nagyságokban szemlélni, hanem egyuttal azon szöget is, a mely alatt két háromszög síkja egymáshoz hajlik, vagy is a nyolczlap hajlási szögét is, úgy szintén annak számokba kifejtett értékét meghatározni.

Ezen hajlási szög valódi nagysága ugyanis a függglapban az $(f' b' e' a')$ szög által képviseltetik, mely t. i. a függglapra merőlegesen álló (bfe) , és (bae) háromszögek hajlásához tartozik. Ezen hajlási szöget a $(b' e' c' d')$ egyenes két egyenlő részre osztja, miért is:

$$\cos(f' b' e' m) = \frac{b' e' m}{f' b' e'}$$

de ha egy egyenoldalú háromszög oldalát (s) -el jelöljük, akkor annak magassága $\frac{s}{2} \sqrt{3}$, az előbbi képletben tehát: $b' e' m = \frac{s}{2}$, és $f' b' e' = \frac{s}{2} \sqrt{3}$, és ha még az $(f' b' e' m)$ szög (α) -val jelöltetik, ered:

$$\cos \alpha = \frac{\frac{s}{2}}{\frac{s}{2} \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

minthogy pedig $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$, lesz az érték helyettesítése által:

$$\cos 2\alpha = 2 \cdot \frac{1}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$$

vagy is a rendes nyolczlap hajlási szögének pótkéble nemleg egy harmaddal egyenlő.

A rendes négylap hajlási szöge pótkéblére nézve találtott igenleg egy harmad; miből tehát következik, hogy ezen két test hajlási szögei együttvéve épen 180 fokot képeznek. A rendes nyolczlap hajlási szöge e szerint fokokban kifejezve lesz $2\alpha = 109^{\circ} 28' 16\frac{1}{4}''$.

A mi pedig az éleket illeti, ezek közül bármelyik, például a (bf) él közvetlen átmetszi az (fc) , (fe) , (bc) , és (be) éleket, és ezekkel 60 fokot képez, szinte átmetszi az (fd) , és a (ba) éleket, és ezekkel 90° képez; — továbbá az (ea) , (ca) , (ed) , és (cd) éleket nem metszi ugyan, de ezekhez hajlása szinte 60° ; végre az ellentett ad éllel párhuzamos, ehhez hajlása tehát egyenlő a semmivel.

34. §.

Ha a $(bcde)$ négyszögnek oly állást adunk, hogy annak egyik átlója a függlapra merőleges legyen, mint a 143-ik ábrában, akkor mind a két vetület azonossá idomul. — Úgy szinte azonos vetületeket nyerünk akkor is, ha mint a 144-ik ábrában a nyolczlapot úgy állítjuk az egyik (be) élére, hogy ez a függlapra, a megfekvő négyszög oldala (ed) pedig a feklapra legyen merőleges; ezen esetben mind a két vetület azon ferdénnyel azonos, mely a 142-ik ábra függvetületét képi.

Vége a 145-ik ábrában a nyolczlap egyik (cdf) lapjára van fektetve. Ez esetben az ellentett (bae) háromszög az előbbivel csúcseellenes lévén a fekvetület egy rendes hatszöget képez; a függvetületben pedig a felső (bae) lap magasságának meghatározására képzeljük a (cda) háromszöget a (cdf) alapra a közös (cd) él körül ráfektetve, és ismét előbbi helyébe visszafordítva, akkor a (cda) háromszög (a) csúcsa, mely a lefordításnál (f) -re esett, a visszafordításnál egy körívet fog leírni (rf) sugárral mindaddig, míg az (a) pontból az (af) -re emelt merőleges által (A) -ban nem metszetik, és leend (aA) az (a) pont keresett magassága.

A 141-ik egész 145-ik ábrákban előállított nyolczlap mind egyenlő nagyságúaknak vétettek, és a hozzátartozó háló a 146-ik és 147-ik ábrában fejtetett ki fél valódi nagyságban.

35. §.

A rendes húszlap.

A rendes húszlap húsz egyenoldalú háromszög által akként van bezárva, hogy minden tömörszög képzésére 5 háromszög csúcs egyesüljön. Ennél fogva ezen test legegyszerűbben úgy fog előállíthatni, ha azt mint a 148-ik ábrában úgy állítjuk egyik csúcsára, hogy az azon keresztül menő átló a feklapra merőlegesen álljon. Ez esetben az alsó (1, 1') csúcsból öt él vezet felfelé, melyek végpontjai mind egy a feklappal párhuzamos síkban fekszenek, minthogy az élek egyenlők, és egyenlő fekhajlással bírnak; minthogy továbbá a köztök befoglalt szögek is egyenlők, azért ezen végpontok egy rendes ötszöget képeznek, melynek fekvetülete a valódi nagyságban (2, 3, 4, 5, 6). De a felső csúcsból lefelé épen úgy fog öt él vezetni, ezek végpontjai szinte egy rendes ötszöget fognak képezni, mely azonban az előbb talált ötszöggel csúcsellenes; — ennek fekvetülete tehát, ismét valódi nagyságában (7, 8, 9, 10, 11); és most már csak a felső ötszög minden oldalát kell az ellentett alsó ötszög csúcsával egybekötni, mi által már szinte az alsó ötszög oldalai is össze lesznek kötve a felső ötszög ellentett csúcsaival, és az összeköttetési vonalak a feklapban a (2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 7) rendes tizszöget képezik.

A függvetület meghatározására képzeljük a (10, 11, 12) háromszöget a fekmentes (10, 11) éle körül addig forgatva, míg a feklappal nem lesz párhuzamos; — ezen állásában a fekvetülete lesz (10, a , 11). Ha most ezen háromszöget ismét visszafordítjuk előbbi állásába, akkor az (a) csúcs egy körívet fog leírni (ra) sugárral, míg ez a (12) csúcsban (ar)-re emelt merőleges által nem metszetik (a_1)-ben, és (12 a_1) lesz a csúcsnak magassága a felső (7, 8, 9, 10, 11) ötszög felett. Ugyanezen távolban van az alsó (1) csúcs az alsó (2, 3, 4, 5, 6) ötszög alatt. A két ötszög távolának meghatározására pedig ugyanezen elv szerint a (10, 11, 5) háromszög fordítatik ismét a fekmentes (10, 11) oldal körül, míg az a (10, a , 11) állással esik egybe; akkor a visszafordítás alkalmával az (a) csúcs

egy körívet ír le (ra) sugárral, míg ez az (5) -be $(a5)$ -re emelt merőleges által nem metszetik (a_{11}) -ben, leendő $(5a_{11})$ a két ötszög keresett távolsága. E szerint tehát az egyes pontok magasságai meg lévén határozva, könnyű leendő már a fekvetület segítségével a függvetületet is előállítani, kellő tekintettel lévén egyszersmind a látható és a fedett részekre is.

36. §.

Az előadott szerkesztés folytán meg lehet határozni azonszöget is, mely alatt a rendes húszlap két háromszöge egymáshoz hajlik. Ugyanis a 148-ik ábrában a $(10a_{11})$ háromszög fekkentes állásából addig forgattatott a $(10, 11)$ él körül, míg az (a) csúcs (a_1) -be nem jutott; miért is az (a_1ra) szög, melyet rövidség okáért (a) -nak nevezünk, nem egyéb, mint a $(10\ 11\ 12)$ háromszögnek hajlása a feklaphoz. Hasonlóan ugyanazon $(10\ a\ 11)$ háromszög a $(10, 11)$ éle körül lefelé is fordítatott, míg az (a) csúcsa (a_{11}) -be nem érkezett, ez esetben tehát az $(ar\ a_{11})$ vagy is a (β) szög lesz a $(10\ 5\ 11)$ háromszögnek hajlási szöge a feklaphoz; és minthogy az (a) csúcs a $(10, 11)$ él körül előbb felfelé, most pedig lefelé fordítatott, azért a nyert két szög összege, $(\alpha + \beta)$ lesz a $(10, 11, 12)$ és a $(10, 11, 5)$ háromszögek hajlási szöge.

Hogy pedig ezen hajlási szög legegyszerűbb szerkesztésére a kellő útmutatást megnyerjük, czélszerű lesz azt a háromszögtani függvényei által kifejezni. E végre pedig, ha a húszlap $(10, 11)$ élet az egységnek vesszük, akkor (ra) mint az egyenoldalú háromszög magassága $= \frac{1}{2}\sqrt{3}$; az $(r, 12)$ pedig egy rendes ötszög középpontjának távolsága annak oldalától, minthogy pedig a rendes ötszög mindegyik szöge 108 foknyi, azért a $(12, 10, r)$ szög $= 54^\circ$ és így

$$12, r = \frac{1}{2} \tan 54^\circ = \frac{1}{2} \cot 36^\circ$$

$$\text{de } \cos \alpha = \frac{12, r}{ra_1} = \frac{12, r}{ra} = \frac{\frac{1}{2} \cot 36^\circ}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{\cot 36^\circ}{\sqrt{3}}$$

Minthogy továbbá az $(5, 10, 11)$ szög fele a $(10, 12, 5)$ szögnek, ez pedig 36 foknyi, azért amannak 18 foknyinak kell lenni; és így $(r5) = \frac{1}{2} \tan 18^\circ$ és ennélfogva

$$\cos \beta = -\frac{r, 5}{ra_{11}} = -\frac{r, 5}{ra} = -\frac{\frac{1}{2} \tan 18^\circ}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -\frac{\tan 18^\circ}{\sqrt{3}}$$

de az elemi mennyiségtanból ismeretes, hogy

$\sin 18^\circ = \frac{1}{2} \text{ chord. } 36^\circ$, a 36° húrja pedig $= \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, azért:

$$\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \quad \text{és} \quad \cos 18^\circ = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$$

ezekből pedig:

$$\sin 36^\circ = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4} \quad \text{és} \quad \cos 36^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$$

mely értékeket, ha az α , és β szögek pótkebleire talált egyenletekben helyettesítjük, ered:

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{3}\sqrt{10-2\sqrt{5}}} \quad \text{és} \quad \cos \beta = -\frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{3}\sqrt{10+2\sqrt{5}}}$$

ezekből pedig:

$$\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}} \quad \text{és} \quad \sin \beta = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}$$

az α , és β szögek összegére tehát állani fog:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{2\sqrt{5}-2}{\sqrt{100-20}} + \frac{2}{3} \cdot \frac{6+2\sqrt{5}}{\sqrt{100-20}}$$

$$= -\frac{1}{3} \cdot \frac{3-\sqrt{5}}{\sqrt{5}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3+\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$$

$$= \frac{2}{3}$$

A rendes húszlap keresett hajlási szöge tehát oly tompa szög, melynek keble két harmaddal egyenlő, mely lehozatal után tehát a hajlási szöget magát szerkesztés által is igen könnyen elő lehet állítani; fokokban kifejezett értéke pedig: $138^\circ 11' 22.9''$.

Meg lehet itt még jegyezni, hogy:

$$\tan \alpha = 3 - \sqrt{5}, \quad \text{és} \quad \tan \beta = -3 - \sqrt{5}$$

s ennél fogva $\alpha = 37^\circ 22' 38.5''$ és $\beta = 100^\circ 48' 44.4''$

összesen pedig $\alpha + \beta = 138^\circ 11' 22.9''$ mint előbb.

Hogy végre az élek egymáshozai hajlásokat megtudhassuk, vegyük tekintetbe például a (10, 12) élt, és tüstént észrevesszük, hogy ez a (9, 12) (11, 12) (9, 10) és (11, 10) éleket

60° alatt, a (8, 12) (7, 12) (4, 10) és (5, 10) éleket pedig 180° alatt metszi át magán a húszlapon, a (3, 8) (3, 4) (6, 7) és (5, 6) éleket pedig csak a meghosszabbításban metszené át 36° alatt. A többi éleket már át nem metszi, még akkor sem, ha azok tetszőlegesen meghosszabbítatnak, de azért azokhoz bizonyos hajlással bír, és pedig a (4, 5), (7, 8), (3, 9) és (6, 11) élekre merőleges, az ellentett (1, 2)-vel pedig párhuzamos; a (8, 9), (4, 9), (7, 11) és (5, 11) élekhez 36° alatt hajol, a (2, 7), (2, 8), (1, 4), és (1, 5) élekhez pedig 108° alatt; végre a (2, 6), (1, 6), (2, 3), és (1, 3) élekhez hajlási szöge ismét 60 fokot téveszen.

Mindegyik él tehát párhuzamos az ellentett éllel, azonfelül a többi élekhez hajlása e következő: 4 élhez hajlik 90° , 8 élhez 36° , 8 élhez 60° , és ismét 8 élhez 108° alatt.

37. §.

A rendes húszlaphoz azon vetületénél, mely a 148-ik ábrában állítatott elő, a (7, 8, 9, 10, 11) ötszög állása egészen tetszőlegesen vétehető fel; ha azonban ezen ötszöget úgy állítjuk, hogy annak egyik éle, például a 149-ik ábrában a (7, 8) él a vetületi tengelyre legyen merőleges, akkor ezen elfordítás által ugyan a fekvetület változni nem fog, de a függvetület sokkal egyszerűbb leendő, minthogy ez esetben az elfedett részek épen a látható részek mögé esnek, és azonfelül az (1, 4, 5) (4, 5, 10), (2, 7, 8), és (7, 8, 12), háromszögek függvetületei egyenes vonalak, minthogy azok síkjai a függlapra merőlegesek; (1, 2), (10, 12), (3, 9) és (6, 11) élek függvetületei egyezsersmind az élek valódi nagyságát adják meg, minthogy azok a függlappal párhuzamosok. Továbbá a függvetületet határozó (2', 7'8'), (7'8', 12'), (1', 4'5') és (4'5', 10') vonalak azon egyenoldalú háromszögek magasságaival egyenlők, melynek oldalait a húszlap élei képezik. Végre a (2', 7'8', 12') és az (1', 4'5', 10') szögek a rendes húszlap hajlási szögének valódi nagyságát adják meg.

A hajlási szög háromszögtani függvényét ezen vetületből szinte egyszerűbben és kényelmesebben lehet feltalálni mint az előbbi §-ben történt. Ugyanis, ha (1')-et (10')-el összekötjük, akkor (1' 10') azon (1 5 10 9 3, 1' 5' 10' 9' 3') rendes

ötszög átlójának valódi nagysága, melynek oldalait a húszlap élei képezik, és ennél fogva, ha ismét a húszlap élét vesszük fel egységnek, lesz:

$$1' 10' = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$$

Továbbá, ha az $(1' 4' 5' 10')$ hajlási szög csúcsát az elmentett hajlási szög csúcsával összekötjük, akkor az összekötési vonal az $(1' 10')$ átlót (α) -ban merőlegesen fogja felezni, és ha még rövidség okáért a fél hajlási szöget (α) -val jelöljük, leend:

$$\sin \alpha = \frac{10' a'}{10' 5'} = \frac{1(\sqrt{5}+1)}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{3}}$$

minthogy $(10' 5')$ az élekből készült egyenoldalú háromszög magassága valódi nagyságában. — Innét pedig tüstént következik

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{3}}$$

$$\text{de } \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

tehát az értékek helyettesítése után ered a hajlási szög részére:

$$\sin 2\alpha = 2 \cdot \frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{3}} = \frac{2}{3}$$

mint ez az előbbi cikkben szinte találatotott.

38. §.

Láttuk a 36-ik §-ben, miként bármelyik húszlap éle párhuzamos az ellentett éllel, és hogy azonfelől még négy élhez 90 fok alatt hajlik. Ha ezen hat él középpontjait egymással összekötjük, akkor az összekötési vonalak, melyek egymást a test középpontjában merőlegesen felezik, a húszlap három fő tengelyét képezik. Ha tehát a testet úgy állítjuk, hogy ezen tengelyek egyike a feklapra, másika pedig a függlapra legyen merőleges, mi által azután a harmadik tengely az alapmetszettel lesz párhuzamos, akkor azon nevezetes vetületekre jutunk, melyek a 150-ik ábrában vannak előállítva. A fek, és függvetület azonos ábrák, csak hogy 90 fokkal vannak egymástól elfordulva, és mind a két vetület megegyez azzal, mely a 149-

diki ábra függvetületét képezi. Ezen vetületek előállításában az előbbiek segítsége nélkül is igen egyszerűen eszközölhető, tudván már azt, hogy a hajlási szög, mely valódi nagyságában lesz szerkesztendő, egyenlő azon tompa szöggel, melynek keble két harmad.

Vége szinte különös figyelmet érdemelnek a húszlap azon vetületei, a melyeket nyerünk, ha a testet, mint ez a 151-dik ábrában történt, az egyik lapjára fektetjük. A fekvetületben az (1, 3, 4) és a (7, 11, 12) háromszögek valódi nagyságokban láthatók, de csúcsellenesen; az alsó háromszög minden csúcsából felfelé, a felső háromszög minden csúcsából lefelé megy egy él, melyek vetületei az előbbi háromszögek magasságainak meghosszabbítását képezik; — ezen élek végpontjai egy rendes hatszög csúcsait fogják képezni, melynél két-két ellentett oldal távolsága egyenlő azon rendes ötszög átlójával, a melynek oldalait a húszlap élei képezik. Ezen adatok után már a fekvetület szerkesztése minden nehézség nélkül eszközölhető. — A függvetületben először is az alsó háromszög csúcsai vitetnek az alapsíkra; az alsó háromszög (1, 4) oldalához van kapcsolva az (1, 4, 5) háromszög, — és hogy az (5) csúcs magasságát megnyerjük, képzeljük azt az (1, 4) él körül a feklapba befordítva, akkor az (5) csúcs a (3)-ra fog esni; a visszafordításkor azonban az (r 3) sugárral fog egy körívet lerni, míg az, az (5)-ben (r 5)-re emelt merőleges által (A)-ban nem metszetik; lesz (5A) az (5) csúcsnak magassága, mely tehát az illető vetítő vonalra felvitetik. Szinte ezen magasságban fekszik a (2) és a (9) csúcs is.

Hogy továbbá az (1, 6) él (6) végpontjának magasságát is megnyerjük, csak tekintetbe kell venni, hogy az (1, 6) vetülethez tartozó valódi hossz egyenlő az alapháromszög oldalával; ha tehát (6)-ban (1, 6)-ra egy merőleget emelünk, és azt az (1) középpontból az (1, 4) sugárral (B)-ben metszük, leendő (6B) a (6) pontnak kívánt magassága, mely tehát a (6), (8), és (10) pontok vetületeire a tengelytől kezdve felvitetik. Végre a felső háromszög a most nyert pontok felett épen oly magasságban fekszik, mint a (2), (5) és (9) pontok fekszenek az alsó háromszög felett, miért is a már talált (5A) és (1, B) ma-

gasságok összege fogja képezni a függvetület összes magasságát, mely is a (7), (11) és (12) pontokhoz fog tartozni.

Az ekkép meghatározott pontok végre, kellő tekintettel a látható és a fedett részekre, azon rendben köttetnek össze, melyet a fekvetület kimutat.

A 152-ik ábrában van kifejtve azon rendes húszlap hálójája, mely a 148—151-ik ábrákhoz tartozik, csak hogy helygazdálkodás tekintetéből az élek valódi hosszának csak két harmada vétetett. Ha a testet magát el akarjuk készíteni, akkor ezen hálót tetszőlegesen nagyított léptek szerint fogjuk egy papirlemezre rajzolni, és azt annak kerülete szerint pontosan kivágni, — a rajzközi vonalakat pedig csak félig bevágni, mi által a lemez a másik oldalra önként áthajlik; végre az összeillő éleket enyves papírral szorosan összevonjuk.

39. §.

Ha a rendes húszlap mindegyik lapjára egy vele egyenlő élű rendes négylap illesztetik, akkor egy igen különös csillagforma test ered, melynek vetületei a 153-ik ábrában szerkesztettek. Ezen vetületek megnyerésére először magát a rendes húszlapot kell valamely egyszerű állásába vetíteni. E célra legalkalmasabbnak látszik azon helyzet, mely a 149-ik ábrában van előállítva. Itt a (7, 8, 12) háromszög függvetülete egyenes vonal, egyszersmind a háromszög magasságával egyenlő; ezen háromszög a reá illesztendő négylap alapját fogja képezni. De ha a négylap csúcsából az ellentett lapra merőlegest bocsájtunk, akkor ennek az alap középpontján kell keresztül menni, mely is a magasságnak két harmadára esik a csúcstól számítva; miért is csak a (7' 8', 12') magasságot kell három egyenlő részre osztani, és a csúcstól számított két harmad távolban egy merőlegest emelni; ezen merőlegesben fog a négylap csúcsa feküdni. A négylap ezen állásánál azonfelől a függlapban a (12)-hez tartozó él valódi nagyságában lesz látható, miért is csak a (12') középpontból a (7, 8) valódi hosszal, mint sugárral, az előbb említett merőleges átmetszettek; biztosság okáért még a (7' 8') középpontból, a (7' 8', 12') magassággal mint sugárral szinte átmetszhetjük a merőlegest,

a talált metszésnek ugyanis az előbbivel egybe kell esni pontos szerkesztés mellett.

Ekkép tehát meg lesz határozva az egyik csúcs [(19') a 153-ik ábrában] és ezt tüstént vetítjük is a feklapra, az illető alapháromszög magasságának meghosszabbítására (19)-be. — Minthogy pedig a felső öt négylap ezen állásnál részarányosan van elosztva, azért a többi négy csúcsot egyszerűen úgy találjuk meg, ha az o középpontból az $(o, 19)$ sugárral egy körivet húzunk meg, és azt az illető magasságok meghosszabbításai által bemetszük; a függlapban pedig a magasságok egyenlők lévén, csak a talált (19')-en keresztül vonunk az alapmetszettel egy párhuzamost, és erre vetítjük a fekvetületben már talált csúcspontokat, ezen csúcsok végre az illető alapok végpontjaival összeköttenek, megjegyezvén egyszersmind, hogy a függlapban a (20), és a (16) csúcsok, az előtte álló (18) és (17) csúcsok által tökéletesen el lesznek fedve.

Tökéletesen ugyanezen utat fogjuk követni a második négylap sor meghatározására, a melyek ugyanis a (2, 7, 8), (3, 8, 9), (4, 9, 10), (5, 10, 11) és a (6, 7, 11) háromszögekre illesztendők, kiindulásul vévén a (2, 7, 8) háromszöget, mint a melynek függvetülete a (2', 7'8') egyenes vonal; ezt kell tehát ismét három részre osztani, a (2')-től kezdve két harmadában reá merőlegest emelni, és azt a (2') középpontból az él valódi hosszával bemetszeni.

A harmadik csúcssor meghatározására a tulsó oldalon lévő (4, 5, 10) háromszög vétetik kiindulásul, az alsó sornál pedig végre az (1, 4, 5) háromszög, megjegyezvén egyszersmind, hogy a 153-ik ábrában a (19') és a vele ellentett (4') csúcsokhoz tartozó magasságok egy egyenes vonalba fognak esni, mely egyuttal a test középpontján is keresztül megy; ugyanez áll a (13') és a vele ellentett (10') csúcsokhoz tartozó magasságokról is.

Ha ezen testet egy a középpontján keresztül a függlapra merőlegesen vezetett tengely körül addig forgatjuk, míg az (1', 2', 16', 17') egyenes az alapmetszetre nem merőleges, akkor ezen állásnál mind a két vetület azonos alakot vesz fel, csak egymástól 90 fokra elfordulva; ezen állás ugyanis a 140-dik ábrában előállított húszlapnak fog megfelelni.

Végre hogy ezen nevezetes testet szinte előállithassuk papirlemezekből, a 154-ik ábrában mellékeljük annak kifejtett hálóját egy negyed valódi nagyságban. Ezen ábra tehát a lemeze rajzolandó nagyított léptékben, és a határszél szerint kivágandó; az ábrában magában előforduló élekre nézve azonban megjegyzendő, hogy csak a vékonyabb vonalakkal kihúzottak metszetnek be a lemez egyik oldalán, a vastagabbak pedig a lemez másik oldalán, mi által azok az egyik oldalra, emezek pedig az ellenkezőre fognak hajolni, minthogy a test maga is kiálló, és bent fekvő élekkel bir; — ezek az alapul szolgáló rendes húszlap éleit képzik, míg amazok a reá illesztett rendes négylap éleihez tartoznak.

40. §.

A rendes hatlap.

A rendes hatlap hat rendes négyszög által képeztetik melyek összesen 24 csücsöt adnak; ezek közül egy tömörszög képzésére három egyesül, miért is a hatlap nyolcz csücsessel bir. Mindegyik él a négy megfekvő élt 90° alatt metszi át, más négy élhez pedig szinte 90° alatt hajlik, a nélkül hogy azokat átmetszené, a többi három éllel pedig párhuzamos. A három egyenlő főtengelyeket úgy kapjuk meg, ha a két-két ellentett négyszög középpontjait összekötjük.

A hatlap vetülete igen egyszerű, ha azt egyik lapjára fektetjük, mint a 155-ik ábrában. Az egész fekvetület egy rendes négyszög, mely a felső és alsó alapot képviseli, a többi négy oldallap, minthogy azok a feklapra merőlegesek, csak vonalként állanak elő. A függvetületben az alap négy csücsén merőlegesen álló élek valódi nagyságokban tűnnek elő, a két alap pedig a függvetületben lesz egyenes vonallá.

Két oldallap hajlási szöge 90 foknyi.

Még egyszerűbb lesz a vetület, ha a test úgy állítatik, hogy az egyik főtengely a feklapra, a másik pedig a függlapra álljon merőlegesen, mint a 156-ik ábrában, ez esetben ugyanis mind a két vetület rendes négyszöggé lesz. — Szinte két azonos vetületre jutunk akkor is, ha a hatlapot az egyik élére úgy fektetjük, hogy ez az alapmetszettel párhuzamos legyen,

mint a 157-ik ábrában, ez esetben mind a két vetület oly egyenszög, melynek rövidebb oldala a hatlap éle, a hosszabb pedig az élekből készült rendes négyszög átlója.

Végre a 158-ik ábrában a hatlap azon állása vétetett tekintetbe, a melynél annak átlója a feklapra merőleges. Ezen állásnál az alsó (1, 1') csúcsból három él indul felfelé, a felső (7, 7') csúcsból pedig három él szögellénesen lefelé, ezen élek végpontjai tehát egybekötve egy rendes hatszöget képeznek, a melynél a két ellentett oldal távolsága egyenlő az élekből képzett rendes négyszög átlójával, miért is ha a négyszög oldala, vagyis a hatszög éle egyenlő az egységgel, akkor ezen hatszög oldala annyi mint $\sqrt{\frac{2}{3}}$. — A függvetületben először is az alsó (1) pont az alapmetszetre vetítetik, azután következnek az ugyanazon magasságban fekvő (2), (4), és (5) csúcsok, melyek ugyanis az alólól felfelé menő élek végpontjai által képeztetnek. Ezen pontok magasságainak meghatározására tekintetbe kell vennünk, hogy a (2, 5) átló fekkentes lévén, annak minden pontja egyenlő magasságban fekszik, és így csak az átlók felező (r) pontjának magasságát kell meghatároznunk, de az (1, r) vagy (6, r) a fél átló fekvetülete, az (r, 2) pedig annak valódi hossza, — ha tehát a (6) végpontban merőlegest emelünk (6, r)-re, és ezt (r) középpontból (r, 2) sugárral átmet-szük (A)-ben, lesz (b A) a (2), (4), és (5) pontok magassága. De tüstént kiviláglik, hogy szinte ily magassággal kell birni ezen pontok felett a (3), (6), és a (8) pontoknak, úgy szinte ezek felett ismét a felső (7) csúcsnak is, minthogy az (r) pont az (1, 6) átló középpontján fekszik, tehát (1)-től (r)-ig csak annyira emelkedhet, mint (r)-től (6)-ig; a felső (7) csúcs pedig épen oly magasan lehet csak a (3), (6), (8) pontok felett, mint az alsó (1) csúcs a (2), (4), és (5) pontok alatt.

Ezen (6 A) magasság befogója lévén az (A r b) derékszögű háromszögnek, melynek átlója $rA = \frac{1}{2}\sqrt{2}$, feltétvén, hogy a hatlap éle az egység, — a másik befogója (6 r) pedig $= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}$, mint azt feljebb találtuk, lesz $6A = \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{6}} = \sqrt{\frac{1}{3}}$; és így ezen magasságot háromszor véve, ered az egész függvetület magassága, mely tehát annyi mint: $\sqrt{3}$; a 146-ik ábra magassága tehát egyenlő az egységgel, a 147-iké egyenlő ($\sqrt{2}$)-vel, a 158-ik ábra magassága pedig $\sqrt{3}$. A 147-ik ábra

magasságát tehát megnyerjük, ha a 146-ik átlóját vesszük, a 148-ikát pedig, ha a 157-iknek vesszük az átlóját.

A 149-ik ábrában van kifejtve a hatlap hálója.

Meg lehet itt még jegyezni, hogy a rendes hatlapba beirható a rendes négylap, ha annak négy, élek által össze nem kapcsolt csúcsait egyenes vonalak által összekötjük, így például ha meghúzzuk az (1, 6), (1, 8), (6, 8), (1, 3), (3, 6) és a (3, 8) átlókat. — Ha pedig a hatlap mindegyik négyszögének középpontjait kötjük össze egymással, ered a rendes nyolczlap. Mind a két eset a 160-ik ábrában van előállítva.

41. §.

A rendes tizenkétlap.

A rendes tizenkétlap tizenkét rendes ötszög által képezetik. Ezen ötszögek összesen 60 csúccsal birnak, melyek közül a tizenkétlap mindegyik tömörszögének képzésére három egyesül, miért is ezen tömörszögek összege $60 : 3 = 20$. — Vetületeinek előállítására legegyszerűbb a testet úgy állítani, hogy az egyik ötszöge a feklapban feküdjék, (mint a 161-ik ábrában); ezen ötszög akkor, úgy szinte a vele ellentett csúcsekenes ötszög valódi nagyságokban rajzolandók. Továbbá az alsó (1, 2, 3, 4, 5) ötszög mindegyik oldalával kapcsolatban van egy másik ötszög, melyek az alsóhoz egy bizonyos szög alatt hajolnak. Hogy ezen következő öt ötszög vetületeit megnyerjük, vegyük tekintetbe először azt, mely az (1, 2) éllel van kapcsolatban, és fordítsuk azt épen ezen közös élen körül a feklapba, úgy hogy az az alap ötszöget tökéletesen elfedje; ha most ismét az (1, 2) él körül a kellő állásába visszafordítva gondoljuk, akkor az (5) csúcson fekvő (6)-os csúcs egy körívet fog leírni, melynek fekvetülete az (1, 2) forgási tengelyre merőleges (5, 6) egyenesbe esik, és bizonyos, hogy a (6) csúcshoz fekvetülete valahol ebben az egyenesben fog fekélni. — De a (6) csúcs azon ötszöghöz is tartozik, mely az (1, 5) alapoldallal van kapcsolatban; ha tehát ezen ötszöget képzeljük először az (1, 5) él körül az alapra és innét ismét a kellő állásába visszafordítva, akkor a (2) csúcson fekvő (6) csúcs egy körívet fog leírni, melynek fekvetülete az (1, 5) for-

gási tengelyre merőleges (2, 6) egyenes vonal; és a (6) csúcs vetületének okvetlen ezen egyenesben kell feküdnie; — miért is ezen vetület az (5, 6) és a (2, 6) közös (6) metszésében leendő, mely pontnak azonfelül a (2, 1, 5) szöget felező (1, 6) vonalba kell esni; hol (1, 6) maga az (1) csúcsból felfelé menő élnek fekvétele. — A többi felfelé menő élék végpontjainak vetületeit már könnyű lesz meghatározni; ugyanis e végre csak az alapötszög (o) középpontjából kell (o6) sugárral egy körívet leírni, és ezt a szögek felező vonalai által bemetszeni, ekkép meg lesznek határozva a (7), (8), (9) és (10) csúcspontok vetületei is. Minthogy továbbá a felső alap az abból lefelé menő élékkel együtt a most meghatározott alsó idommal tökéletesen azonos, csak csúcselesen elfordítva, azért ugyanazon (o 6) sugárral leírt kör a felső szögek felező vonalai által szinte bemetszendők, és a nyert pontok a felső alap csúcsaival összekötendők. — Végre minthogy az alólól felfelé menő élék végpontjai egyszersmind a lefelé menő ötszögek legmélyebb csúcsait képezik, azért csak a segédkör mind a tiz pontja egymással rendes tizszöggé összekötendő; és meglesz a tizenkétfel fekvétele. Székelyudvarhely

A függvetület meghatározására először is az alap ötszög vetítetik az alaplatszetre; azután megkeressük a felfelé menő élék (6), (7), (8), (9) és (10) végpontjainak magasságait a fekvetület felett, megemlékeztvén, hogy a (6) pont, forgatása alkalmával az (r) középpontú, és (r, 2) sugarú körívet írta le mindaddig, míg az a (6) pontban (2, 6)-ra emelt merőleges által (a)-ban nem metszetett; ezen elmélkedés folytán tehát lesz (a, 6) a (6) pont keresett magassága. Ugyanezen magasságot úgy is megnyertük volna, ha az (1, 6), vagy a vele egyenlő (16, 11) fekvetület végpontjában egy merőlegest emelünk, és azt a (16, 17) valódi hosszzal a másik végpontból, mint középpontból átmetszük (c)-ben, lesz (11, c) szinte egyenlő a keresett magassággal, úgy hogy (a, 6) = (11, c). A talált magasságban tehát húzunk a függvetületben egy párhuzamost a vetületi tengellyel, és arra vetítjük a (6'), (7'), (8'), (9'), és (10') pontokat, a melyeket mindjárt a hozzátartozó alap csúcspontokkal össze is kötjük. — A második magassági rétegben fekszenek az alólól felfelé menő ötszögek legmagasabb pont-

jai, a melyek fekvéseit a (11), (12), (13), (14) és (15) pontok képezik. Ezen magasság meghatározására képzeljük ismét (1, 5, 10, 11, 6) ötszöget az (1, 5) éle körül az alapötszög re ráfordítva, akkor a (11) csúcs a (3)-ra fog esni. A visszafordítás alkalmával pedig a (11) csúcs egy oly körivet fog leírni, melynek középpontja (s)-ben van, és a melynek sugara ($s3$); ezen körív tehát addig hosszabbítatik, míg az a (11)-ben (3, 11)-re emelt merőleges által nem metszetik (b)-ben, lesz (b , 11) a keresett második magasság; — az említett pontok tehát azon párhuzamosra vetítendők, a mely a függvetületben a talált magasságban vonatott a vetületi tengelyhez. — Különben ha még az (1) pontot összekötve képzeljük az (o) középponttal, akkor a két (1, o , s) és (1, 11, s) háromszögek azonosságából tüstént következik, hogy $os = s11$; és így a keresett második magasság nem egyéb, mint a feklapbani tizszögön körülírt körnek sugara; holott az első magasság az alapötszög körül írt kör sugarával azonos; minthogy rövid számítás után találni fogjuk, hogy $o, 1 = c, 11$. — Végre a felső (16), (17), (18), (19), (20) ötszög pontjai a most talált pontok felett épen azon magasságban vannak, mint az első magasság pontjai az alsó alapötszög felett.

42. §.

A vetületek feltalálására most előadott szerkesztésből a rendes tizenkétlap két ötszögének egymáshoz hajlási is könnyen meghatározható. Ha ugyanis az alap, és az (1, 5, 10, 11, 6) ötszöget vesszük tekintetbe, akkor ezek hajlási szögét a közös élre merőleges (3, s) és (s , 11) magassági vonalak zárják be. Ha tehát a (3, s , 11) síkot a (3 s) szelvéje körül a feklapba fordítjuk le, akkor az eredt (3, s , b) szög leend a keresett hajlási szög, melyet ha röviden (α)-nak nevezünk, lesz

$$\cos \alpha = - \frac{s, 11}{s, b} \dots m)$$

De a (2, 17, 1) szög, mint a rendes tizszög szöge 144 foknyi, ebből levonván a (18, 17, 16) rendes ötszög szöge, mely is 108°; marad a (17, 18, 2) és a (16, 17, 1) szögek összege = 36°, s minthogy ezen szögek egyenlők, lesz a (16,

17, 11) szög = 18° . De a (3, 16, 17) szög, mint az ötszög fél-szöge annyi mint 54° , azért (s, 11, 1) szög = $54 - 18 = 36^\circ$.

Ha tehát az ötszög oldala egységül vétetik, akkor az (s, 11, 1) háromszögből

$$(s, 11) = \frac{1}{2} \cdot \cot 36 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}} \dots n)$$

Továbbá, ha az alap (1) és (3) csúcsait összekötjük, akkor az (1, 2, 3) egyenszerű háromszögben a (2, 1, 3) szög = 36° , melyet az ötszög szögéből levonván, marad az (s, 1, 3) szög még = $108 - 36 = 72^\circ$, tehát az (1, 3, s) derékszögű háromszögből

$$(s, b) = (s, 3) = \frac{1}{2} \cdot \cot 18 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{\sqrt{5} - 1} \dots p)$$

és ha a talált $n)$ és $p)$ egyenletekből az értékeket az $m)$ alatti egyenletbe helyettesítjük, ered a hajlási szög pótkéblére még:

$$\cos \alpha = - \frac{\sqrt{5} + 1}{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}} \cdot \frac{\sqrt{5} - 1}{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} = - \frac{4}{\sqrt{80}} = - \frac{1}{\sqrt{5}}$$

ezen értékből pedig: $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$

és e két függvény egymással osztása által:

$$\tan \alpha = -2.$$

a rendes tizenkétlap hajlási szögének érintője tehát egyenlő a nemleg kettővel, vagyis az ábrában $(b, 11) = 2$. (s, 11). Ezen szöget tehát igen egyszerűen lehet szerkeszteni az által, ha egy derékszögű háromszögben az egyik befogót kétszer olyan nagynak vesszük, mint a másikat, azután pedig a kisebb befogót meghosszabbítjuk.

A mi az élek egymáshoz hajlását illeti, vegyünk tekintetbe egy tetszőleges, például az (1, 2) élt, és tüstént észrevesszük, hogy ez az (1, 5), (1, 6), (2, 3) és (2, 7) éleket magán a tizenkétlapon 108° alatt, a (4, 3), (4, 5), (12, 7) és (12, 6) éleket pedig a meghosszabbításban metsz át 36° alatt; átmetszi azonfelül még a (10, 15), (8, 14), (18, 13) és (16, 11) élek meghosszabbítását is, de 60° fok alatt. A többi éleket nem metszi ugyan át, de azért azokhoz némi hajlással bir, nevezetesen a (10, 11), (8, 13), (4, 9) és (12, 17) élekhez 90° alatt

hajlik, holott az ellentett (19, 20) élhez párhuzamos. Azonfelül az (5, 10), (3, 8), (7, 13) és (6, 11) élekhez hajlása szinte 60 foknyi, a (16, 17), (17, 18), (9, 14), és (9, 15) élekhez pedig 36 foknyi, — végre a (14, 19), (18, 19), (15, 20) és (16, 20) élekhez ismét 108° alatt hajlik.

Mindegyik éle tehát a rendes tizenkétlapnak párhuzamos az ellentett éllel, azonfelül a többi élekhez hajlása e következő: 4 élhez hajlik 90° alatt, 8 élhez 36° alatt, 8 élhez 60° alatt, és ismét 8 élhez 108° alatt. És ha ezen eredményt összehasonlítjuk azzal, melyet a rendes húszlap részére találtunk, (a 36-ik §-ben) könnyen meggyőződünk, hogy e két eredmény egymással pontosan egyez.

43. §.

Az előbbi pontokban kifejtett vetületeknél az alapötszögnek oly állás adatott, hogy annak egyik oldala a vetületi tengelyvel legyen párhuzamos. A 162-ik ábrában azon állás van tekintetbe véve, a melynél az alapötszög egyik oldala a vetületi tengelyre merőleges. A test fekvetületének alakja ez által változást nem szenved, ugyanis az csak egy a feklapra merőleges tengelyen körül van 18 fokkal tovább fordítva; de a függvetület sokkal egyszerűbb alakot vesz fel, minthogy most az előli élek a hátulsó részen levőket éppen elfedik.

Ezen függvetületben azonfelül a (13', 2'3', 5') szög a tizenkétlap hajlási szögének valódi nagyságát, úgy szinte a (13', 18'), (12', 6') és az (5', 10') vonalak az él valódi nagyságát adják meg, és ezek közül az első és utolsó még a hajlási szöget felező (2'3', 16'20') vonallal párhuzamos, a középső pedig ugyanezen vonalra merőleges. Továbbá, ha az (1', 7'), (7', 17'), (17', 11') és a (11', 1') vonalak meghúzatva képzeltek, ezek egy oly rendes négyszöget képeznek, a melynek oldala az alapötszög átlójával egyenlő; végre a (2'3', 13'), (2'3', 5'), (16' 20', 18') és (16' 20', 10') vonalak az alapötszög magasságainak valódi hosszával egyenlők.

44. §.

A 42-ik §. szerint a rendes tizenkétlap mindegyik éle párhuzamos az ellentett éllel, és azonfelül 4 más élhez 90°

alatt hajlik. Ha tehát ezen hat él közül mindenkor a két-két el-
lentett középpontjait egyenesek által összekötve képzeljük,
megnyerjük a tizenkétlap három fő tengelyét.

A 163-ik ábra a tizenkétlap azon állásának vetületeit
állítja elő, a melynél a fő tengelyek egyike a feklapra, másika
a függlapra merőleges, minek folytán azután a harmadik fő-
tengely párhuzamos az alapmetszettel. Ez esetben mind a két
vetület azonos alak, csak egymástól 90° alatt elfordulva, azon-
felül mindegyik vetület azonos a 162-ik ábrában előállított test
függvetületével.

Ezen vetületnél az egyes vonalak, úgy szinte az előfor-
duló szögek között igen nevezetes viszonyok léteznek, a me-
lyek közül nem leendő felesleges itt a feltünőbbeket megemlí-
teni. Ugyanis ha a tizenkétlap egyik határhozó ötszögének csú-
csai a 166-ik ábrában rendre A, B, C, D , és E -vel jelöltetnek,
továbbá annak oldala az egységnek vétetik, akkor az átló

hossza $BD = 2 \cdot \cos 36^\circ = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$; az ötszög egész magassá-

ga $CN = AC \cdot \cos 18^\circ = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \cdot \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{4}$, és rövid ösz-

szevonás után még $CN = \frac{1}{4} \sqrt{5} + 2\sqrt{5}$; a B , és D csúcsok
magassága pedig az AE alap felett, vagyis

$MN = NP \cdot \cos 18^\circ = \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{4}$; végre a körülírt kör

sugara $AO = AN \cdot \operatorname{cosec} 36^\circ = \frac{1}{2 \sin 36^\circ} = \frac{2}{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}$

$= \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{10}}$.

Ezek segítségével a 163-ik ábra függvetületében a $(13', 2'3', 5')$ szög a tizenkétlap hajlási szöge, melyet α -nak nevez-
vén már találtatott, hogy $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{5}}$, a $13'$ -nél szög pe-

dig $(180 - \frac{1}{2}\alpha)$; a határhozó vonalakat illetőleg pedig $2'7' = MN$,
 $2'13' = CN$, $13'18' = 1$. Azonfelül $8'14' = \frac{1}{4}\sqrt{3}$;

$14'16' = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{5} + 1)}{4}$; $7'1' = 7'19' = BD = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$;

$$5'18' = 2 \cdot (14'16') = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{5}+1)}{2}; 7'6' = CN = \frac{1}{2}\sqrt{5} + 2\sqrt{5};$$

$$9'10' = MN = \frac{\sqrt{10} + 2\sqrt{5}}{4}; \text{ az egész magasság pedig}$$

$$2'16' = 13'5' = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}. \text{ Azonfelül a } 7'12'17' \text{ szög pót-}$$

$$\text{keble: } \cos(7'12'17') = -\frac{\sqrt{5}}{3}, \text{ ezen szög tehát a rendes}$$

húszlap hajlási szögével egyenlő. Úgy szinte, ha a $(7'12')$ és az $1'6'$ vonalak meghosszabbítatnak, akkor ezek a $16'$ pontban fognak egyesülni, és ha az általok befoglalt szög δ -nak

$$\text{neveztetik, akkor ezen szög pótkeble } \cos \delta = \frac{\sqrt{5}}{3}, \text{ miért is}$$

ezen szög a húszlap hajlási szögét 180 fokra pótolja.

45. §.

A 164-ik ábrában a rendes tizenkétlap azon állásában van vetítve, a midőn két ellentett csúcs összeköttetési vonala a feklapra merőleges. Ez esetben a feklapon fekvő (1) csúcsból három él (1, 2), (1, 5) és (1, 6) indul felfelé egyenlő fekhajlással, miért is fekvetületük az (1) pont körül egyenlegesen lesznek elhelyezve, vagyis kettő-kettő 120 foknyi szög alatt hajlik egymáshoz. Ugyanez áll a felső (19) csúcsból lefelé induló három élről, (19, 14), (19, 18) és (19, 20), csak hogy ezek vetületei az előbbieket által képzett szögeket felezik. Rajzoljuk most a bezáró ötszögek egyikét (19, m , n , p , q) valódi nagyságában részarányosan két él vetülete közé, vagyis úgy, hogy az ötszög (19, r) magassága a harmadik él vetülete meghosszabbítására essék; képzeljünk továbbá a (19) csúcson keresztül egy egyenes vonalat vezetve párhuzamosan a 18, 19 vagy az mn összeköttetési vonalhoz, és ezen egyenest forgási tengelyül használva, mely körül az ötszöget addig forgatjuk, míg az m , és n pontok a 18, illetőleg 20 pontokra esnek, akkor ezen forgatás által az ötszög másik két p , és q pontja szinte meg lesz határozva. A szerkesztési eljárás tehát a következő: (19) középpontból (19, v) sugárral leiratik a (vt) ív, míg ez a 18, 20 egyenest t -ben nem metszi; és meghúzzuk a (19 t)

egyenest, míg ez a szinte 19 középpontból $19r$ sugárral vont körív által s -ben nem metszetik; az s -ből $(19, r)$ -re, úgy szinte p és q -ból a forgási tengelyre vont merőlegesek metszései által nyeretnek a 17 és 16 pontok. A nyert pontok egyszerű körülvitele által meghatározatnak a hasonfekvésű $(15, 9)$, $(8, 13)$, úgy szinte alulról a $(11, 10)$, $(4, 3)$ és a $(7, 12)$ pontok is; ha még végre meghúzatnak a $(16, 11)$, $(10, 15)$ stb. összeköttetési vonalak, elő lesz állítva a test fekvetülete.

Meg lévén ekként határozva a tizenkétlap fekvetülete, és ismeretes lévén egyszersmind minden egyes részek valódi nagysága, a függvetület további meghatározása minden nehézség nélkül eszközölhető.

Meg lehet itt azonban jegyezni, hogy ezen vetületet sokkal egyszerűbben, és biztosabban elő lehet állítani, a 163-ik ábra függvetületét vévén alapul. Itt ugyanis a $(18', 5')$ csúcsokat összekötvén, ezen átló a valódi nagyságában látszik, ez lesz tehát a keresett új függvetület egész magassága; azonfelül emelvén a $(18', 5')$ -re $5'$ -ben egy merőlegest, és ezt tekintvén vetületi tengelynek, minden egyes csúcsok illető magasságait egyszerű vetítés által nyerjük meg; így például a $(20' d)$ magasság leend az új függvetületben a $(7', 8', 12', 14', 16'$ és $20')$ pontok közös magassága és így tovább. Úgy szinte a fekvetületben, ha az egy pontban egyesülő három él irányra nézve már meghúzatott 120 foknyi egymástóli eltéréssel, akkor az illető élek vetületének nagysága szinte a 163-ból vehető által, erre nézve csak az $(5', 10)$ valódi hosszát kell az új tengelyre vetíteni, lesz $(5' 6)$ a keresett vetület hossza; úgy szinte a 164-ikben a $(19, r)$ valódi hosszának megfelelő vetületét a 163-ból vesszük át, mely is $= 5'd$, és így tovább.

Vége a 165-ik ábrában van kifejtve a rendes tizenkétlap hálója, azonban a 161—164 ábrákhoz hasonlítva, helygazdálkodás tekintetéből csak felényi valódi nagyságban. Ha tehát a tizenkétlapot valóban elő kívánjuk állítani, akkor a jelen ábra tetszőleges nagyságban, a jelenhez hasonló alakban rajzolando kartonra, melyből azután a rajz, határvonalai szerint, élesen kimetszetik, a közbefekvő élek pedig csak félig metszetnek be; azután a test a túloldalra könnyen áthajtatván az összeillő élek enyves papírral összehúzzhatók.

46 §.

A tengely méretű vetületek.

Az eddig előadottak folytán meglehetett arról győződni, hogy minden térmennyiség két vetülete által tökéletesen meg van határozva, elannyira, hogy ezen vetületekből nemcsak a testek alakjára lehet biztos következményt vonni, de azoknak minden egyes méreteit is meg lehet határozni. — Láttuk azonban egyszersmind, hogy a testek vetítése alkalmával két vagy több határozó vonal egymást elfedi, és ilyenkor néha még a gyakorlott szem is alig képes a nyert vetületekből a test valódi alakját maga elé idézni, annyiaval kevésbé, minthogy némelykor még ugyanazon vetületek, különböző megnevezés folytán különböző alakokat jelenthetnek. Így például a 156-ik ábrában vetített köbnek mind a két vetülete egy rendes négyszöget képez; ámde ugyanezen vetületeknek, ha a megjelöléstől eltekintünk, egy oly épszögű négyszög is eleget tesz, mely mind a két vetületi síkhoz 45° alatt hajlik, és a melynek kisebb oldala úgy viszonylik a nagyobbhoz, mint az egy a kettőből vont négyzet gyökéhez. Így hasonlóan a 138-ik és a 139-dik ábrában ugyanazon testnek vetületei vannak előállítva, s nehézség nélkül meg fogja engedni mindenki, hogy az utóbbi *egy* vetülete a test alakjának tisztább fogalmát nyújtja, mint a 138-ik ábrában adott két vetület; s ha még hozzátesszük, hogy az egyes vonalak méreteit ezen *egy* vetületből szintoly pontossággal le lehet venni, mint ama kettőből, könnyen kiváglik az utóbbi előállítási módszer czélszerűsége.

47. §.

Az ilyféle vetületek szerkesztésénél az egész eljárás azon egyszerű megjegyzésen alapúl, hogy minden test, czélszerű forgatás által oly állásba hozathatik, a melynél az egyes vonalak egymást el nem fedvén, a vetületből a test alakját könnyű szem elé idézni.

Ezen forgatás végbevitelére először egy függélyes tengely vétetik fel a testen keresztül, vagy azonkívül, a mely tengely körül a test úgy mozditatik, hogy annak minden pontja

egy adott, vagy tetszőlegesen választott szögnek megfelelő körívet írjon le. De ezen egy fordítás a legtöbb esetben elegendő nem lesz, mert ez által a felvett tengelyre merőleges síkok irányokat nem változtatván meg, azok a forgatás után is a függvetületben csak egyenes vonalként tűnnek fel; szükséges lesz tehát a testet még egy másik tengely körül is szinte egy adott, vagy tetszőlegesen felvett szög alatt forgatni; ezen tengely talán most a függlapra lehet merőleges.

Minthogy azonban az eredmény ugyanaz leend, akár egy adott testet forgatunk egy a feklapra merőleges tengely körül, akár pedig a feklapot meghagyva a függvetületi síkot fordítjuk el eredeti állásából szinte az adott szög alatt, azért a műtétel egyszerűsítése okáért, ezen utóbbi eljárás czélszerűbbnek mutatkozik.

48. §.

A követendő eljárás egy egyszerű példa által tüstént világos leend. A 167^a ábrában vannak előállítva egy mértföld-mutató legegyszerűbb vetületei, áll az egész két lépcső alakú egyenközlapból, melyek pihenőkül szolgálhatnak, melyen nyugszik maga a mutató tábla. Először is a 167^b ábrában az egész test az $(ab, a'b')$ él körül, mely ugyanis a függlapra merőleges, egy tetszőleges α szög alatt fordítatott el; mely fordítás alkalmával a függvetület alakját nem változtatja, miért is csak az előbbi függvetület egyszerűen ismételtetett, de a tengelyhez α szög hajtás alatt. A fekvetületben az egyes pontok tengelytől távolsága szinte nem változván, az előbbi vetület pontjain keresztül csak a vetületi tengellyel párhuzamosak vonatnak, melyen az illető pontok az új függvetületből egyszerű vetítés folytán könnyen meghatározhatók.

Ugyanezen eljárást lehet most ismételni a második elfordításra nézve; ha például felvétetik az új (b, b') ponton keresztül egy a feklapra merőleges tengely, mely körül a test egy bizonyos β szög alatt elfordítandó, akkor a fekvetület alakja nem változván, ez csak egyszerűen lemásolandó, de úgy, hogy a bc oldal a vetületi tengellyel β szöget képezzen. A függvetületben az egyes pontok magasságai szinte nem változnak, miért is csak 167^b függvetülete egyes pontjain keresztül az

alapszemponttal párhuzamosak vonatnak, melyen a kívánt pontok ismét egyszerű vetítés által határozhatók meg.

Hogy azonban a fekvetület ismételt lerajzolását meggázdalkodjuk, célszerűbb leendő a függvetületi síkot mozdítani úgy el, hogy az új vetületi tengely V_1T_1 képezze a bc oldallal a kívánt β szöget. Most ugyanis csak a 167^b fekvetület minden egyes pontja vetítetik az új tengelyre, és hogy a nyert kép láthatóvá tétessék, a V_1T_1 sík egy tetszőlegesen felvett (T_1, T_1') függélyes vonal körül addig forgattatik, míg az a függvetületi lappal párhuzamos nem lesz; ekkor azután a vetítő vonalakra az egyes pontok magasságai csak az előbbi függvetületből egyszerűen átvitethetnek. 167^c .

49. §.

A jelen előállítási módszernek azonban több hátránya van, nevezetesen 1-ször, hogy a 167^c vetület előállítására, a 167^a egyszerű vetületeken kívül, még egy közbeeső 167^b vetületre van szükség, mi által az eljárás hosszadalmassá válik; 2-szor a vetítő vonalak sokasága miatt könnyen támadhat zavar; és 3-szor hogy a nyert ábra a tengelyhez képest ferde állást vesz fel, mi által a kép kelleméből veszít.— Ezen utóbbi hátrány eltávolítására, a függlapra merőleges forgási tengely helyett, egy oly tengely választatik, mely a vetületi tengellyel párhuzamos; az így felvett tengely mellett a test a függőleges irányát nem veszti el; ha ugyanis egy vonal, melynek mindkét vetülete merőleges a vetületi tengelyre, ez utóbbi, vagy egy oly tengely körül forgattatik, mely ezzel párhuzamos, akkor a vetületek iránya nem változik.

Azonban az említett másik két hátrányt is el lehet távolítani a következő, az eddigig teljesen eltérő eljárás szerint, melyet bárminő testek, kivált azonban a jegeczalakok előállítására igen célszerűen lehet alkalmazni, s mely eljárást annak főtulajdonságához képest *tengelymentes* vetületeknek nevezünk.

50. §.

Hogy bármely térmennyiséget hasonló eljárás által legyen képesek előállítani, vonatkoztatassuk azok határozó pontjait három egymásra merőleges összerendezői tengelyre,

forgassuk magát ezen tengely-rendszeri a rajtok már megjelölt metszésekkel és rendezőkkel együtt az említett α és β szögek alatt; határozzuk meg azután az összrendezőknél megfelelő pontokat, akkor ezek összeköttetése a test vetületét a kívánt forgatás után tünteti elő.

Legyenek tehát (168. ábra) AB és AC a metszéki tengelyek, melyek már a harmadik, vagyis a rendező tengely körül α szög alatt el vannak fordítva. Minthogy az AB és AC tengelyek legegyszerűbben a fekvületi síkban magában vétetnek fel, függvetületek az alapmetszbe esik; a harmadik függélyes rendezői tengely a fekvületben A -ban pontosúl, függvetülete pedig A' által van képviselve.

A második forgás végbevitelére szolgáljon az A ponton keresztül, az alapmetszettel párhuzamosan vezetett gh vonal. (A) pont, mint a forgási tengelynek egy pontja változatlan marad, a BAC sík pedig, úgy szinte az AF tengely β szög alatt hajtatnak meg.

Hogy az AB és AC tengelyek emelkedéseinek megfelelő vetületeket szerkeszteni lehessen, czélszerű lesz bennök bizonyos pontokat felvenni, talán az egység távolában, legyenek ezek B és C . Ezen pontok a forgatás alkalmával a gh vonalra merőleges köríveket írnak le, melyek fekvületre Bg és Ch , függvetületre pedig $b'g'$ és $c'h'$ vonalak által adatnak. Hogy a β szögnek megfelelő emelkedést tekintetbe vehessük, szolgál a forgási tengelyre merőlegesen felvett MN segédsík, mely síkban ugyanis a forgatási ívek valódi nagyságokban tűnnek elő. Az ezen sík által meghatározott b'' és c'' pontok tehát visszavetítve a b és c pontokat fogják megadni, melyeknek A -vali összeköttetésük a tengelyek fekvületét fogják képezni a fordítás után. Az $A'b'$ és $A'c'$ függvetületeket pedig az által szerkesztjük legegyszerűbben, ha a $g'h'$ és $h'c'$ merőlegesekre a B és C pontok magasságait átvisszük a segéd MN vetületből. — A mi végre a magassági tengelyt illeti, ez szintúgy határozatlik meg a segédsík használatával, mint az előbbi két tengely, mint azt az ábra egyszerű megtekintése mutatja.

Ennek következtében a tengelyek új állásának fekvületlei: Ab , Ac és Af ; függvetületei pedig: $A'b'$, $A'c'$ és $A'f'$.

Ez utóbbi vetületek a test oldalnézetét, az előbbieket pedig az ugyanazon állásnak megfelelő felülnézetét fogják megadni. A felülnézet azonban csak igen ritkán szokott használatni, az oldalnézet elégséges lévén arra, hogy az illető testről magunknak tiszta fogalmat szerezzünk.

51. §.

Ha a fordulási α és β szögek advák, akkor a tengelyek minél egyszerűbb szerkesztésére nézve szükséges leend azon x és y szögek meghatározása az adott α és β szögek függvényeiben, melyeket a tengelyek függvetületei, úgy szinte azon w és z szögek meghatározása, melyeket ugyanazon tengelyek fekvetületei képeznek az alapmetszettel.

Az 168-ik ábrában AB egységül vététt fel, minek következtében:

$$Ah = Bg = ab'' = \cos \alpha$$

$$Ag = Ch = ac'' = \sin \alpha;$$

$$b'g' = ab'' \sin \beta = \cos \alpha \sin \beta$$

$$c'h' = ac'' \sin \beta = \sin \alpha \sin \beta;$$

$$\text{továbbá: } bg = ab'' \cos \beta = \cos \alpha \cos \beta$$

$$\text{és } ch = ac'' \cos \beta = \sin \alpha \cos \beta;$$

$$\text{tehát: } tg x = \frac{b'g'}{A'g'} = \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\sin \alpha} = \sin \beta \cot \alpha \quad 1$$

$$tgy = \frac{c'h'}{A'h'} = \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha} = \sin \beta \tan \alpha \quad 2$$

$$tgw = \frac{bg}{Ag} = \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\sin \alpha} = \cos \beta \cot \alpha \quad 3$$

$$\text{és } tgz = \frac{ch}{Ah} = \frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha} = \cos \beta \tan \alpha \quad 4$$

mely képletek által az x, y, w , és z szögek vannak meghatározva, az összrendezők tengelyeit tehát mind a két vetületben szerkeszteni lehet; de még tudni szükség, hogy mily arányban kell az illető tengelyekre felrakni a metszékeket és rendezőket; a valódi nagyságok helyett most ugyanis csak a vetületek veendői, a melyek, mint az ábra mutatja, minden tengelyen más-más rövidítésben fordulnak elő, a miért is az ilyféle vetületek, hol α és β egészen tetszőleges, háromméretű vetületeknek nevezetnek.

Az ábrából ismét a függvetület részére :

$$\text{a szélesség } A'b' = \sqrt{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha \cos^2 \beta} \quad 5$$

$$\text{a hossz } A'c' = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \sin^2 \beta} = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha \cos^2 \beta} \quad 6$$

$$\text{Vége a magasság } Af' = \cos \beta \quad 7$$

ugyanis AB a szélességi, AC a hosszúsági, és AF a magassági tengelynek szokott nevezetni.

De $A'b'$ szélességet még másképp is ki lehet fejezni, ha t. i. benne β szög helyett az α szög függvénye hozatik számításba, mi által ered a sokkal egyszerűbb, és az alantabb leírandó szerkesztésre alkalmasabb minta :

$$A'b' = \sin \alpha \cdot \sec \alpha \quad 8$$

hasonlóan $A'c'$ mintából β szöget kiküszöbölve, s helyébe az γ szög függvényét hozván bele, álland :

$$A'c' = \cos \alpha \cdot \sec \gamma \quad 9$$

Hasonló eljárás által találhatunk a fekvetületre nézve is e következő minták :

$$\text{a szélesség } Ab = \sqrt{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha \sin^2 \beta} \quad 10$$

$$\text{vagy } Ab = \sin \alpha \cdot \sec \alpha \quad 11$$

$$\text{a hossz } Ac = \sqrt{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \beta} = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha \sin^2 \beta} \quad 12$$

$$\text{vagy } Ac = \cos \alpha \cdot \sec \beta \quad 13$$

$$\text{végre a magasság } Af = \sin \beta \quad 14$$

a kifejtettek folytán tehát minden vetületre négy lépték szükségeltetik ; az első hossza egy tetszőleges egység ; a többi három hossza pedig a felvett egységhez képest a nyert 7, 8 és 9, vagy a 11, 13 és 14 alatti képletek szerint határozandó meg.

Használatkor a test vetületeinek méretei vagy az adott egyszerű vetületekből (mint alaprajz és kereszt-szelvény) vagy ha lehet a testről magáról is levétetnek, hosszaságaik az egység-léptéken megmértetnek, s a többi lépték segítségével megkurtítva az illető tengelyekre felrakatnak ; nevezetesen a hossz és szélesség az $A'b'$ és $A'c'$ (vagy Ab , Ac) tengelyekre ; a magasság pedig az ezen két metszék által meghatározott rendezőre a függvetületre nézve felfelé, a fekvetület részére pedig lefelé.

Az ily úton nyert eredmények, mint már említve volt, háromméretűeknek nevezetnek, mert mind a három tengely-

nek külön mérete vagyis külön léptéke lévén, a megkurtítás is mindegyik tengelyen különböző.

Jegyzet. Az elmélet kiegészítésére nézve szükségesnek véltük a képleteket a fekvetületre szintúgy, mint a függvetületre lehozni, de ismételve kell arra figyelmeztetnünk, hogy gyakorlatban az oldalnézet tökéletesen elégséges arra, hogy magunknak a kívánt térmennyiségről tiszta fogalmat szerezzünk, s ezen okból a későbbi alkalmazásoknál, úgy szinte a mellékelt rajzokban mindenütt csak ezen egy vetület vétetett tekintetbe.

52. §.

A tengely-rendszer azonban kétméretű is lehet, ha t. i. a hosszasági és szélességi léptékek egyenlők, a mi nyilván csak akkor létesülhet, ha az első, vagyis az elfordulási α szög 45 foknyinak vétetett fel; az 5- és 6-ik képletből ugyanis könnyen következik, hogy $A'b'$ és $A'c'$ csak akkor egyenlők, ha $\alpha = 45^\circ$. Helyettesítvén tehát α helyett 45 fokot a talált mintákba, erednek ezen egyszerűbbek:

$$\begin{aligned} tg\alpha &= tg\gamma = \sin\beta & \dots & \dots & 15 \\ A'b' = A'c' &= \sqrt{1 - \frac{1}{2} \cos^2\beta} = \frac{1}{2} \sqrt{2} \sec\alpha & \dots & \dots & 16 \\ \text{a magasság marad } A'f' &= \cos\beta & \dots & \dots & 17 \end{aligned}$$

mely mennyiségek már most, mint látjuk, csupán a hajlási β szög függvényei.

53. §.

De lehet végre a tengely-rendszer egyméretű is, ha ugyanis mind a három tengely csak egy lépték szerint kurtittatik meg. Minthogy ezen rendszernél a hossz és szélesség ismét egyenlő, az elfordulási α szög szinte 45 foknyi leendő, és csak az a kérdés támad, mennyire kell a testet meghajítani, hogy az egységnek megfelelő magasság épen annyira kurtuljon meg, mint a szélesség vagy a hossz; vagyis kerestetik β szög azon feltétel alatt, hogy

$$A'b' = A'c' = A'f'$$

De a 16-ik és a 17-ik képlet azonosításából következik:

$$\sqrt{1 - \frac{1}{2} \cos^2\beta} = \cos\beta$$

$$\text{és innét ; } \cos\beta = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

mi által $tgx = tgy = \frac{1}{\sqrt{3}}$ vagy $\sin x = \sin y = \frac{1}{2}$

és így $x = y = 30^\circ$

és $A'b' = A'e' = A'f' = \sqrt{\frac{2}{3}}$

Jegyzet. Az egyméretű vetületeknél tehát az elfordulási α szög mindig 45° , a hajlási β szög pedig $= 35^\circ 15' 51.8''$.

54. §.

Meg kell még említenünk, hogy a két- és háromméretű vetületek részére lehozott minták némi módosítást szenvednek a végre, hogy a szerkesztésnél könnyebben kezelthessenek.

Gyakorlatban ugyanis a szögekkel, és azok függvényeivel bánás igen alkalmatlan lévén, az elfordulási α szög nem fokokban szokott adatni, hanem inkább azon viszony által, melyben keble áll pótkebléhez, vagyis adatik e következő arány ;

$$\sin \alpha : \cos \alpha = p : q$$

hol p és q két adott szám; ezen arányból azután könnyen következik :

$$\sin \alpha = \frac{p}{\sqrt{p^2 + q^2}}; \text{ és } \cos \alpha = \frac{q}{\sqrt{p^2 + q^2}}$$

mely értékek már csak a fent lehozott mintákban volnának helyettesítendők.

A hajlási β szög pedig úgy vétetik fel, hogy keble végszerű törtet képezzen; az ilyen szöget ugyanis legkönnyebb rajzban előállítani.

A p és q viszonzyszámok, úgy szinte a β szög czélszerű megválasztásától függ a nyert alakok czélszerű állása is. Ha $p : q = 1 : 3$ és $\sin \beta = \frac{1}{3}$, akkor az ezen adatok segítségével alakult vetületek Mohs-féle vetületeknek neveztetnek, mint-hogy ezen adatokat használta Mohs a jegecz-minták előállítására; minthogy azonban ezen adatok bármely térmennyiség előállítására is igen alkalmasak, azért azok a vetülettanban általánosan el vannak fogadva.

$$\text{Ezen vetületeknél } \cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{10}} \text{ és } \sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}$$

$$\text{S innét : } tgx = \frac{3}{4}; tgy = \frac{1}{4}$$

az elfordulási α szög tehát $= 18^\circ 26' 5_s''$

az emelési β szög pedig $= 7^\circ 10' 50_s''$

a szélesség léptékének hossza $= \frac{1}{8} \sqrt{73} = 0.33773 \dots$

hossz " " $= \frac{1}{8} \sqrt{57.7} = 0.949506 \dots$

és a magasság " " $= \frac{1}{8} \sqrt{63} = 0.99216 \dots$

Jegyzet. Minthogy a magasság léptékének hossza csak $\frac{1}{125}$ -el kisebb az egység léptékénél, azért gyakorlatban, ha a rajzok nem nagy mértékben készítendőek, ez utóbbi lépték egészen mellőztetik, s helyette szinte az egység léptéke használtatik.

55. §.

A mi azonban a léptékek szerkesztését illeti, ez az előbeniek szerint legegyszerűbben következőkép vitetik végbe :

Az OP egyenesre, 169. ábra felrakunk O -tól kezdve tesszőleges nagyságú, de egyenlő 24 részt; az utolsó rész R végpontján emelt merőlegesre ismét 8 részt Q -ig, azután O -t Q -val összekötvé, lesz OQ az egység hossza, QOR szög pedig $= \alpha$; minthogy $\tan QOR = \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$.

Az RQ merőlegesre, továbbá feltevén egy részt N -ig lesz ON a *hoszlépték* nagysága, mert $ON = OR \cdot \sec NOR$; de $OR = \cos \alpha$, mert OQ az egység, NOR szög pedig $= y$, mert $\tan NOR = \frac{1}{3}$; helyettesítve az értékeket, lesz $ON = \cos \alpha \cdot \sec y$; a mi a 9-ik képlettel egyez meg.

R -től O felé felrakván 3 részt L -ig, lesz QL a *szélesség* léptékének nagysága, mert $QL = QR \cdot \sec LQR$; de $QR = \sin \alpha$, LQR szög pedig $= x$, mert $\tan LQR = \frac{3}{4}$; és így $QL = \sin \alpha \cdot \sec x$; a mi a 8-ik képlettel egyez meg.

Vége R -től Q felé felrakván 3 részt K -ig, K ponton keresztül párhuzamost húzván OP -hez, míg az OR sugárral leírt RT körivet T -ben nem metszi, lesz TOR szög $= \beta$, minthogy keble $= \frac{3}{4} = \frac{1}{8}$; ezen szög OM pótkeble tehát az OQ egységre nézve lesz a 7-ik képlet szerint, a *magasság* léptékének hossza.

Ha már most a 169^a ábrában az OQ egyenesre átvitetik az egység, O középpontból ON *hoszsza*l körív iratik le, melyet Q -ból QL *szélességgel* átmetszünk, ered az ONR háromszög, melyben $OQ = I$; $ON = \text{hossz}$; és $QN = \text{szélesség}$; to-

vább: az OM magassággal O -ból irt körívet, Q -ból szinte QL szélességgel metszvé, lesz OMQ háromszögben ismét $OQ=I$, OM = magasság és MQ = szélesség.

Húzzunk már most QM és QN vonalakhoz csekély távolságokban párhuzamosokat, ezek minden tetszőleges egységnek megfelelő *hosszat*, *szélességet* és *magasságot* fognak az illető léptékeken kijelölni.

56. §.

A kétméretű vetületeknél gyakorlatban β szög keblét $\frac{1}{6}$ -nak szokás venni, mi által:

$$\tan x = \tan y = \frac{1}{6}$$

ezen vetületeknél tehát $\alpha = 45^\circ$, β pedig $= 9^\circ 35' 38.6''$

$$A'b' = A'c' = \frac{1}{6} \sqrt{18.8} = 0.71686 \dots$$

$$A'f' = \frac{1}{6} \sqrt{35} = 0.98601 \dots$$

A lépték szerkesztésére nézve felrakunk a 170-ik ábrában OP egyenesre O -tól kezdve hat egyenlő részt R -ig, az R -beni merőlegesre szinte 6 részt Q -ig, és legyen az összekötési OQ vonal az egység hossza, akkor $OR = \frac{1}{6} \sqrt{2}$.

Felrakunk továbbá RQ merőlegesre egy részt N -ig, lesz ON a *hossz* és *szélesség* léptékének nagysága, mert

$$ON = OR \sec. NOR$$

de NOR szög $= y$, mert $\tan NOR = \frac{1}{6}$, és azért

$$ON = \frac{1}{6} \sqrt{2} \sec x.$$

a mi a 16-ik képlettel egyez meg.

Húzzunk most még N ponton keresztül párhuzamost OM -el, míg az OR sugárral leirt RT ívet T -ben nem metszi, lesz TOR szög $= \beta$, minthogy keble $= \frac{1}{6}$; ezen szögnek tehát OM pótkeble az OQ egységre nézve nem egyéb, mint a *magasság* léptékének hossza, a 17-ik képlet szerint.

Ha tehát a 170^a ábrában átvitetik OQ egyenesre az egység hossza Q -ig, O -ból OM magasság sugárral körív vonatik, melyet Q -ból ON szélesség sugárral N pontban metszünk, akkor OQN háromszögben az NQ -hoz vont párhuzamosak az egységnek megfelelő magasság, hossz és szélesség megrövidítéseit fogják kijelölni az illető léptékeken.

57. §.

Végre az egyméretű tengelyrendszer léptékének szerkesztésénél képeztetik (170-ik ábra) O -nál egy 45° és egy 30° foknyi ív, úgy hogy $QOR=45^\circ$, $HOR=30^\circ$, és ha még RQ merőleges OR -re, lesz $OR=1$; $OH=hossz$, *szélesség*, és *magasság*, mert

$$ON = OR \cdot \sec. 30^\circ = \frac{1}{2} \sqrt{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

mint lenni kell. (lásd 53. §.)

Szerkesztvén tehát a 170^b ábrában OQN háromszöget, melyben $OQ=1$; $ON=hossz$; QN pedig tetszőleges, akkor a QN -hez vont párhuzamosak az egységnek megfelelő kurtított méreteket fogják meghatározni az ON vonalon.

Fontos azonban az egyméretű vetületeknél, hogy itt a lépték egészen mellőzhető, minthogy minden méret egyenlő arányban rövidül meg. A léptékekkel, és lépték nélkül készült vetületek tehát egymástól csupán nagyságra nézve lehetnek különbözök; az előbbieket ugyanis úgy viszonylanak az utóbbiakhoz, mint $\sqrt{3}:\sqrt{2}$.

58. §.

Az előbbieken kifejtett elvek alkalmazására szolgáljon, két egymáson nyugvó egyenes egyenközláp, négyzet alappal, melyeknek felül- és oldalnézete a 171-ik ábrában van előállítva. Az ezen test alaprajzában előforduló AC és BC oldalak, melyek egymásra merőlegesek, szolgálhatnak egyúttal az összerendezői tengelyekül.

Ezen testnek Mohs-féle vetülete a 171^a ábrában látható; itt ugyanis bc egyenes tetszőleges A pontjában meghúzatott az AI merőleges, azután A -tól balra felrakatott 8 egyenlő rész b -ig, a b -beni merőlegesre 3 oly rész B -ig; továbbá A -tól jobbra felvitetett 24 egyenlő rész, c -ig, és a c -beni merőlegesre egy ilyen rész C -ig; a meghúzott AB és AC vonalak által azután meg van határozva a tengelyek iránya.

Megméretett azután az AC hossz a 169^a lépték egység vonalán, és a hosszvonalon megrövidítés AC vonalra átvitetett, az AB méret pedig a szélesség szerint rövidítve AB -re; az

alap negyedik pontja már a megvont párhuzamosok által lesz meghatározva. Az így nyert alap négy sarkpontjában AI -hez vonatnak párhuzamosok, melyekre a megrövidített magasság vitélik fel, s. i. tovább.

171^b-ben ugyanazon testnek kétméretű vetülete szerkesztett. Itt A -tól mindkét oldalra 6 egyenlő rész vitétt fel b és c -ig, az itt emelt merőlegesekre egy rész B és C -ig. A tengelyek iránya ily módon meg lévén határozva, a többi eljárás azonos az előbb leírttal.

Ugyanez áll a 171^c-ben szerkesztett egyméretű vetület-ről is, csak hogy itt az AB és AC tengelyek 30 foknyi hajlással bírnak.

Végre megjegyzendő, hogy ha a test alaprajzában alkalmas épszök elő nem fordul, akkor az alapvetületén kívül vitétik fel az épszögű összrendezők tengelye.

59. §.

Hogy a Mohsféle vetületek alkalmazását kevésbé összetettebb testeknél is láthassuk, a 172-ik ábrában van előállítva egy emlékoszlop, melynek felől és oldal nézete a 172^a vetületek által vannak megadva. Az eljárás az előbbeniekben előadottakkal tökéletesen azonos, és a szerkesztés minden további nehézség nélkül eszközölhető. A netalán előforduló görbe vonalakra nézve kell még csak azon megjegyzést mellékelnünk, hogy ezek tetszőleges számú pontok által szerkesztetnek, melyeknek vetületei meghatározottván, azok egy folytonos görbe által köttetnek össze. Több példákat az alkalmazásra felhozni itt feleslegesnek véltük, annyival inkább, minthogy a jövő cikkben tárgyalandó Archimedesféle testek, ezen vetületek szerint előállítva úgy is elegendő és czélszerű gyakorlatul szolgálnak.

60. §.

A r é s z a r á n y o s (Archimedesféle) t e s t e k .

Rendes testeknek nevezettek azon testek, melyek csupa *egyenmő* rendes sokszögek által zárattak be; ha azonban a testek felülete még mindig rendes sokszögek által képezetik ugyan, de úgy, hogy az egyes csúcsok képzetére többféle rendes sok-

szög járulhat, akkor az eredt testek *részarányos testeknek* nevezetnek, feltéve, hogy mindegyik csúcs képzésénél ugyanazon összeállítási törvény használtatik.

Könnyű azonban belátni, hogy ilyenmü testek legfeljebb háromféle sokszögekből képezhetők, mert ha csak négyfeléket veszünk is fel, és feltesszük, hogy egy csúcs képzésére mind-egyikből egy szög járul, és a felvett sokszögek oldalai száma a lehető legkisebbek, tehát ha egy csúcs képzésére járul egy háromszög, egy négyszög, egy ötszög és egy hatszög csúcsa, akkor a test csúcsa képzésére szolgáló négy síkszög összege: $60^\circ + 90^\circ + 108^\circ + 120^\circ = 378^\circ$; mely összeg a 360 fokot túlhaladván, a testnek bemélyedő, nem pedig kiálló csúcsát képezné; — minthogy pedig minden csúcs ugyanazon törvény szerint alakítandó, azért a test csupa bemélyedő csúcsokból állana; a mi lehetetlen.

De még két vagy háromféle sokszögekből se lehet minden tetszőleges csoportosításokban részarányos testeket előállítani. Ugyanis minden síkfelületek által bezárt test élei, csúcsai, felületei és síkszögei száma között bizonyos viszonyok léteznek, melyek törvényei egyenletek által kifejezhetők, és a test csak úgy lehetséges, ha az adott feltételek mellett ezen egyenletek ellenmondást nem tartalmaznak magokban. Ezen egyenletek legnagyobb részt Eulertől származnak,*) és a tömörmértanokban tárgyaltnak szoktak. Itt csak a következő négy legfontosabbat kívánjuk megemlíteni; ha ugyanis a test síkszögei számát V -vel, azok összegét fokokban W -vel, a tömörcsúcsok összegét E -vel, az éleket K -val, és a felületek számát F -el jeleljük, állandó:

$$V = 2K \dots 1) \quad E + F = K + 2 \dots 2)$$

$W = 4R \quad (K - F) \dots 3)$ és $W = 4R \quad (E - 2) \dots 4)$ hol R egy derékszöget jelent.

*) *Elementa doctrinae solidorum*; és *Demonstratio nonnullarum insignium proprietatum, quibus solida, hedris planis inclusa sunt praedita*. Nov. Comm. Petrop. T. IV.

61. §.

A kétféle rendes sokszögek által bezárt testek.

Egy részarányos test felülete képeztessék csupa rendes m szögekből és n szögekből. Az m szögek száma legyen M , az n szögeké N ; azonfelül egy tömörcsúcs képzéséhez járuljon az m szögekből: μ , az n szögekből pedig r ; legyen azonfelül a csúcsok száma E , az éleké pedig K .

Mint hogy minden csúcs képzéséhez az m szögekből μ járul, az m szögek összege pedig Mm , azért a csúcsok száma $E = \frac{Mm}{\mu}$; ... 1) de minden csúcsban r nszög is előfordul, az

nszögek száma pedig Nn , azért áll szinte $E = \frac{Nn}{r}$ 2).

Továbbá az m szög mindegyik szöge: $\frac{2(m-2)R}{m}$, hol R egy derékszöget jelent; épen így az n szögek mindegyik szöge: $\frac{2(n-2)R}{n}$; és mint hogy az előbbieik száma Mm , az utóbbiaké Nn , azért a síkszögek összege

$$W = 2R \left[\frac{(m-2)Mm}{m} + \frac{(n-2)Nn}{n} \right],$$

vagy Mm és Nn helyett 1) és 2) böi az értékeket helyettesítve

$$W = 2RE \left[\frac{\mu(m-2)}{m} + \frac{r(n-2)}{n} \right]$$

De az előbbi §. 4-ik egyenlete szerint $W = 4R(E-2)$ azért

$$\text{szinte } E \left[\frac{\mu(m-2)}{m} + \frac{r(n-2)}{n} \right] = 2(E-2)$$

és innét $E = \frac{4mn}{2mn - \mu n(m-2) - rm(n-2)}$, vagy ha rövidség okáért $A = 2mn - \mu n(m-2) - rm(n-2)$ leend még

$$E = \frac{4mn}{A} \dots 3) \text{ és a talált értéket 1) és 2)-be helyettesítvén:}$$

$$M = \frac{4\mu n}{A} \dots 4) \quad N = \frac{4rm}{A} \dots 5); \text{ végre az előbbi §. 1)}$$

$$\text{egyenlete szerint: } K = \frac{Mm + Nn}{2} = \frac{4mn}{A} \left(\frac{\mu + r}{2} \right) \dots 6)$$

62. §.

Figyelembe véve az előbbi cikk egyenleteit, már könnyű leendő meghatározni mind azon testeket, a melyek kétféle rendes sokszögek által zárhatók be.

Legyen ugyanis 1-ször $m=3$, és $n=4$, minthogy ezen értékeknél kisebbeket fel nem vehetnek; vagyis egy test csupa háromszögek és négyszögek által zárassék be, és pedig úgy, hogy minden csúcs képzéséhez járuljon egy háromszög és két négyszög, vagy is $\mu=1$ és $\nu=2$; ha ugyanis $\mu=1$, akkor ν kettőnél kisebb nem lehet, minthogy a tömörszög képzésére legalább három síkszögnek kell egyesülni. Ezen adatokat az előbbi cikk egyenleteibe helyettesítve ered:

$$E = \frac{48}{8} = 6; M = \frac{16}{8} = 2; N = \frac{24}{8} = 3; \text{ és } K = \frac{6 \cdot 3}{2} = 9.$$

Az ezen adatokhoz tartozó test egy hasáb, melynek keresztmetszete egy rendes háromszög, és melynek oldalfelülete négy azonos rendes négyszögből áll.

2-szor. Legyen ismét $m=3$, $n=4$, $\mu=1$, de $\nu=3$; akkor ered:

$$E = \frac{48}{2} = 24; M = \frac{16}{2} = 8; N = \frac{36}{2} = 18; \text{ és } K = \frac{24 \cdot 4}{2} = 48.$$

Az ide vonatkozó test, mely tehát 18 négyszögből, és 8 háromszögből képeztetik, a rendes hatszögből ered, ha annak mindegyik éle akként metszetik le, hogy a lemetszett rész szélessége a megmaradttal egyenlő legyen, vagy a mi mindegy, hogy a keresztmetszetek a test közepén keresztül rendes nyolcszögeket képezzenek. A rendes hatlap 12 élei helyébe jönnek ugyanannyi rendes négyszögek, melyekhez járul a még megmaradt hat rendes négyszög, összesen tehát 18 négyszög, a hatlap 8 csúcsa pedig az élek lemetszése által önkényt elesvén, helyettök ugyanannyi rendes háromszög áll elő.

A kezdő igen czélszerűen maga fogja ezen testeket papírpéplemezből előállítani, mi végre a 173^a ábrában elő van állítva a test hálójá. Ezen háló a papírpéplemezre tetszőleges nagyításban rajzoltatván, kerete szerint kimetszetik, a többi megmaradt vonalak pedig félig bemetszetnek, mi által a hálót

könnyen át lehet a túloldalra hajlítani, hol azután az összeillő élek enyves papírral összehúzatnak.

A test legegyszerűbb vetületei a 173^b ábrában vannak előállítva; — mind a két vetület ugyanazon alakot mutat; ugyanis egy rendes nyolczszöget, melynél két-két csúcs az oldallal párhuzamosan van összekötve. A látható részek a nem láthatókat éppen fedik, miért is minden vonal egészen ki van húzva.

Végre a 173^c ábrában van előállítva a test Mohs-féle vetülete, a melyből a test alakja már tisztán kivethető.

63. §.

Ha $m = 3$, és $n = 4$, vagyis ha a test csupa három és négyszögekből alakíttatik, ha azonfelől $\mu = 1$, vagy is, ha a háromszögekből a csúcs képzéséhez csak egy járul, akkor r a négyszögek száma egy csúcsnál háromnál nagyobb nem lehet, minthogy a szögek összege már is 360 foknyi, ha $r = 4$.

Legyen tehát $m = 3$, és $\mu = 2$; ha ez esetben n még mindig négy, akkor r lehet vagy egy, vagy kettő. Ha r ugyanis kettőnél nagyobb, a szögek összege mindegyik csúcsnál 360 foknál nagyobb lenne.

Azonban ha $m = 3$, $n = 4$, $\mu = 2$, és $r = 1$ akkor

$$A = 2mn - \mu n(m - 2) - rm(n - 2) = 10$$

$$\text{és } E = \frac{4mn}{A} = \frac{48}{10}$$

minthogy pedig a csúcsok száma tört nem lehet, azért ezen test is lehetetlen. Lesz tehát csak: $m = 3$, $n = 4$, $\mu = r = 2$; vagy is oly test, mely három és négyszögekből úgy alakíttatik, hogy minden csúcs képzéséhez 2 három, és ugyanannyi négyszög járuljon. Ezen adatokból lesz $A = 4$; miért is

$$E = \frac{48}{4} = 12; M = \frac{32}{4} = 8; N = \frac{24}{4} = 6; \text{ és } K = 24.$$

Az ide tartozó test tehát 8 háromszögből és hat négyszögből képeztetik, bir tizenkét csúcscsal, és huszonnégy éllel. Hálója a 174^a alatti ábrában van előállítva.

Ezen test a rendes hatlap megcsonkítása által ered és pedig akképen, ha a rendes hatlapnál az egy csúcsba egyesült élek felező pontjain keresztül vezetünk metsző síkokat; a hatlap nyolcz csúcsa helyébe áll a nyolcz egyenoldalú háromszög,

a hatlap hat lapján pedig még fennmarad a hat négyszög, melyek azonban a hatlap eredeti négyszögeivel csúcsekenesek.

Ezen származtatás folytán tehát a test egyszerű vetületei igen könnyen előállíthatók. A 174^b ábrában azon állás van tekintetbe véve, melynél a test egyik négyszöglapján nyugszik, melynek egyszersmind egyik átlója a vetületi tengelylyel párhuzamos, ezen állásnál ugyanis mind a két vetület ugyanazon alakot mutat, és egyszersmind a látható élek a nem láthatókat éppen elfedik.

A 174^c ábrában ugyanezen test azon állásában van vetítve, midőn az egyik átlója a feklapra, egy másik pedig a függőlapra áll merőlegesen. Az $(ab, a'b')$ átló a 174^b ábrából egyszerűen átvétetett, minthogy ennek valódi nagysága látható a függővetületben, az $(1, 2, 3, 4)$ négyszög pedig egy vonalba esik össze, mely a vetületi tengelyre merőleges, s mely egyszersmind az élek valódi hosszával bir. Ezen ábrában egyszersmind a bezáró felületek egymáshoz hajlási szöge is valódi nagyságában látható.

Végre a 174^d ábrában van előállítva ezen test Mohsféle vetülete azon állásban, hol az egyik négyszöglapján nyugszik; s melynek egyszerű vetületei a 174^a ábrával egyeznek.

64. §.

Legyen ismét $m = 3$, de μ szinte $= 3$, vagyis mindegyik csúcs képzéséhez járuljon három 60 foknyi szög, akkor ezek összege már 180 fok lévén, a másiknemű sokszög szögei közül még csak is egy járulhat, azaz $r = 1$, bár mily értéket vesz is fel n . Hadjuk tehát egyelőre n -et határozatlanul, és helyettesítsük a 61. §. képleteibe a következő értékeket:

$$m = 3, n = n, \mu = 3, \text{ és } r = 1$$

lesz $A = 6n - 3n - 3(n - 2) = 6$; és ennél fogva:

$$E = \frac{12n}{6} = 2n; M = \frac{12n}{6} = 2n; N = \frac{12}{6} = 2; \text{ és } K = 4n$$

és mint ezen képletekből könnyű észrevenni, a test minden n -re nézve lehetséges. Az ide tartozó testek tehát egy egész sorozatot képeznek, melyek mindegyikénél van két tetszőleges n szög, és $2n$ háromszög. A két n szög egymással párhuzamos, de csúcsekenes; azután mindegyik felső csúcs összekötve kép-

zelendő az alsó ellentett oldal végpontjaival, úgy szinte mindegyik alsó csúcs összekötve a felső megfelelő oldal végpontjaival.

Ha a két *nszög* ugyanazon körbe képzeljük beírva, akkor *n* nagyobbításával az oldalak kisebbednek; — mint-hogy pedig a két *nszög* összeköttetési vonalai az *nszög* oldalai-
laival egyenlők, következik, hogy a két párhuzamos *nszög* mindinkább közeledik egymáshoz; s minthogy egyszersmind a két egymással közös él által összekötött háromszög hajlási szöge is folytonosan nagyobbodik, azért a test igyekszik henger alakot venni fel, melyet azonban csak akkor nyerhet el, midőn már az *nszög* oldalai végtelen kicsinyek; de ekkor a két, most már körre vált *nszög* is egybe esett.

Ha a két *nszög* helyett szinte két egyenoldalú háromszög vétetik, párhuzamos állásban, de csúcsellenesen, és az illető csúcsok az előbbi törvény szerint köttetnek össze, ered a rendes nyolczszög.

A 175-ik ábrában az ide tartozó legegyszerűbb test van vetítve, a melynél ugyanis $n = 4$; s ennél fogva tehát két négyszög és nyolcz háromszögből áll. A fekvetületben a két négyszög valódi nagyságában rajzoltatott csúcsellenesen; a függő-lapban pedig a vetület magassága az által határozottat meg, hogy előbb az $(abc, a'b'c')$ háromszög az (ab) oldala körül a feklapba fordítatott be. Fordítás közben a (c) pont egy körívet ír le dC sugárral, mely szinte de körül a feklapba van fektetve, hol is a C_1 pont magassága c felett, vagyis C_1c leendő a függvetületben a c' pont magassága a tengely felett. A 175^a ábra a hálót képviseli.

65. §.

Ha a részarányos test mindegyik csúcsának képzéséhez négy 60 foknyi szög járul, akkor a négyszögek szögeiből legfeljebb még egy jöhet hozzájuk, ez esetben tehát $m = 3$, $n = 4$, $\mu = 4$, és $r = 1$, miért is $A = 24 - 16 - 6 = 2$, és ennél fogva:

$$E = \frac{48}{2} = 24; \quad M = \frac{64}{2} = 32; \quad N = \frac{12}{2} = 6; \quad K = 60.$$

az ide tartozó test áll 6 négyszögből, és 32 háromszögből;

mely utóbbiak a négyszögeket koszorúként körül fogják, úgy hogy a négyszögek egymással érintkezésbe sehol sincsenek; ezen test szinte a rendes hatlap megcsontítása által ered; a hat négyszög síkja ugyanis, melyek közül kettő-kettő egymással párhuzamos, elegendőképp meghosszabbítva, egy rendes hatlapot fígnak bezárni. A rendes hatlap éleit lemetesző síkok azonban az élekkel nem párhuzamosak, s azért az eredt testenél is a két ellentett négyszög oldalai egymással szinte nem párhuzamosak, de csúcselesen sincsenek egymástól elfordulva; s minthogy azonfelül a test hajlási szögei is csak harmadfokú egyenletek által adhatók, azért ezen test vetítése is több nehézséggel jár, és csak is a hajlási szögek közelítő módoni szerkesztése által sikerül, — vagy pedig az által, hogy az egyes méretek mennyiségtanilag kiszámítatnak, és azután egy pontos lépték segítségével felrakatnak. A méretekre vonatkozó ezen adatokat alább közölni fogjuk, előbb azonban igyekszünk e testet, azok nélkülözésével, pusztán leírattal, előállítani.

Mindenekelőtt tehát a 176-ik ábrában van előállítva a részarányos 38-lap hálaja, hely gazdálkodás tekintetéből kicsinyített léptékben. Látszik ebből, miként egyesül minden tömör csúcs képzésére egy négyszög, és négy háromszög csúcsa. Annak, ki e sajátos testet bővebben kívánja tanulmányozni, okvetlen szükség lesz, hogy e hálót meglehetősen nagyítva, és nagy pontossággal papírpépre rajzolja, azt a kerülete szerint élesen kivágja, a hálóban magában előforduló éleket pedig félig bevágja, végre az összevágó éleket megragasztva a testet valóban előállítsa; minthogy a legszorgosabban készített rajzok sem képesek oly tiszta fogalmat nyújtani valamely testről, mint a jól készült minták.

Már ezen háló szorgos megtekintéséből könnyű észrevenni, hogy ilyen test *kettő* létezhet; az első ugyanis, melyet maga a jelen háló képvisel, s melyet *jobb*-nak nevezhetünk, és még egy második *bal*, mely úgy ered, ha a háló közepét a körül levő háromszögekkel együtt meghagyjuk, de az α négyszöget háromszögeivel együtt balra eltoljuk, míg annak éle a vonalazott háromszög élével összeesik; ugyanezt tévén természetesen a többi négyszögekkel is.

Megjegyezhetjük itt már előre is, hogy a hálóban vonalozott háromszögek síkjai a testen elegendőleg meghosszabbítva egy rendes nyolczlaphoz tartoznak, azok egymáshozí hajlási szögei tehát szinte a rendes nyolczlap hajlási szögeivel azonosak. — Ha azonban a *bal* testre megyünk át, akkor az *a* négyszög alatti háromszögek váltják fel a jelenleg vonalozottakat, és azok lesznek a rendes nyolczlap lapjai.

A mi már ezek után a 38-lap vetületét illeti, erre nézve mindenekelőtt a hajlási szögek lesznek meghatározandók. Ezen hajlási szögekre a következő észrevétel folytán jutunk. Képzeljük a 176-ik ábra alatti hálóból a testet már alakítva, és úgy állítva, hogy az egyik négyszög *O* csúcsa egyszersmind a test legmagasabb pontját képezze; és vétessék egyuttal az egyenlő élek hossza egységtül; akkor az *A*, *B*, *C*, *D* és *E* pontok egy síkban fognak feküdni, és egy oly ötszög csúcsaivá válnak, melyben az egyik *AE* oldal egyenlő a négyszög átlójával, a többi oldalak pedig ugyanazon négyszög oldalával azonosak, azonfelül pedig a *B*, *C* és *D*-nél képzett szögek egymás közt egyenlők, végre mind az öt pont egy kör kerületén fekszik; mely adatok már elegendők a kérdéses ötszög legalább közelítő szerkesztésére.

Ugyanis a 177-ik ábrában szerkesztetik az *AO'E* fél rendes négyszög, és az átló *G* középpontjában a *GC* merőleges; — az *A* és *E* végpontokból az *AO'* négyszög oldalával leíratnak a *Bx* és *Dy* körívek, azután felkerestetik a *GC* merőlegesen egy oly tulajdonságú *O* pont, hogy abból *OA* = *OE* sugárral leírván egy körivet, és azt *C* középpontból a négyszög oldalával átmetszván, a metszési pontok épen azon *B* és *D* pontokkal essenek egybe, melyekben az *O* pontból leírt kör a *Bx* és *Dy* íveket átmetszi; — vagy más szóval: kerestetik egy kör, melybe egy adott négyszög átlója *AE* egyszer, és ugyanazon négyszög oldala négyszer vihető be húrként.

Ha most a nyert ötszög csúcsait az *O* középponttal összekötjük, megnyerjük a test egyik csúcsa által képzett gúla fekvetületét, s minthogy az élek valódi hossza szinte ismeretes, azért az egyes lapok hajlási szöge is könnyen meg lesz határozható. Nevezetesen a *GO''C* háromszögben, melynek *GO''* oldala a fél négyszög átló, a másik *CO''* oldala pedig a

négyszög oldala, az O'' -néli ε szög megadja azon szög valódi nagyságát, mely alatt a CO él hajlik a négyszög síkjához; úgy szinte a GHD háromszögben a H -nál δ szög a négyszög és háromszög közötti hajlási szöget adja meg, ha GH a négyszög oldalának felével, DH pedig azon egyenoldalú háromszög magasságával egyenlő, mely az élekből képeztetik; végre a BKD háromszögben a K -nál γ szög a két háromszög hajlási szögét adja, ha a befogó $BK=KD$ oldalak a háromszögek magasságai.

Ezek után már könnyű leend a 38-lap vetületeit is előállítani. E végre a 178-ik ábrában rajzoltatik egy rendes négyszög aoe , melynek oldala egyenlő a szerkesztendő test élével, s mely tehát egységtől szolgál. A jelen ábrában a négyszög úgy van felvéve, hogy annak egyik átlója a vetületi tengelylyel legyen párhuzamos. Ezen négyszög oldalaihoz szerkesztetnek az abo , ode stb. háromszögek, melyek valódi nagysága az egységgel leirt egyenoldalú háromszög, s melyek δ szög alatt vannak a négyszög síkjához lefelé hajolva; miért a b pont meghatározására csak a háromszög UB magasságával kell l középpontból leírni a BB' ívet, úgy hogy a BlB szög egyenlő legyen $180-\delta$ -val; ezután meggosszabbítjuk a négyszög átlóit, és ezen hosszabbításokra felvisszük az élek vetületeit, ha azok ε szög alatt vannak lefelé hajolva; vagy is az e középpontból leiratik az éllel a CC' ív úgy, hogy a CeC' szög $180-\varepsilon$ legyen. A függvetületben a b' és d' pontok mélysége a vízirányos $a'o'e'$ alatt egyenlő bB' -el, a c' , k' pontok mélysége pedig annyi mint kC' .

Szerkesztve lévén így a felső négyszög, az azt bezáró háromszögeivel együtt, következik a négy oldal négyszög szerkesztése. Szükség lesz itt azonban a következő észrevételt tenni. Az eddigi vetületek ugyanis érvényesek, akár a jobb akár a bal 38-lapot kívánjuk előállítani; ezentúl azonban a két test vetülete egymástól eltér. A különbség ugyanis abban áll, hogy most az oldal négyszöget a cd , vagy a vele hasonló dk élhez illesztjük-e? A jelen ábrában a hálónak megfelelő jobb test lévén vetítve, a négyszög is a jobb oldalon levő dk oldalhoz illesztetett. Ezen négyszög a feklapra merőleges lévén, annak egész vetülete a dk vonallal esik össze. Az alsó két pontjának meghatározására képzeljük ezen négyszög

síkját fekszdéje körül a feklapba befektetve, akkor a négyszög valódi állása a $k''d''m''n''$ négyszöggel esik egybe, a melyet tehát csak a kd élre, és illetőleg annak meghosszabbítására kell visszavetíteni m -be, és n -be; a függvetületben az n' pont mélysége a vizirányos $a'o'e'$ alatt egyenlő nn'' -el, az m' ponté pedig annyi mint mm'' .

Minthogy pedig a test alsó része, eltekintve az elfordítástól, a felső részszel azonos, a nyert (m, m') és (n, n') pontok pedig már az alsó részhez tartoznak; azért a vetület többi része a méretek részarányos áttétele által könnyen kiegészíthető.

66. §.

Elő lévén e szerint állítva a 38-lap egyik állásának vetülete, ebből már a test bármely más állásban is egyszerű forgatás által könnyen vetíthető. Legnevezetesebb azon állás, mely a 179-ik ábrában van képviselve, melynél ugyanis mind a két vetület azonos időmot képez. Ha ugyanis az átteljes négyszögek középpontjait összekötjük, ered a 38-lapnak három fő tengelye, mely körül a test lapjai részarányosan vannak elhelyezve; a jelen állásban pedig egyike ezen tengelyeknek a feklapra, a másika pedig a függlapra áll merőlegesen. Ezen vetületek mindegyike megegyez a 178-ik ábra fekvetületével, a melynél már is az egyik tengely a feklapra merőleges; a testet tehát csak ezen tengelye körül még addig kell forgatni, míg egy másik tengelye a függlapra nem lesz merőleges, vagy a mi mindegy, míg a $kmdn$ négyszög síkja a vetületi tengelylyel nem párhuzamos. Ezen vetületek egyszerűsmind a test további tanulmányozására is legalkalmasabbak; miért is a test elméleti meghatározására szinte ezen vetületet használjuk a 180-ik ábrában, hol is csak a fekvetület van tekintetbe véve.

67. §.

Az egyes méretek mennyiségtani meghatározására nézve a 177-ik ábrában $AB = BC = CD = DE = 1$; AE pedig $= \sqrt{2}$. Nevezzük az egyenlő OAB , ABO , OBC , BCO , OCD ,

CDO , ODE és DEO szögeket α -val, az OAG és OEG szögeket pedig β -val, akkor

$$4\alpha + \beta = 270 \dots 1)$$

az ABC egyenszarú háromszögből

$$AC = 2 \sin \alpha \dots 2)$$

miért is a GAC háromszögből

$$\frac{\frac{1}{2}\sqrt{2}}{2 \sin \alpha} = \cos CAG = \cos(\beta + 2\alpha - 90) = \sin(2\alpha + \beta) \dots 3)$$

és tekintetbe vévén az 1) alatti képletet:

$$1 = 2\sqrt{2} \sin \alpha \sin(270 - 2\alpha) = -2\sqrt{2} \sin \alpha \cos 2\alpha \dots 4)$$

és a kettős szög pötkeblét kifejtve, és rendezve:

$$\sin^3 \alpha - \frac{1}{4} \sin \alpha - \frac{\sqrt{2}}{8} = 0 \dots 5)$$

mely egyenletben tévén $\sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$ ered:

$$z^3 - 4z - 4 = 0 \dots 6)$$

ezen egyenletet feloldván, találhatik a z valós gyöke

$$z = 2.3829778 \dots$$

$$\text{és } \sin \alpha = \frac{2.3829778 \cdot \sqrt{2}}{4}$$

$$\text{tehát } \alpha = 57^\circ 24' 22''$$

$$\text{és } \beta = 270 - 4\alpha = 40^\circ 22' 32''$$

A nyert α és β szögek segítségével már a többi adatok meghatározása eléggé egyszerű. Így a GHD háromszögből, melyben $GH = \frac{1}{2}$, és $DH = \frac{1}{2}\sqrt{3}$ lesz

$$DG = \sqrt{1 - \frac{1}{2}\sqrt{3} \cos \delta}$$

a GED háromszögből pedig:

$$DG = \sqrt{\frac{3}{2} - \sqrt{2} \cos(\alpha + \beta)}$$

mely két érték összehasonlításából ered:

$$\cos \delta = -\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{2}{3}\sqrt{6} \cos(\alpha + \beta) = -0.798355 \dots 7)$$

tehát a megfelelő szög

$$\delta = 142^\circ 58' 23''$$

Jegyzés. A 7) alatti képlet szerint $\cos \delta$ igen közel annyi mint $-\frac{1}{2}$; tehát $\sin \delta = \text{közel } \frac{3}{4}$; és $\tan \delta = \text{közel } -\frac{3}{4}$; ezen értékek szerkesztésre nézve igen kényelmesek, és azokat használva a δ szög ugyan kellőnél nagyobb, de a hiba csak $0^\circ 5' 36''$ -et tévén, ezen hiba a leirati rajzoknál elenyésző.

Továbbá a BKD háromszögből, melynek BD oldala $= 2 \sin \alpha$, a $BK = KD$ oldala pedig az egyenoldalú háromszög magassága $\frac{1}{2}\sqrt{3}$, következik

$$\sin \frac{1}{2}\gamma = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \alpha$$

$$\text{és innét: } \gamma = 153^{\circ} 14' 5''$$

hol γ azon szöget jelenti, mely alatt két közös élű háromszög síkja hajlik egymáshoz.

Végre a $CO''G$ háromszögben CO'' egyenlő az egységgel, GO'' mint a négyszög fél átlója $= \frac{1}{2}\sqrt{2}$, a CG oldal pedig a CAG háromszögből

$$CG = \sqrt{4 \sin^2 \alpha - \frac{1}{2}}$$

miért is a $CO''G = \varepsilon$ szög meghatározására álland:

$$2 - 4 \sin^2 \alpha = \sqrt{2} \cdot \cos \varepsilon$$

$$\text{vagy } \cos \varepsilon = \sqrt{2} \cdot \cos 2\alpha = 0.5934687$$

$$\text{tehát } \varepsilon = 126^{\circ} 24' 12''$$

hol ε azon szöget jelenti, mely alatt a négyszög átlója irányában fekvő él hajlik a négyszög síkjához.

Meg lehet itt is jegyezni, hogy a leirati szerkesztéseknél, kivált kisebb mértékben a $\cos \varepsilon$ pontos értéke helyett lehet az igen közel álló $\cos \varepsilon = \frac{3}{5}$ értéket használni.

68. §.

Ha a részarányos harmincznyolczlap mindegyik csúcspontját összekötjük a körülírható gömb középpontjával, akkor az egész test csupa gúlákra oszlik, és pedig 6 olyanra, melyek alapja rendes négyszög, melyeknek alaphajlási szögeik $= 66^{\circ} 21' 20''$, magasságuk pedig $h_1 = 1.142$; és 32 olyan gúlára, melyek alapja rendes háromszög, alaphajlási szögük $= 76^{\circ} 37' 20''$, magasságuk pedig $h_2 = 1.213$. — Mind a kétféle gúlaoldal élei egyenlők egymás között, és egyenlők a körülírt gömb sugarával, mely is $R = 1.344$.

Ezen adatokból azután könnyen következik az egész test köbtartalma $K = 7.886$ köbegység, és az egész oldalfeület $F = 19.856$ négyszög egység.

Ezen adatokhoz sorozható még, (177 ábra), hogy a BOA szög valódi nagysága $= 60^{\circ}$; a COA valódi nagysága $= 2\alpha$

$= 114^{\circ} 48' 44''$; a DOA szög valódi nagysága $= 133^{\circ} 44' 26.5''$; végre az EOA szög valódi nagysága $= 90^{\circ}$.

69. §.

A mi végre a vetületre vonatkozó adatokat illeti, ezek meghatározására szolgál a 180-ik ábra; mely is a 38-lap fekvetületét állítja elő, ha egyszermind a négyszögek síkjait addig képzeljük meghosszítva, míg azok egymást egy rendes hatlapban metszik. $GCMN$ a körülírt hatlap felső és alsó négyszöge, $gcmn$ a 38-lap felső, $dfqp$ pedig az alsó négyszöge. Azon acg szög, mely alatt a 38-lap négyszögének oldala, a hatlap illető négyszögének oldalához hajlik

$$acg = 16^{\circ} 28' 3.5''$$

és minthogy az alsó négyszög a hatlap négyszöge oldalához szinte ezen szög alatt hajlik, de az ellenkező oldalra, azért azon szög mely alatt a felső és alsó négyszög egymástól irányra nézve eltér ezen szög kettőzete, vagyis $god = 32^{\circ} 56' 7''$.

Az elősoroltakon kívül még megemlítendő, hogy az agh és a vele hasonfekvési háromszögek, a melyeknek ugyanis a négyszögekkel közös élök nincsen, egy oly rendes nyolczlaphoz tartoznak, a melynek tengelye a körülírt hatlap tengelyeivel összeesnek; vagyis az említett nyolcz háromszög síkjai elegendőleg meghosszabbítva egymást egy rendes nyolczlapban metszik. Az agh háromszög oldalai azonban a hozzátartozó nyolczlap háromszög oldaláival nem párhuzamosak, hanem azokhoz akként hajolnak, hogy az ag oldal meghosszítva a nyolczlap O csúcsára, a gh oldal meghosszabbítása a k csúcsba, a ha oldal meghosszítása pedig a nyolczlap i csúcsára találjon.

Ha azonban az agr , vagy a vele hasonfekvési háromszögeket vesszük tekintetbe, de csak a 38-lap felső oldalán, akkor ezek szinte egy rendes nyolczlap felső feléhez tartoznak, melyeknek azonban a megfelelő alsó része egészen hiányzik, és ezen hiányzó rész akkor áll elő, ha a jobb testről átmegyünk a balra, ez esetben azután az előbb említett ahg féle háromszögből tűnik el az alsó négy.

Az ahg háromszögekhez tartozó rendes nyolczlap fekvetülete $k i s t o$ által képviseltetik, míg az agr háromszögekhez tartozó nyolczlap fekvetülete $l u w v o$. E két nyolczlap O tengelye

közös, de a ks tengely lw -be megy át, ha a jobb testről a balra megyünk át; az elfordulási kol szög épen akkora, mint a mely szög alatt hajlik a felső és alsó négyszög oldala egymáshoz, vagyis:

$$kol = 32^{\circ} 56' 7''.$$

Ezen nyolczlapok éle, ha a 38-lap éle vétetik egységül

$$kt = 2.972106$$

annak féltengelye pedig $ko = 2.1016$

Ide tartozhatnak még azon adatok is, melyek a vetületre vonatkoznak. Ugyanis a vetület körül irt $GCMN$ négyszögbe egy rostozat van befektetve párhuzamosan az oldalakkal, és a test minden csúcsának vetülete csak is ezen rostozat átmetszé-seire esik; ezek rostozat méretei:

$$ae = 0.521393$$

$$ed = 0.283476$$

$$db = 0.337751$$

$$\overline{1.142620}$$

tehát a körülirt rendes hatlap oldala $GC = 2.285240$.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára

70. §.

Szekélyudvarhely

Tekintetbe vettük eddig mind azon testeket, melyeknél $m = 3$, és $n = 4$, vagyis, melyek csupa rendes három és négyszögekből alakíthatók. Az utolsó esetnél ugyanis, melyet tárgyaltunk, μ egyenlő volt 4-el, vagyis egy csúcs képzéséhez 4 háromszögcsúcs járult, és μ ennél nagyobb nem is lehet; mert ha $\mu = 5$, vagyis ha a test csúcsának képzésére 5 háromszögcsúcs fordítatik, akkor ezek összege már maga 300 fokot tesz, ehhez tehát még egy négyszög csúcsot adván, a 360 fokot túlhaladja, és így a testet lehetlenné teszi.

Lássuk tehát még, melyek azon testek, a melyek rendes három, és ötszögekből készülhetnek. Ezeknél tehát $m = 3$ és $n = 5$; miért is a 61. §. szerint $A = 30 - 5\mu - 9\nu$; és $E = \frac{60}{A}$;

minthogy pedig E -nek, vagyis a test csúcsai számának egész számnak kell lenni, minthogy továbbá az egy csúcsban összefutó szögek összegének 360 foknál kisebbnek kell lenni, könnyen következik, hogy három és ötszögekből mindössze csak is három különböző test alakítható, ugyanis

a) ha $\mu = 2$, és $r = 2$, akkor:

$$A = 2; E = 30; M = \frac{4\mu n}{A} = 20; \text{ és } N = \frac{4rm}{A} = 12$$

vagy is a test áll 12 ötszögből, és 20 háromszögből.

b) ha $\mu = 3$, és $r = 1$, akkor:

$$A = 6; E = 10; M = \frac{4\mu n}{A} = 10, \text{ és } N = \frac{4rm}{A} = 2,$$

vagy is a test áll 2 ötszögből, és 10 háromszögből.

és c) ha $\mu = 4$, és $r = 1$, akkor:

$$A = 1; E = 60; M = \frac{4\mu n}{A} = 80; \text{ és } N = \frac{4rm}{A} = 12$$

vagy is a test áll 12 ötszögből, és 80 háromszögből.

Ezek közül azonban a középső a 64-ik §. alatti sorozathoz tartozván, itt kiesik, úgy hogy csak az első és utolsó lesz külön tárgyalandó.

71. §.

Az előbbi §. a) alatti pontjához tartozó test képeztetik 12 ötszögből és 20 háromszögből úgy, hogy minden csúcs képzéséhez két ötszög és két háromszög csúcs váltakozva járul. Eredhez a test a rendes 12-lapból, ha annak csúcsai aképen vágatnak le, hogy a levágó sík az élék középpontján menjen keresztül, az által a tizenkétlap 20 csúcsa helyébe ugyanannyi rendes háromszög áll, a régi 12 ötszög helyett pedig új 12 ötszög áll elé, a melyek amazokból erednek, ha az oldalak középpontjait összekötjük. De eredhet másodszor a test a rendes húszlapból is, ha annak tizenkét csúcsa metszetik le, az élék középpontjain keresztül menő síkok által; akkor a tizenkét csúcs helyébe áll ugyanannyi rendes ötszög, a régi húsz háromszög helyébe pedig új húsz háromszög lép, melyek oldalai az eredetieknek épen fele.

Ezen test rokon a 63-ik §-ben előadottal, a mely is a rendes nyolczlapból, vagy a rendes hatlapból épen azon törvény szerint alakul, mint ez a rendes tizenkétlapból, vagy a rendes húszlapból.

A test hálója a 181-ik ábrában van előállítva kisebbített mértékben.

A mi a test vetületét illeti, az az említettek folytán igen egyszerűen előállítható az által, ha előbb vetítjük a rendes tizenkétlapot, vagy a rendes húszlapot, azután minden egyes él vetületét felezzük, és a nyert felező pontokat a fentebbi törvény szerint kellően összekötjük.

A 182-ik ábrában van vetítve ezen test oly állásában, hogy a függvetületben a látható részek a nem láthatókat épen elfedjék. — Ezen függvetület különös figyelmet érdemel azért, mert azt megtartván, és a fekvetületet addig fordítván el, míg a vetületi tengely az $a'b'$ tengelyre nem merőleges, előáll a test azon állása, a melynél mind a két vetület azonos alakot mutat, bár egymáshoz 90 fok alatt elfordúlva. A 183-ik ábrában a test a Mohsféle vetületbe van áttéve.

A test egyes méretei, úgy szinte a hajlási szögek meghatározását, mint hasznos gyakorlatot a szorgalmas kezdőre bizuk, miután azok a rendes tizenkétlapból, vagy a rendes húszlapból elég egyszerűen következnek.

72. §.

A 70-dik cikkben tárgyalt c) alatti test tizenkét rendes ötszög és 80 rendes háromszög által képeztetik, mely utóbbiak az ötszögeket koszorúként körülfogják, úgy hogy az ötszögek egymással közvetlen sehol sem érintkeznek. Ezen test párját képezi annak, melyet a 65—69 §§-ben elég terjedelmesen tárgyaltunk; ezen test ugyanis épen azon törvény szerint ered a rendes tizenkétlapból, vagy a rendes húszlapból, mint amaz eredt a rendes hatlapból vagy a rendes nyolczlapból. — A rendes tizenkétlap szembeötlő, mint amott a rendes hatlap; a rendes húszlap oldalaira azonban csak elmélgedés által juthatni, mint amott a rendes nyolczlapéra.

A 184-ik ábra a test hálójának felét állítja elő, a másik fele ezzel azonos lévén. Látjuk ebből, hogy minden csúcs képzéséhez 4 háromszög és egy ötszögcsúcs járul. A középen rajzolt ötszög mindegyik oldalához 3 háromszög rajzoltatott, melyek középsője az ötszöggel közös oldallal bír; a másik két háromszög egyikéhez illesztetik ismét az ötszög. Minthogy pedig épen szabadságunkban van ezen háromszögek bármelyikéhez illeszteni az ötszöget, következik, hogy két ily test léte-

zik, ugyanis a *bal*, mely a jelen háló által képviseltetik, és a *jobb*, mely eredne, ha az ötszögeket a jobb felőli háromszögek fölé szerkesztenők, a melyek jelenleg a hálóban vonalazva vannak. Ezen háromszögek, melyeknek az ötszögekkel közös élök nincsen, a melyek három csúcsa *három* különböző ötszög csúcsaival egyesülnek, és a melyek száma az egész testen hús, ezen háromszögek egy rendes húslaphoz tartoznak, mely ered, ha ezen háromszögek síkjai egész a metszésig meghosszabbítatnak.

73. §.

Hogy ezen test vetületeit képesek lehessünk előállítani, mindenek előtt a hajlási szögeket kell meghatároznunk. Erre nézve képzeljük a test azon csúcsát már megalakítva, mely a hálóban *abcde* által jelöltetett ki, akkor ered egy ötoldalú gúla, melynek csúcsát *O* fogja képezni, és a melynek alapja egy oly körbe írható ötszög, melynek négy oldalát egy rendes ötszög oldalai, az ötödik oldalát pedig ugyanezen ötszög átlója képezi; vagy is egy oly körbe írható ötszög, melynek négy oldala egyenlő az egységgel, az ötödik oldal pedig $= \frac{\sqrt{5}+1}{2}$. Ezen ötszög csak is kísérlet útján szerkeszthető azon elvek szerint, a melyeket a 65-ik cikkben (177 ábrában) követtünk. Ugyanis a 185-ik ábrában szerkesztetik az *AOE* rendes ötszög oly nagyságban, hogy annak oldala az egységgel legyen egyenlő. Feleztetik azután az *AE* átló a *GC* merőleges által, és a két *A* és *E* végpontokból leiratnak az egység sugárral a *Bx* és *Dy* ívek. Most már egy kísérlet által feltalálándó *O* középpontból *OA* sugárral egy oly kör iratik le, hogy a *CB* húr az *AB*-vel legyen egyenlő. Az így nyert ötszögnek *O* középpontját a csúcsokkal összekötve, megnyerjük a kérdéses ötoldalú gúla fekvületét.

Ugyanezen ötszögből most már a test minden hajlási szögei is könnyen meghatározhatók; mert először is szerkesztetik a *GO''C* háromszög, a melynek egyik oldalát képzi az ötszög *GC* magassága, a második *CO''* oldal az egység, a harmadik *GO''* oldal pedig annyi mint az ötszögből vett *GQ*; ezen háromszögnek azután *O''*-nél a szöge, azon hajlási szöget

adja, mely alatt a CO él hajlik az ötszög síkjához, hol még megjegyezhető, hogy az O pontban GC -re emelt merőlegesnek szinte az O'' csúcson kell keresztül menni, minthogy OO'' nem egyéb, mint a kérdéses gúla magassága.

Az ekkép meghatározott ε szög már maga elegendő a vetület előállítására, azonban célszerű lesz még kimutatni, miképen lehet még a többi hajlási szögeket szinte meghatározni. E végre szerkesztetik a BKD egyenszárú háromszög, melynek egyik oldalát képzi az ötszög BD átlója, a másik két oldalát pedig az egyenoldalú háromszög magassága $= \frac{1}{2} \sqrt{3}$, ezen háromszög K -nál γ szöge azon szöget adja meg, mely alatt a test két közös éllel bíró háromszöge hajlik egymáshoz. Végre szerkeszthető egy háromél, melynek egyik oldalát képzi az $AED = \alpha + \beta$ szög, a másikat a GEO valódi nagysága $= 36^\circ$, a harmadikát pedig a DOE szög valódi nagysága $= 60^\circ$; ezen háromélben azután az $\alpha + \beta$ -nak ellentett δ szög képezni fogja az ötszög és háromszög közti hajlási szöget. A talált γ és δ szögek azonban a vetület meghatározásánál mellőzhetők.

Haáz Rezső Művelődési Tudományos Könyvtára 74. §. Székelyudvarhely

Az előbbi §-ben szerkesztésileg meghatározott adatok szinte az 185-ik ábra alatti ötszögből elméletileg is lehozhatók tudván, hogy az ötszög rövidebb oldalai az egységgel egyenlők, a hosszabb oldal pedig, egy rendes ötszög átlója, vagyis $\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$.

Ugyanis az EOD egyenszárú háromszögből, az E -nél szöget α -val jelölván ered

$$1 = 2 \cdot OE \cdot \cos \alpha$$

az OGE háromszögből pedig, jelölván az E nél szöget β -val:

$$\sqrt{5} + 1 = 4 \cdot OE \cdot \cos \beta$$

a két egyenlet összehasonlításából tehát:

$$\frac{\sqrt{5} + 1}{2} \cdot \cos \alpha = \cos \beta$$

azonfelül pedig $4\alpha + \beta = 270^\circ$

tehát $\frac{\sqrt{5} + 1}{2} \cdot \cos \alpha = -\sin 4\alpha$

$$= -4 \sin \alpha \cos \alpha (1 - 2 \sin^2 \alpha)$$

vagy $\sin^3 \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha - \frac{\sqrt{5}+1}{16} = 0$

és téven $\sin \alpha = \frac{z}{4}$, lesz még

$$z^3 - 8z - 12.944272 = 0$$

mely egyenletet feloldva, következik:

$$z = 3.431123, \text{ és ebből } \sin \alpha = 0.85778$$

a megfelelő szögek tehát:

$$\alpha = 59^\circ 4' 5''$$

$$\text{és } \beta = 33^\circ 47' 42.6''$$

Ezen így nyert adatok segítségével a hajlási szögek most már könnyen kiszámíthatók; mert az ACG háromszögből

$$CG = \sqrt{4 \sin^2 \alpha - \left(\frac{\sqrt{5}+1}{4} \right)^2}$$

a $CO''G$ háromszögből pedig, melyben

$$CO'' = 1 \text{ és } GO'' = GO = \sin 36 = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$$

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára

ered: $CG = \sqrt{1 + \frac{10-2\sqrt{5}}{16} - \frac{2\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4} \cdot \cos \varepsilon}$

tehát a két érték összehasonlításából:

$$2 - 4 \sin^2 \alpha = \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{2} \cdot \cos \varepsilon$$

és innét $\cos \varepsilon = \frac{4 \cos 2\alpha}{\sqrt{10-2\sqrt{5}}} = \frac{\cos 2\alpha}{\sin 36}$

kiszámítván ezen képlet szerint ε értékét, leend:

$$\varepsilon = 143^\circ 21' 4''$$

A két háromszög közötti γ hajlási szög egyszerűen következik a BKD egyenszerű háromszögből, melyben

$$BK = DK = \frac{1}{2}\sqrt{3}, \text{ és } BD = 2 \sin \alpha$$

leend ugyanis $\sin \alpha = \frac{1}{2}\sqrt{3} \sin \frac{1}{2}\gamma$

és innét $\sin \frac{1}{2}\gamma = \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin \alpha$

tehát $\frac{1}{2}\gamma = 82^\circ 5' 15.1''$ és $\gamma = 164^\circ 10' 30.2''$

Végre azon δ szög meghatározása, mely az ötszögek és háromszögek közötti hajlást képi, az $ODGE$ háromlélnek

megfelelő gömbháromszögből ered, a melyben adva van mind a három oldal, ugyanis

$$\alpha + \beta = 92^\circ 47' 42''$$

$$GEO = 36^\circ \text{ és } DEO = 60^\circ$$

miért is δ az $\alpha + \beta$ oldalnak ellentett szöge lévén, lesz

$$\sin \frac{1}{2} \delta = \sqrt{\frac{\sin (s-b) \sin (s-c)}{\sin b \sin c}}$$

$$\text{hol } s = \frac{\alpha + \beta + 36 + 60}{2} = 94^\circ 23' 51''$$

ezen képlet kiszámítása után azután következik :

$$\delta = 152^\circ 55' 49''$$

75. §.

Ezek után már a részarányos 92-lap vetületeit könnyű lesz előállítani, és pedig először is azon legegyszerűbb állásban, melyben az egyik ötszög lapján nyugszik. Erre nézve ugyanis csak a 185-ik ábra alatti ötszöget kell az AE forgási tengely körül addig fordítani, míg az AOE háromszög az eredeti AQE állásába jön, mi által a rendes ötszög valódi nagyságában állandó elő. Ezen forgás alkalmával azután a B , C , és D pontok a forgási AE tengelyre merőleges köríveket írnak le, melyeknek megfelelő középponti szögek a CGO'' hajlási szöggel egyenlők. A forgatás után tehát a B , C , és D pontok állása a rendes ötszöghöz tökéletesen meg van határozva, mint ez a 186-ik ábrában látható; az ötszögon körül fekvő többi hason pontok pedig központi körök kerületén fekszenek egymástól egyenlő távolságokban. Ugyanezen forgásból átvehetők egyszersmind az illető pontok magasságai az ötszög síkja felett, melyek azután a függvetületbe felvihetők.

Most azután a cd , és a hasonfekvő élekhez illesztendő ismét a rendes ötszög; miután azonban cd állása már meg van határozva, azonfelül a hozzá illesztendő ötszög síkjának fekhajlási szöge szinte ismeretes, azért a jelen feladat azonos az I. Szakasz 52-ik §-ben tárgyalttal, ugyanis adva van egy egyenes vonal, azon keresztül vezetendő egy sík, mely a feklappal adott hajlással birjon. A mi ezen fekhajlási szöget illeti, arra nézve csak azt kell megjegyeznünk, hogy az ötszög síkja

a test körül írható rendes tizenkétlap síkjával azonos, miért is csak ennek hajlási szögét kell tekintetbe venni. De a rendes tizenkétlap hajlási szögére nézve találatott, hogy ennek pótkeble $= -\frac{1}{\sqrt{5}}$, vagy a mi szerkesztésre kényelmesebb, hogy annak érintője $= -2$; miután pedig a feklap a felső ötszög síkjával párhuzamos, azért a keresett, és cd vonalon keresztül menő sík a feklaphoz oly szög alatt fog hajolni, melynek érintője $= 2$. Az ide vonatkozó szerkezet a 187-ik ábrában külön van előállítva, mely is figyelembe véve az idézett cikk értelmét minden további magyarázat nélkül is elég érthető leendő. Az ekkép nyert szerkezetből azután a 186-ik ábrába az ötszög fekvetülete egészen átvehető, a függvetületből pedig csak az illető pontok magasságai.

Az így nyert ötszögek középpontjai a körülírható rendes tizenkétlap ötszögei középpontjaival összeesvén, azok összeköttetése egy rendes ötszöget képezend. De a rendes tizenkétlap alsó ötszögeinél szinte egy ily ötszög áll elő, mely az előbbivel csúcseellenes, miért is az alsó ötszögek középpontjai most már a rajzba szinte bejegyezhetők, ezen középpontokból pedig a test részarányosságánál fogva az egész alsó ötszögek berajzolhatók a felsőkkel ellentétes irányban ugyan, különben azonosan. Melyek meglévén a test többi részeinek kiegészítése is egyszerű áttétel útján könnyen eszközölhető.

76. §.

Ha a $cdhgf$ és a hasonfekvő ötszögek síkjai addig hosszabbítanak, míg a felső ötszög síkját átmetszik, akkor a metszési vonalak egy rendes ötszöget képeznek, mely a körülírható rendes tizenkétlap felső ötszöge; a melyből azután az egész tizenkétlap is könnyen szerkeszthető. Ha már most a rendes tizenkétlapot a benne fekvő 92-lappal együtt egy függélyes tengely körül addig forgatjuk, míg azon helyzetbe jő, melyet a 162-ik ábrában állítottunk elő, a melyben ugyanis a tizenkétlap előli síkjai a hátulsókat épen elfedik, akkor a függvetület a legegyszerűbbé válik. A 163-ik ábrában láttuk egyszersmind, hogy az előbbi függvetülettel mind a két vetület azonosává válik, ha a test úgy állítatik, hogy annak fő tengelyei (jegeztani

tengelyei) a vetületi síkokra merőlegesek legyenek; azért a 188-ik ábrában még czélszerűnek láttuk a 92-lapot ezen nevezetes állásában szinte előállítani.

Ezen vetületekre nézve meg lehet jegyezni, hogy megrajzoltatván a rendes tizenkétlap vetületének kerete, abba egy rostozat rajzoltatik bele, melynek távolai a 186-ik ábra függvetületéből vannak átvéve, és a melynek vonalai a hosszabb szélvonalakkal párhuzamosak, a melyek tehát egymást a tizenkétlap hajlási szögei alatt metszik, a 92-lap minden csúcsának vetületei azután ezen rostozat metszéseiire esnek.

Egy második igen nevezetes körülmény pedig abban áll, hogy a tizenkétlap ötszögének meghúзва mind az öt átlóját, ezek a 92-lap ötszögéhez tartozó csúcsokon mennek keresztül.

77. §.

Következnek azon részarányos testek, melyek háromszög, és hatszögekből, vagy háromszög és hétszögekből és így tovább alakíthatók. Mind ezen testeket azonban már most egybe foglalhatjuk, előre bocsájtván a következő elméletet.

Ha egy részarányos test csúcsának alakításához csupán három szög járul, akkor ezek közül kettő egyenlő, a harmadik különböző tartozik lenni, miután feltétel szerint ezen testek kétféle rendes sokszögekből képeztetnek. *Ezen szögek közül azonban az, mely kétszer fordul elő, csak is páros oldalú sokszöghöz tartozhat.* Ha ugyanis a 189-ik ábrában kifejtve képzeljük ezen testek hálót, akkor azon sokszög oldalai mellé, mely kétszer fordul elő, és mely a betűvel van jelölve, szerkesztendő rendre egy magával egyenlő a , és különböző b ; mi csak úgy lehetséges, ha az a sokszögnek oldala páros, mint a 189^a-ban, mert különben egy oly csúcsra jutunk, mely már nem két a és egy b szögből, hanem három a szögből alakul, mint a 189^b-bén, mi a részarányos testek főfeltételével ellenkezik, mely szerint minden csúcs ugyanazon törvény szerint alakítandó. Következik tehát, hogy oly forma testek, melyeknél egy csúcs képzéséhez két egyenlő és egy harmadik különböző sokszög csúcsa járul, csak úgy lehetséges, ha az egyenlő szögek páros oldalú sokszöghöz tartoznak.

78. §.

Ha tehát egy test csupa háromszögekből, és azonfelül még n -szögekből úgy képeztetik, hogy minden csúcs képzéséhez két háromszög járuljon, akkor az előbbi cikk értelmé szerint az n -szögekből egy szög nem járulhat, abból legalább is kettő kívántatván meg. De a két háromszög szögeinek összege 120 fok, ha tehát csak hatszögeket veszünk is még hozzájuk, és ezekből is csak kettőt, akkor már a szögek összege az egész csúcsnál 360 fokot képez; mely összeg még nagyobb lesz, ha a hatszögek helyett több oldalú sokszögeket használunk. — Ezekből tehát következik, hogy minden még hátralevő lehetséges részarányos testnél, melyben háromszög fordul elő, a csúcs képzéséhez csakis egy háromszög járulhat, vagy három; az utóbbi eset azonban, mely minden tetszőleges n -szögnél lehetséges, már a 64 §-ben tárgyalatott, és így a még hátralevő esetekben, ha $m = 3$, akkor csak $\mu = 1$ lehetséges. Minthogy pedig ismét csak hatszögeket vévén tekintetbe, három csúcs összege már maga 360 fokot képez, következik továbbá, hogy a háromszög képzéséhez az n -szögekből csak kettő járulhat, vagy is minden (ötön felőli) tetszőleges n -szögnél $r = 2$. A hátralevő esetekben tehát

$$m = 3, \mu = 1, n \text{ még határozatlan, de } r = 2.$$

Ha tehát ezen adatok mellett figyelembe vesszük a 61. §. képleteit, akkor mindenké előtt

$$\begin{aligned} A &= 6n - n - 6(n - 2) \\ &= 12 - n \end{aligned}$$

minthogy pedig A nemleges nem lehet, mert különben a test is nemleges számú csúcsokkal birna, következik, hogy n legfeljebb 11 lehet. Minthogy azonban n az előbbi cikk szerint páratlan szinte nem lehet, azért n -re nézve összesen csak háromféle értéket nyerünk, úgymint:

$$\begin{array}{ll} a) & n = 6 \quad \text{hol azután } A = 6 \\ b) & n = 8 \quad \text{„ „ } A = 4 \\ \text{és } c) & n = 10 \quad \text{„ „ } A = 2 \end{array}$$

79. §.

A talált három test mindegyike, ugyanazon törvény szerint ered a rendes testekből, illetőleg a rendes négylapból, hatlapból, és a rendes tizenkétlapból, ha ezeknek csúcsai úgy metszetnek le síkok által, hogy a körülfogó rendes sokszögek kétszer oly sok oldalú sokszögekké váljanak, mint a mennyivel eredetileg birtak; így a rendes négylap háromszögeiből rendes hatszögek válnak, a négy csúcs helyébe pedig ugyanannyi háromszög fog állni; a rendes hatlap négyszögeiből lesznek nyolczszögek, a nyolcz csúcs helyébe pedig 8 háromszög áll; végre a rendes tizenkétlap ötszögeiből tízszögek válnak, és a húsz csúcsot a helyébe jövő húsz háromszög foglalja el. Ezen adatok tökéletes összhangzásban vannak a 61. §. képleteivel is; ugyanis e szerint

$$E = \frac{12n}{A}; \quad M = \frac{4n}{A}; \quad \text{és} \quad N = \frac{24}{A}$$

tehát az a) testnél: $E=12$, $M=4$ és $N=4$;

vagy is a test képeztetik 4 rendes hatszögből, és ugyanannyi rendes háromszögből. A testet az által nyerjük meg legegyszerűbben, ha a négylap mindegyik élét három egyenlő részre osztjuk, és az osztó pontokat kellően összekötjük. Vetületeinek meghatározására is csak a négylap vetületeiben kell az oldalakat három részre osztani.

A b) testnél, hol tehát $n=8$, lesz:

$$E=24, \quad M=8, \quad \text{és} \quad N=6$$

vagyis a test képeztetik hat rendes nyolczszögből és 8 rendes háromszögből. A test megnyerésére a hatlap élei szinte három részre osztatnak ugyan, de ezen részek már egymás között nem egyenlők, hanem a közép rész úgy áll a szélső bármelyikéhez, mint $\sqrt{2}$: 1. A vetület egy rendes négyszöget ábrázol, a melybe egy rendes nyolczlap van behelyezve.

Végre a c) testnél, mely tehát rendes tízszögekből és háromszögekből áll:

$$E=60, \quad M=20, \quad \text{és} \quad N=12$$

vagyis áll 12 rendes tízszögből, és 20 rendes háromszögből. Előáll a test, ha a rendes tizenkétlap élei úgy osztatnak három részre, hogy a középső úgy álljon a szélsők bármelyikéhez,

mint 1: $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ Vetületének előállításá szinte igen egyszerű, miután a tizszögek egymáshoz hajlása a tizenkétlap hajlási szögével azonos.

80. §.

Ha ugyanazon származtatási törvényt, melyet az előbbi cikkekben követtünk a rendes négylap, hatlap, és tizenkétlapnál, a mely szerint tehát a test csúcsai akképmetszendők le, hogy az eredeti sokszögekből két annyi oldalú sokszögek váljanak, a még hátralevő 2 rendes testre, ugyanis a rendes nyolczlapra, és a rendes húszlapra alkalmazzuk, a melyeknél tehát, minthogy háromszögekből képezvük, csak az élek 3 egyenlő részre osztandók; ered ismét 2 részarányos test. Lemetszván ugyanis a rendes nyolczlap csúcsait az említett törvény szerint a 8 háromszögből ugyanannyi hatszög lesz, a 6 csúcs helyébe pedig hat rendes négyszög lép, ezen testnél tehát:

$$m = 4, n = 6, \mu = 1, r = 2$$

$$M = 6, N = 8; E = 24.$$

Ha pedig a rendes húszlap csúcsait metszük le, akkor a húsz háromszög helyébe jön a húsz hatszög, a test tizenkét csúcsa helyett pedig ered ugyanannyi rendes ötszög, itt tehát:

$$m = 5, n = 6, \mu = 1, r = 2$$

$$M = 12, N = 20, \text{ és } E = 60.$$

Miután mind ezen testek vetületei a rendes testekéből elég egyszerűen következnek, azért azok a táblákba fel se vétettek.

Ezekkel egyúttal végeztük mind azon testeket, melyek kétfelé rendes sokszögekből alakíthatók. Meg lehet azonban még itt említeni, hogy ide számítható még egy második csoport is, mely a 64. §-ben lehozattal hasonnemű. Az ide tartozó testek nem egyebek, mint egyenes hasábok, melyek alapjai tetszőleges rendes sokszögek, és melyek magassága egyenlő az alap sokszög oldalával. Ezen csoportozatnál tehát $m = 4$, n tetszőleges, $\mu = 2$, $r = 1$, és ennek folytán a 61 §. szerint $A = 8n - 4n - 4(n - 2) = 8$

$$\text{tehát: } E = \frac{16n}{8} = 2n; M = \frac{8n}{8} = n; \text{ és } N = \frac{16}{8} = 2.$$

81. §.

A háromféle rendes sokszögek által bezárt testek.

Képeztessék egy részarányos test háromféle rendes sokszögekből, nevezetesen *mszögekből*, *nszögekből* és *pszögekből*, úgy, hogy a test minden csúcsának képzéséhez járuljon az *mszögekből* μ , az *nszögekből* ν , és a *pszögekből* π szög; legyen azonfelül a *mszögek* száma M , az *nszögek*é N , és a *pszögek*é P ; a test csúcsainak száma legyen E , az élké végre K .

Valamennyi *mszögek* összege a testen $M\mu$, ezekből egy csúcs képzésére fordítatik μ szög, tehát a csúcsok száma

$$E = \frac{M\mu}{\mu} \dots 1); \text{ hasonlóan az } nszögek \text{ } N\nu \text{ számából mindegyik csúcshoz } \nu \text{ szög veendő, tehát a csúcsok száma}$$

$$E = \frac{N\nu}{\nu} \dots 2); \text{ a } pszögeket \text{ pedig tekintetbe véve, lesz}$$

$$E = \frac{P\pi}{\pi} \dots 3). \quad \text{Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely}$$

$$\text{Azonfelül az } mszögnek \text{ mindegyik szöge } \frac{2(m-2)}{m} R,$$

hol R egy derékszöget jelent, tehát valamennyi *mszögek* összege: $2RM(m-2)$; épen így valamennyi *nszögek* összege: $2RN(n-2)$; a *pszögek*é pedig: $2RP(p-2)$; ha tehát az egész testeni szögek összegét W -vel jelöljük, lesz:

$$W = 2R[M(m-2) + N(n-2) + P(p-2)] \dots 4) \text{ vagy az 1), 2), és 3)-ból vett } M, N \text{ és } P \text{ értékeit helyettesítve:}$$

$$W = 2RE \left[\frac{\mu(m-2)}{m} + \frac{\nu(n-2)}{n} + \frac{\pi(p-2)}{p} \right] \dots 5)$$

de a 60 §. 4-ik egyenlete szerint: $W = 4R(E-2)$, miért is e két egyenlet összehasonlításából ered rövid összevonás után:

$$E = \frac{4mnp}{2mnp - \mu np(m-2) - \nu mp(n-2) - \pi mn(p-2)} \dots 6)$$

vagy ha rövidség okáért

$$A = 2mnp - \mu np(m-2) - \nu mp(n-2) - \pi mn(p-2)$$

$$\text{lesz még: } E = \frac{4mnp}{A} \dots 7)$$

E -nek ezen talált értékét az 1), 2) és 3) alatti képletekbe helyettesítve leend:

$$M = \frac{4\mu np}{A} \dots 8)$$

$$N = \frac{4rnp}{A} \dots 9)$$

$$\text{és } P = \frac{4\pi mn}{A} \dots 10).$$

82. §.

Ha egy test háromféle sokszögekből képezvék, akkor a legtöbb oldalú sokszög szöge mindegyik csúcsnál csak egyszer fordulhat elő; ugyanis ezen szög ha legkisebb, 108 foknyi, ez pedig kétszer véve 216 fokot adna; ehhez azonban még hozzá járul legalább egy 90 foknyi, és egy 60 foknyi szög, mi által a szögek összege egy csúcsnál a 360 fokot túlhaladná, következik tehát, hogy π mindig = 1.

A legkevesebb oldalú, úgy szinte a középszámából is egy csúcs képzéséhez legfeljebb kettő járulhat, minthogy különben a szögek összege ismét 360 foknál nagyobb volna, és ha az egyik feléből már kettő vétetett egy csúcs képzéséhez, akkor a másiktól még csak egy jöhet hozzá, úgy hogy egy csúcs képzéséhez négy szögnél soha több nem jöhet.

Ha egy ilyféle testben háromszögek fordulnak elő, akkor a 77-ik §. elméltedése folytán az csak akkor állhat elő, ha a csúcs képzéséhez három szögnél több járul, minthogy pedig a legtöbb oldalú kétszer elő nem fordulhat, azért csak is a középemű lehet kétszeres, és ez is csak úgy, ha az csupán négyszög. Ha pedig egy háromszög, és két négyszög vétetik, akkor ezek szögeinek összege már 240 foknyi, miért is hozzá még legfeljebb egy ötszög szöge jöhet; ez esetben azután, minthogy itt

$$m = 3, n = 4, p = 5$$

$$\mu = 1, r = 2; \text{ és } \pi = 1$$

leend $A = 4$, tehát $E = 60$; $M = 20$; $N = 30$; és $P = 12$; vagyis a kérdéses test áll húsz háromszögből; harmincz négyszögből, és tizenkét ötszögből. Ezen test a rendes tizenkétlapból ered, ha annak élei az oldalakkal párhuzamos síkok által

metszetnek le, az által azután az eredeti ötszögek helyébe új ötszögek állanak, melyek oldalai amazokéval párhuzamosak; a lemetszett 30 él helyébe ugyanannyi rendes négyszög áll; a húsz tizenkétlap-csúcs helyébe pedig magától előáll a húsz rendes háromszög. Ezen származtatást szem előtt tartva, és tekintetbe véve, hogy az ötszögek egymáshoz hajlása a tizenkétlap hajlási szögével azonos, a test vetítése is igen egyszerű. Ugyanis a 190-ik ábrában rajzoltatott először az a alapötszög, a melyre a test fektetve képzelendő; ennek oldalaihoz illesztettek azután a b négyszögek, a tizenkétlap félhajlási szöge alatt, ezekhez ismét a c ötszögek, melyek hajlása az a ötszöghöz a tizenkétlap egész hajlási szöge. A többi rész a vetület rendes alakja mellett részarányilag könnyen kiegészíthető, a fekvetület egész kerete egy rendes tíszöveget képezvén. A függvetület azon állásban van véve, a melynél a látható részek a hátulsókat épen elfedik. A 191-ik ábrában van előállítva a test hálójának fele.

83. §.

Miután oly részarányos test, mely háromféle sokszögekből van alakítva, és a melynél a háromszög szinte előfordul, az előbbi cikkben tárgyalton kívül több nem létezhet, azért a legkevesebb oldalú sokszög már most a négyszög lehet; és azért a test csúcsának képzéséhez mindegyikféle sokszögből csak is egy járulhat. De minthogy így a testesúcs képzésére csak 3 szög fordítatik, azért innét a 77-ik §. értelmében mind azok ki vannak zárva, a melyek páratlan oldalú sokszöghöz tartoznak. A négyszögekhez tehát csak hatszögek, nyolczszögek, stb. csatlakozhatnak. A középfélék azonban csak is hatszögek lehetnek, mert a négyszög, nyolcz, és tíszög szögeinek összege már 369 fokot téssen.

A legkevesebb oldalú sokszög tehát a négyszög lévén, a középpoldalú a hatszög, ezekhez járulhat még először a nyolczszög, másodszor a tíszög. Több oldalú sokszög már ismét lehetetlen, minthogy a négyszög, hatszög és tizenkétszög szögei összege már 360 foknyi.

Ennélfogva tehát két test létezhet, ugyanis $a)$ a melynél

$$m = 4, n = 6, p = 8, \mu = r = \pi = 1$$

ennél tehát: $A = 16$; $E = 48$.

és $M = 12$; $N = 8$; és $P = 6$.

és egy második b) a melynél:

$m = 4$; $n = 6$; $p = 10$, $\mu = \nu = \pi = 1$

ennél tehát: $A = 8$; $E = 120$.

és $M = 30$; $N = 20$; és $P = 12$.

84. §.

Az előbbi cikkben lehozott testek elseje a) áll 6 nyolczszögből, 8 hatszögből, és 12 négyszögből, és ered a rendes hatlapból, vagy a rendes nyolczlapból, ha azok élei és csúcsai levágnak. A négyszögek mind a két testnél az élek helyébe jutnak, a hatszögek vannak a hatlap csúcsai, vagy a nyolczlap háromszögei helyett; a nyolczszögek pedig a hatlap négyszögei, vagy a nyolczlap csúcsai helyett. A 192-ik ábrában előállított fekvetülete felette egyszerű. Először is meghúzatik a rendes nyolczlap a , a melyen a test nyugvónak tételeztetik fel; ennek ezután felváltva minden második oldalához függesztetnek a b négyszögek az alaphoz 45 foknyi hajlás alatt; a többi rész azután az ábra egyszerű megtekintése után könnyen kiegészíthető. Az idézett ábrában a függvetület elhagyatott, minthogy ezen állásnál mind a két vetület azonos alakot mutat, melyben azonfelül a látható részek az alatta levőket épen fedik. A 193-ik ábra a test Mohsféle vetületét állítja elő.

85. §.

Végre a harmadik és utolsó részarányos test, mely háromféle rendes sokszögekből képezhető, és mely a 83. §-ben b) alatt találtatott, áll 12 rendes tízszögből, 20 hatszögből, és 30 négyszögből, és a rendes tizenkétlapból, vagy a húszlapból épen azon törvény szerint ered, mint az előbb tárgyalt test a hatlap vagy a nyolczlapból. Itt szinté az élek helyébe állanak a négyszögek mind a két testben; a hatszögek jutnak a tizenkétlap csúcsai, vagy a húszlap háromszögei helyébe; a tízszögek pedig a tizenkétlap ötszögei, vagy a húszlap csúcsai helyébe. A 194-ik ábrában rajzoltatott először az a alaptízszög, a melyen a test nyugszik; ennek azután felváltva minden második

oldalához függesztetik a rendes négyszög b , a tizenkétlap félhajlási szöge alatt; ezekhez ismét a rendes tízszög a tizenkétlap egész hajlási szöge alatt; a többi részek pedig az alak szabályszerűsége mellett könnyen kiegészíthetők. A függvetületben azon állás van választva, melyben a látható részek az alatta levőket éppen fedik. Ha ezen vetület úgy állítatik, hogy a de tengely az alapmetszetre merőleges legyen, és meghatározatik a hozzá tartozó fekvetület, akkor a test azon állásába van helyezve, a melyben mind a két vetület azonos alakot vesz fel. A 195-ik ábra a test Mohsféle vetületét állítja elő.

86. §.

A ferdények által bezárt testek.

Az előbbieken tárgyalt részarányos testekhez számít, ható még azon két nevezetes test is, melyek csupa azonos ferdények által alakíthatók, ha a csúcsok képzésére csupán hegyes, és csupán tompa szögek fordítanak. A lényeges különbség azonban ezen testek és a részarányosok között abban áll, hogy ezen utóbbiak körül egy gömböt lehet leírni, mely valamennyi csúcson keresztül megy; a beleírt gömbök pedig csak is egynemű sokszögeket érintenek, és így annyi érintő gömb írható beléjük, a hányféle sokszögek fordítanak azok képzéséhez; a ferdények által bezárt testeknél pedig éppen ellenkezőleg csakis egy gömb írható beléjük, mely azután valamennyi ferdény síkját érinti, holott a körülr írt gömb csak is a hegyes, egy másik pedig csak is a tompa csúcsokon megy keresztül.

Ezen testek meghatározását illetőleg képzeljük a 197-ik ábrában három ferdény szögét úgy össze illesztve, hogy azok tompa csúcsai egy D pontba egyesüljenek, háromnál több tompa szög a csúcs képzésére fordítható nem lévén; akkor ezen ferdények AC , CG , és GA hosszabb átlóit összekötve képzelve, ezek a D csúcscsal egy háromoldalú egyenes gúlát képeznek, a melynek alapja az ACG egyenoldalú háromszög. Ezen gúlának A csúcsánál egy háromél képződik, melynek egyik oldala 60 foknyi, a másik két oldal pedig egyenlő a ferdény hegyes szögének felével; a mely háromélből kerestetik a 60 foknyi oldalnak ellentett hajlási szög, melyet A -val fogunk je-

lőlni. Ha tehát a ferdény hegyes szögét α -nak nevezzük, állni fog:

$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{\cos 60^\circ - \cos^2 \frac{1}{2} \alpha}{\sin^2 \frac{1}{2} \alpha} \\ &= \frac{1 - 2\cos^2 \frac{1}{2} \alpha}{2(1 - \cos^2 \frac{1}{2} \alpha)} \dots\dots 1)\end{aligned}$$

Minthogy továbbá feltétel szerint D -nél vannak a tompa szögek, azért G -nél két hegyes szög egyesül, a melyhez még hozzáfüggesztendő szinte hegyes szög, és pedig legalább még kettő. Ha tehát valóban két hegyes csatoltatik G -hez, akkor összekötvén a ferdények kisebb DF , FJ , JE , és ED átlóit, ezek a G csúcscsal egy négyoldalú egyenes gúlát képeznek, melynek alapja a $DFJE$ rendes négyszög. Ezen gúla alapjának E csúcánál ismét egy háromél ered, melynek egyik oldala derékszög, a másik két oldala pedig egyenlő a ferdény féltompa szögével, a melyből a derékszögnek ellentett hajlási szög ke-restetik. Miután a ferdény hegyes szögét α -nak neveztük, a tompa félszög leend $90 - \frac{1}{2} \alpha$, és miután a test hajlási szögei mind egyenlők, leend:

$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{\cos 90^\circ - \cos^2 (90 - \frac{1}{2} \alpha)}{\sin^2 (90 - \frac{1}{2} \alpha)} \\ &= - \frac{1 - \cos^2 \frac{1}{2} \alpha}{\cos^2 \frac{1}{2} \alpha} \dots\dots 2)\end{aligned}$$

Az 1) és 2) alatti képletek összehasonlításából következik

$$(1 - 2 \cos^2 \frac{1}{2} \alpha) \cos^2 \frac{1}{2} \alpha = - 2 (1 - \cos^2 \frac{1}{2} \alpha)^2$$

vagy kifejtve, és $\cos^2 \frac{1}{2} \alpha$ szerint feloldva

$$\cos^2 \frac{1}{2} \alpha = \sqrt{\frac{2}{3}} \text{ vagy } \tan^2 \frac{1}{2} \alpha = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

mely érték segítségével az 1) vagy 2)-ből lesz:

$$\cos A = - \frac{1}{2}$$

tehát a test hajlási szöge $A = 120^\circ$.

87. §.

A jelen testnél mindegyik hegyes csúcs képzéséhez négy hegyes szög járul; ha tehát ezen csúcsok összegét E_1 -el

jelöljük, akkor $4E_1$ lesz a hegyes csúcsok összege. Továbbá minden E_{11} tompa csúcshoz 3 tompa szög kívántatik, tehát a tompa csúcsok összege $3E_{11}$; minthogy pedig épen annyi a hegyes szög mint a tompa, következik, hogy

$$4E_1 = 3E_{11}$$

ha pedig a test minden csúcsának összegét E -el jelöljük, könnyen következik, hogy a hegyesek ezen összegnek $\frac{3}{4}$ részét, a tompák pedig $\frac{1}{4}$ részét képezik, vagyis hogy

$$E_1 = \frac{3}{4}E, \text{ és } E_{11} = \frac{1}{4}E$$

miután pedig minden hegyes E_1 csúcshoz négy szög járul, az E_{11} -hez pedig három, lesz, ha V -el jelöljük a szögek számát:

$$V = 4 \cdot \frac{3}{4}E + 3 \cdot \frac{1}{4}E = \frac{13}{4}E$$

s minthogy azonfelül egy hegyes és egy tompa szög együtt mindig 180 fokot képez, lesz a fokok összege

$$W = \frac{13}{4} \cdot 2RE$$

hol R egy derékszöget jelent. De a 60 §. 4-ik képlete szerint minden síkok által bezárt testben

$$W = 4R(E-2)$$

tehát összehasonlítás által

$$\frac{13}{4}E = E - 2 \text{ és innét } E = 14$$

vagyis a jelen test 14 csúcscsal bír, melyek közül $\frac{3}{4}$ vagy 6 jut a hegyesekre, és $\frac{1}{4}$ vagy 8 a tompákra. Minthogy pedig a hat hegyes csúcsban összesen 24 szög van, következik, hogy a hegyes szögek összege, tehát a tompáké is az egész testen 24, és így a bezáró ferdények száma 12; miért is ezen test *ferdény tize-kétlapnak* neveztetik.

88. §.

Ha a test úgy állítatik, hogy a hegyes csúcsokon keresztül menő átlók egyike a feklapra, másika a függlapra álljon merőlegesen, akkor vetületei a lehető legegyszerűbbek. Ugyanis a 196-ik ábrában az a csúcsból lefelé menő élek egyenlő hajlással bírván, azok vetületei egymást derékszög alatt metszik, és így az egész vetület egy rendes négyszöget

képez, mely az oldalakhoz párhuzamosan négy egyenlő részre osztatott. Az egész négyszög oldala képezi a ferdények hosszabb átlóját, a kisebb négyszögek bc átlója pedig a ferdény kisebb átlóját adja valódi nagyságban. A 197-ik ábrában a Mohs-féle vetület van előállítva.

89. §.

Ha a 86-ik §-ben követett eljárást ismételve a 199-ik ábrában három tompa ferdényszöget illesztünk össze D -nél, ered egy három oldalú gúla, melynek csúcsa D -ben van, és melynek alapját képzi a ferdény hosszabb átlóiból eredt egyenlő oldalú ACG háromszög, a melynél tehát találtatott a csúcsnál hajlás szögekre nézve :

$$\cos A = \frac{1 - 2 \cos^2 \frac{1}{2} \alpha}{2 (1 - \cos^2 \frac{1}{2} \alpha)} \dots 1)$$

Jelen esetben azonban a G hegyes szögek mellé még három új hegyes szöget illesztünk, melynél azután többet nem is lehet; és ha most kötjük össze a ferdények kisebb EB , BF , FH , HK , HK és KE átlóit, ered egy öt oldalú gúla, melynek alapját képzi az $EDFHK$ rendes ötszög. Tekintetbe vévén azon háromélt, mely ezen gúla E alapsarkánál ered, és a melynek egyik oldala 108 foknyi, a másik kettő pedig egyenlő a ferdény tompa szögének felével, kereshetjük ismét a 108 foknyi oldalnak ellentett hajlási szöget, és találni fogjuk, hogy :

$$\cos A = \frac{\cos 108^\circ - \cos^2 (90 - \frac{1}{2} \alpha)}{\sin^2 (90 - \frac{1}{2} \alpha)}$$

ha ugyanis ismét α -val jelöltetik a ferdény hegyes szöge; mely képletből még a 108 fok pótkéblét helyettesítve, lesz

$$\cos A = - \frac{\sqrt{5} - 1 + 4 (1 - \cos^2 \frac{1}{2} \alpha)}{4 \cos^2 \frac{1}{2} \alpha} \dots 2)$$

és az 1) és 2) alatti képletek összehasonlításából :

— $(\sqrt{5} + 3 - 4 \cos^2 \frac{1}{2} \alpha) (1 - \cos^2 \frac{1}{2} \alpha) = 2 \cos^2 \frac{1}{2} \alpha (1 - 2 \cos^2 \frac{1}{2} \alpha)$
mely egyenletet kifejtvén, és abból $\cos \frac{1}{2} \alpha$ -át meghatározván, ered :

$$\cos \frac{1}{2}\alpha = \sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{10}} \text{ vagy } \operatorname{tg} \frac{1}{2}\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

Ezen talált α értéket az 1) vagy 2) alatti képletbe helyettesítve, találni fogjuk a hajlási A szög részére :

$$\cos A = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}$$

a miből következik, hogy ezen szög 144 foknyi, vagyis egyenlő a rendes tízszög szögével.

90. §.

Ha az ide tartozó test hegyes csúcsait E_1 -el, a tompákat pedig E_{11} -el jelöljük, és tekintetbe vesszük, hogy mindegyik hegyes csúcsban öt hegyes szög van, mindegyik tompa csúcsban pedig három tompa szög, lesz a hegyes szögek összege $5E_1$; a tompáké pedig $3E_{11}$; s minthogy a hegyes szögek összege egyenlő a tompa szögek összegével, lesz :

$$5E_1 = 3E_{11}$$

ha pedig valamennyi csúcsok összegét E -el jelöljük, áll szinte, hogy

$$E = E_1 + E_{11}$$

mely két egyenletből következik, hogy a hegyes szögek összege az egész csúcsok összegének csak $\frac{3}{8}$ -át teszik, míg a tompák ugyanannak $\frac{5}{8}$ -ával egyenlők. Minthogy tehát $E_1 = \frac{3}{8}E$, és $5E_1$ hegyes szög van mindössze, azért a hegyes szögek összege $\frac{15}{8}E$, a tompáké természetesen éppen annyi. Ezen szögek közül kettő-kettő összesen 180 fokot képez, azért az egész testeni szögek összege fokokban

$$W = \frac{15}{8} 2R.E$$

mely egyenletet összekötve a 60-ik §. 4-dik képletével, ered

$$\frac{15}{8} 2RE = 4R(E - 2)$$

ebből pedig

$$E = 32$$

vagyis a testnek mindössze 32 csúcsa van, mely összegnek $\frac{3}{8}$ -a (vagy 12) esik a hegyes csúcsokra, és $\frac{5}{8}$ -a (vagyis 20) a tompa csúcsokra.

Minthogy a jelen testnek 12 hegyes csúcsa van, és mindegyik ilyen csúcsban 5 hegyes szög, azért a hegyes szögek összege $5 \cdot 12 = 60$; épen így van a testben 20 tompa csúcs, és mindegyikben 3 tompa szög, tehát a tompa szögek összege szinte $3 \cdot 20 = 60$, mint lenni kell; valamennyi szögek összege tehát 120, és azért a ferdények száma ezen testnél 30; miért is az *ferdényharminczlapnak* neveztetik.

91. §.

A 198-ik ábrában vannak előállítva a ferdényharminczlap vetületei, azon állásban, midőn a hegyes csúcsokon keresztül menő átló a feklapra merőleges, mely állásában vetíteni legkönnyebb. Ugyanis az a csúcsból a fekvetületben meghúzatnak az ab, ac, ad , stb. vonalok egyenlő egymástól távolban, tehát 72 foknyi nyílás alatt, és levágatnak belőlök oly nagy részek, hogy a $bc = cd =$ stb. távolságok az adott ferdény kisebb átlójával legyenek egyenlők; meghúzatnak a be párhuzamosan ac -hez, és ce párhuzamosan ab -hez, mi által az e , és a vele hasonló pontok még vannak határozva. Az ef távol egyszersmind a ferdény hosszabb átlójával egyenlő. Ugyanezen csillagalak azután még egyszer rajzoltatik az előbbivel csúcselesen, és még a csúcsokat egy rendes tízszög által összekötve, (melynek oldalai ugyanannyi a feklapra merőlegesen álló ferdényeket képviseltek), meg lesz az egész fekvetület határozva.

A függvetületben az egyes pontok magassága meghatározására nézve forgassuk a feklapban az $abec$ ferdényt a vízirányos bc átlója körül addig, míg az egész ferdény a feklappal nem párhuzamos, hol azután oE a hosszabb átló fele ($= \frac{1}{2}ef$) valódi nagyságában lesz látható, mely is visszafordítván eredeti helyébe a b, c, d , stb. pontok közös eE , magasságát határozzák meg, az a' csúcs felett. Az e, f , stb. pontok épen kétszer oly nagy magasságban, a g pedig és a vele hasonló pontok háromszor oly nagy magasságban fekszenek. Az e', f', g' , stb. pontokban merőlegesek emeltetnek a vetületi tengelyre, a melyre a ferdény oldalának valódi nagysága eE felvitetnek. A felső távolságok az alsókkal egyenlők lévén, a többi rész könnyen kiegészíthető.

A jelen ábrában a függvetület úgy van választva, hogy a látható részek az alatta levőket épen elfedjék. Ha a függvetület addig forgattatik, míg a *bk* vonal az alapmetszetre merőleges lesz, a mely állásban ugyanis a test egyik ferdénylapján nyugszik, akkor mind a két vetület azonos alakot mutat. A 199-ik ábrában van előállítva ezen testnek Mohsféle vetülete, mely épen az utóbb említett állásnak felel meg. A 200-ik ábrában van végre előállítva a ferdényharminczlap hálója.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

Ház-Rész Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely